

ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Материјали за младе математичаре
Свеска 31

1000 ЗАДАТКА

са математичких
такмичења ученика
основних школа
1998–2007. године

БЕОГРАД, 2007.

ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
Материјали за младе математичаре, св. 31

Републичка комисија за математичка
такмичења ученика основних школа

1000 ЗАДАТКА
СА МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
1998–2007. године

Осмо изменено издање

Б Е О Г Р А Д
2007

Аутори: *др Војислав Андрић, др Оливера Ђорђевић, др Драган Ђорић,
др Мирјана Ђорић, Александар Илић, мр Милан Јовановић,
Мирјана Јовчић, Вера Јоцковић, Љубица Киселички,
др Драгослав Љубић, Славолуб Милосављевић, мр Љубинка Петковић,
др Бранислав Поповић, мр Драгана Ранковић, др Марија Станић,
мр Владимир Стојановић, др Ратко Тошић, др Нинослав Гурић*

1000 ЗАДАТКА

са математичких такмичења ученика основних школа 1998–2007. године
Осмо изменењено издање

Материјали за младе математичаре, свеска 31

Издавач: ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
Београд, Кнеза Михаила 35/IV
www.dms.org.yu, E-mail: info@dms.org.yu

За издавача: *др Бранислав Поповић*

Рецензенти: *др Зоран Каделбург, др Павле Младеновић*

Уредник: *др Зоран Каделбург*

Пртежи: *др Мирјана Ђорић, др Марија Станић, мр Милан Јовановић*

© Друштво математичара Србије

Ранија издања: 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2006.

СИР – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

37.016 : 51(075.2)(079.1)

ХИЉАДУ задатака са математичких такмичења

1000 задатака са математичких такмичења ученика основних школа 1998–2007. године / [автори Војислав Андрић ... [и др.] ; пртежи Мирјана Ђорић, Марија Станић, Милан Јовановић]. – 8. изменењено изд. – Београд : Друштво математичара Србије, 2007 (Ваљево : Alexandria). – 254 стр. : граф. прикази ; 24 см – (Материјали за младе математичаре ; св. 31)

На врху насл. стр.: Републичка комисија за математичка такмичења ученика основних школа. – Тираж 2000.

ISBN 978-86-81453-65-0

COBISS.SR-ID 143128332

ISBN 978-86-81453-65-0

Тираж: 2000 примерака

Штампа: „ALEXANDRIA“, Ваљево

С А Д Р Ж А Ј

	Задаци	Решења
1998. година	1	105
1999. година	12	122
2000. година	20	132
2001. година	30	145
2002. година	40	160
2003. година	50	173
2004. година	61	190
2005. година	72	205
2006. година	83	222
2007. година	94	240

ПРЕДГОВОР ОСМОМ ИЗДАЊУ

У овом издању збирка садржи све задатке (са решењима) са такмичења из математике ученика основних школа из последњих десет година – од 1998. до 2007. године, и то са свих нивоа – од школског, преко општинског, окружног, републичког (државног), савезног (односно Српске математичке олимпијаде), до Балканијаде. Укључени су задаци са десет Јуниорских балканских математичких олимпијада из наведених година.


Београд, септембра 2007. год.

Аутори

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 1998.

IV разред

1. За колико се трећина највећег четвороцифреног броја разликује од једанаестине најмањег непарног четвороцифреног броја?
2. Може ли збир два узастопна природна броја бити 19971998? Одговор образложити.
3. Одељење у коме је било 32 ученика купило је лопту која кошта 246 динара, при чему су дечаци за лопту дали по 9 динара, а девојчице по 6 динара. Колико у том одељењу има дечака, а колико девојчица?
4. Квадрат чија је странница 10 см пресечен је једном правом на два правоугаоника. Израчунати обиме тих правоугаоника, ако се зна да је двоструки обим једног од њих једнак троструком обиму другог правоугаоника.
5. Колико троуглова има на датој слици?



Сл. уз задатак 5

V разред

6. Дати су следећи скупови бројева:
 $A = \{1, 8, 9, 10\}$, $B = \{x \mid x - 3 \in A\}$ и $C = \{x \mid x + 2 \in B\}$.
Одредити скупове: $A \cap B$ и $(C/A) \cup (A/C)$.
7. Шта је веће: $\frac{71}{1998}$ или $\frac{8}{221}$?
8. Производ два броја је 1071. Ако се један од чинилаца повећа за 30, производ је 1701. О којим бројевима је реч?
9. Угао α једнак је $1998'$. Израчунати угао β који је комплементан са углом α и угао γ који је суплементан са углом α .
10. Најкраће растојање тачке A од датог круга k је 3 см, а растојање тачке A од центра круга је 5 см. Колико је највеће растојање тачке A од датог круга k ?

VI разред

11. Израчунати вредност разломка $\frac{a+b}{1998}$ ако су бројеви a и b решења једначина:
 $1000 - (900 - (98 - a)) = 1998$ и $1000 - (900 - (98 + b)) = -1998$.

- 12.** Одредити најмање природне бројеве m и n , тако да је $3888 \cdot m$ потпун квадрат, а $3888 \cdot n$ потпун куб неког природног броја.
- 13.** Кречење стана Аца заврши за 10 сата. Ако би му Бора помогао 2 сата, онда би кречење завршили за 6 сата. За колико сата би самостално кречење стана обавио Бора?
- 14.** У једнакокраком троуглу ABC ($AC = BC$) тачке A_1 и C_1 су средишта страница BC и AB . Симетрале страница BC и AB секу се у тачки O , тако да је угао $A_1OC_1 = 121^\circ$. Шта је веће: основица AB или крак AC ?
- 15.** У дати угао xOy уписан је круг k који краке датог угла додирује у тачкама A и B . Доказати да је $OA = OB$.

VII разред

- 16.** Израчунати $x + y + z$ ако су x, y и z решења једначина:
- $$\sqrt{3(x - 1998)} = 3, \quad \sqrt{3y - 1998} = 3 \quad \text{и} \quad \sqrt{3(z - 1998)} = 3.$$
- 17.** Дата је једнакост $\frac{1998^{1998} + 1998^{1999}}{1999^{1999}} = x^{1998}$. Колико је x ?
- 18.** У троуглу ABC углови α , β и γ задовољавају $\alpha - \beta = 3\gamma$. Доказати да је дати троугао тупоугли.
- 19.** Дат је правоугли троугао ABC , са правим углом код темена C и катетама $a = 6$ см и $b = 8$ см. Ако су A_1 , B_1 и C_1 средишта страница BC , AC и AB одредити полупречник кружнице која садржи тачке A_1 , B_1 и C_1 .
- 20.** Дешифровати множење $*2 * .45 = (**)^2$.

VIII разред

- 21.** Ако се између цифара датог двоцифреног природног броја напише нула, добија се број који је 9 пута већи од датог. Одредити о којим бројевима је реч.
- 22.** Решити једначину $|x - 1| + \sqrt{x^2 - 6x + 9} = 1998$.
- 23.** У унутрашњој области квадрата $ABCD$ дата је тачка M , тако да је угао AMB прав, а $BM = 9$ см. Права BM пресеца дуж CD у тачки K тако да је $CK : DK = 3 : 1$. Израчунати површину квадрата.
- 24.** Израчунати површину и запремину коцке чија је дијагонала једнака дијагонали квадра чије су дужине ивица 1 см, 5 см и 7 см.
- 25.** Израчунати збир свих производа у табелици на слици.

11 · 11	11 · 12	11 · 13	11 · 14	11 · 15
12 · 11	12 · 12	12 · 13	12 · 14	12 · 15
13 · 11	13 · 12	13 · 13	13 · 14	13 · 15
14 · 11	14 · 12	14 · 13	14 · 14	14 · 15
15 · 11	15 · 12	15 · 13	15 · 14	15 · 15

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 1998.**IV разред**

26. Јесен је један дан дужа од зиме, 4 дана краћа од лета и 2 дана краћа од пролећа. Колико дана траје свако годишње доба, ако година није преступна?

27. Производ два броја је 1998. Ако се један умањи за 24, а други остане исти, нови производ износи 1110. Одредити тражене бројеве.

28. Које све масе можемо измерити на теразијама са два таса ако располажемо само са теговима од 1 kg, 3 kg и 9 kg?

29. Колико има троуглова чија су темена у датим тачкама?



			5					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Сл. уз задатак 29

Сл. уз задатак 30

30. У поља дате траке уписати природне бројеве тако да је производ свака три суседна броја једнак 30. Колико различитих решења има?

V разред

31. Дати су коцка ивице 6 cm и квадар чије су ивице 9 cm, 12 cm и 15 cm. На колико се највећих једнаких коцки они могу исечи? Да ли се, користећи све тако исечене коцке, може направити нова коцка?

32. Збир четири природна броја је 1998. Ако се први сабере са 2, од другог одузме 2, трећи помножи са 2, а четврти подели са 2, добијају се једнаки бројеви. О којим бројевима је реч?

33. Одредити све троцифрене природне бројеве који су деливи са 4 и чији је производ цифара једнак 24.

34. Када се Раша родио његова мајка је имала 25 година. Године 1992. мајка је била 6 пута старија од Раше. Колико година сада има Раша, а колико његова мајка?

35. Колико се правоугаоника који се састоје од 12 поља може избројати на шаховској табли (8×8)?

VI разред

36. У уторак је број гледалаца у биоскопу био за једну трећину већи него у понедељак. У среду је број гледалаца био исти као у понедељак. За колико је број гледалаца у среду био смањен у односу на уторак?

- 37.** Одредити најмањи четвороцифрен број који је делив са 9 и чији је производ цифара једнак 180.
- 38.** Доказати да је збир тежишних дужи троугла већи од његовог полуобима.
- 39.** Дат је троугао ABC . Ако симетрала угла код темена C са симетралом странице AB образује угао једнак половини угла код темена C , онда је троугао ABC правоугли. Доказати.
- 40.** Сваки од 30 ученика једног одељења поклонио је школској библиотеци по неку књигу. Највише, 8 књига, поклонио је Дуле. Доказати да постоји бар 5 ученика који су поклонили исти број књига.

VII разред

- 41.** Децимални број $19,98\overline{1998}$ написати у облику разломка.
- 42.** Збир првих n природних бројева је троцифрен број са једнаким цифрама. Одредити n .
- 43.** У паралелограму $ABCD$ страница $AB = 30\text{ cm}$, а угао $\angle DAB = 60^\circ$. Симетрала угла DAB сече страницу CD у тачки E тако да важи $P_{ABCE} = 2 \cdot P_{\triangle AED}$. Колика је површина паралелограма $ABCD$?
- 44.** Кружница $k(O, r = 3\text{ cm})$ уписана је у троугао ABC додирује страницу BC у тачки T . Израчунати дужину странице BC , ако је $\angle BAC = 30^\circ$ и ако је $\angle BOT : \angle COT = 3 : 4$.
- 45.** Десет ученика имају заједно 100 динара. Сваки ученик има најмање један динар и сви имају различит, а цео, број динара. Доказати да међу њима постоји 6 ученика који заједно имају мање од 66 динара.

VIII разред

- 46.** За које вредности реалног броја p једначина $3 - \frac{x-p}{2} = x$ има целобројна решења по x , која задовољавају услов $|x| < 2$?
- 47.** У троуглу ABC мерни бројеви свих страница су природни бројеви, а највећа страница је 2 cm . Израчунати површину троугла ABC , ако је $h_c = h_a + h_b$.
- 48.** У троуглу ABC угао ACB је 60° . Ако су AK и BM висине и C_1 средиште странице AB , тада је троугао KMC_1 једнакостраничен. Доказати.
- 49.** Једно теме коцке удаљено је од дијагонале коцке 7 cm . Израчунати површину и запремину коцке.
- 50.** Коцку сира ивице 14 m напало је 1998 мишева. Доказати да се непосредно после напада може исећи коцка сира ивице 1 m (кубни метар) унутар које се не налази ниједан миш.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 1998.**IV разред**

51. Ако у неком броју изоставимо 0 која се налази на месту јединица, онда је новодобијени број за 1998 мањи од првобитног. Који је то број?

52. Лека има три пута више новца од Јарка. Ако обојица потроше по 10 динара тада ће Лека имати четири пута више новаца од Јарка. Колико новца је имао свако од њих на почетку?

53. Дешифровати сабирање $* * * * + * * * = 1998$ ако сваки од непознатих сабиралаца има једнаку вредност било да га читамо с лева у десно, било да га читамо с десна у лево.

54. Ако се једна страница квадрата повећа за 3 см, а друга за 6 см, онда новодобијени правоугаоник има површину која је за 1998 cm^2 већа од површине квадрата. Израчунати обим датог квадрата и обим добијеног правоугаоника.

55. Два оца и два сина играли су шах по систему да свако са сваким игра по једну партију. Колико је том приликом одиграно најмање партија, а колико највише партија?

V разред

56. Неки посао Душко би завршио за 12 дана, Ташко за 15 дана, а Рашко за 20 дана. Радили су заједно 4 дана, а потом је остatak послало завршило Ташко. Колико дана је укупно радио Ташко?

57. Одредити два разломка са двоцифреним имениоцима, тако да је њихов збир 145/1998.

58. Дат је квадрат $ABCD$ странице 5 см. Конструисати тачку M која је једнако удаљена од темена A и B и која је од темена C удаљена 3 см. Колико има решења?

59. Одредити природни број ЈОВАН (једнаким словима одговарају једнаке цифре, различитим словима одговарају различите цифре) којем је збир цифара једнак 10, такав да збир петоцифрених бројева ЈОВАН и НАВОЈ представља петоцифрени број чије су све цифре једнаке. Колико решења има?

60. Дато је 8 на изглед једнаких златника од којих је 7 исправних једнаке масе, а осми, неисправан, је нешто лакши од осталих 7. Са два мерења на теразијама без тегова, одредити који је златник неисправан.

VI разред

61. У три цистерне је било 780 литара млека. Када из прве одлијемо једну четвртину, из друге једну петину, а из треће три седмине млека, у цистернама остану једнаке количине млека. Колико млека има у свакој од цистерни?

- 62.** Дато је пет различитих целих бројева a, b, c, d и e таквих да је $(4-a)(4-b)(4-c)(4-d)(4-e) = 12$. Одредити $a+b+c+d+e$.
- 63.** Нека је тачка M средиште странице CD паралелограма $ABCD$. Права AM сече дијагоналу BD у тачки N . Ако права CN сече страницу AD у тачки P , онда је $AP = PD$. Доказати.
- 64.** Дате су три различите, произвољне тачке A, B и C . Конструисати тачку M тако да добијени скуп тачака $\{A, B, C, M\}$ има особину да садржи два пара централно симетричних тачака. Испитати све могуће случајеве.
- 65.** Дат је израз $12\frac{1}{2} \cdot 2 + 0.2 \cdot 25 : 5 - 5 \cdot 1\frac{8}{15} : \frac{2}{3} - 1,1$. Не мењајући поредак бројева у датом изразу, поставити неколико заграда тако да вредност добијеног израза буде 0.

VII разред

- 66.** Ако је n природан број, онда је $n^3 + 1997n + 1998$ дељиво са 6. Доказати.
- 67.** Дужина странице ромба је 9 cm, а дужина збира његових дијагонала је 24 cm. Одредити површину ромба.
- 68.** Када се број страница конвексног многоугла удвоstrучи, онда се број његових дијагонала повећа за 1998. За колико се степени при том повећа збир његових унутрашњих углова?
- 69.** Нека су тачке M и N редом средишта страница AB и BC троугла ABC и нека је права s симетрала $\angle BAC$. Ако се праве s и MN секу у тачки P , онда је $\angle APB$ прав. Доказати.
- 70.** Колико се различитих четвороцифрених бројева може написати цифрама 1, 8 и 9 тако да се свака цифра употреби бар једном?

VIII разред

- 71.** У xOy координатној равни дата је права $4x + 7y = 1998$. Колико тачака на датој правој имају обе координате целобројне и припадају првом квадранту координатне равни?
- 72.** У троугаоној форми, ред за редом, поређани су златници и сребрњаци: у првом реду 1 златник; у другом реду 2 сребрњака; у трећем реду 3 златника; у четвртом реду 4 сребрњака, ... Колико има укупно сребрњака, ако је пребројано укупно 625 златника? Колико има могућих решења?
- 73.** Дат је конвексан четвороугао $ABCD$ тако да је $AB + AD = 10$ cm, $BC = CD$ и $\angle BCD = \angle BAD = 90^\circ$. Израчунати површину датог четвороугла.
- 74.** У једнакокраком трапезу $ABCD$ ($AB \parallel CD$) основица $AB = 12a$ и основица $CD = 4a$. Тачке E и F су редом средишта основица CD и AB . Ако се праве

AE и DF секу у тачки M , праве BE и CF секу у тачки N , израчунати дужину дужи MN у функцији од a .

75. Бочне стране ABS , BCS и CAS тростране пирамиде $ABCS$ су међусобно нормалне и имају редом површине 54 cm^2 , 96 cm^2 и 72 cm^2 . Израчунати запремину пирамиде и мерне бројеве сваке од ивица пирамиде.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 1998.

VI разред

76. Гоџа и Нина имају једнак број јабука. Гоџа своје јабуке продаје по цени 3 јабуке за 1 динар, а Нина 2 јабуке за 1 динар. Ако саставе јабуке и продају их по цени 5 јабука за 2 динара, онда ће зарадити 4 динара мање него да јабуке продају појединачно. Колико јабука су имале Гоџа и Нина, ако и при појединачној и при заједничкој продаји не остане ниједна јабука?

77. Пеђа кружну стазу претрчи за 24 минута. Ако Дејан и Пеђа трче различитим смеровима, онда се на стази сусретну после 9 минута. Ако Дејан и Пеђа трче истим смером, после колико времена ће се први пут срести и када ће се први пут истовремено наћи у почетној тачки?

78. Дат је правоугли троугао ABC , са правим углом код темена B . Кроз тачку A конструисана је права p паралелна са BC и на правој p изабрана тачка K , тако да су K и C са разних страна праве AB . Ако права CK сече страницу AB у тачки M и ако је $MK = 2 \cdot AC = 3\angle KCB$. Доказати.

79. Дат је трапез $ABCD$. Симетрале спољашњих углова трапеза код темена A и D секу се у тачки M , а симетрале спољашњих углова код темена B и C секу се у тачки N . Ако је $MN = 999\text{ cm}$, колики је обим трапеза $ABCD$?

80. Трговац Миле је купио извесну количину пасуља по цени од 5 динара и 163 килограма пасуља по цени од 10 динара. Затим је обе количине пасуља помешао и добијену мешавину продавао за 8 динара по килограму. Када је распродao пасуљ, платио је 23% пореза на укупан промет пасуља. Потом је утврдио да сада има 1998 динара више него пре почетка посла. Колико килограма пасуља је продао трговац Миле?

VII разред

81. Доказати да збир квадрата пет узастопних природних бројева не може бити квадрат ниједног природног броја.

82. Збир четвороцифрених бројева $\overline{1abc}$ и $\overline{cba1}$ је број \overline{bbdd} . Дешифруј дато сабирање, ако једнаким словима одговарају једнаке цифре, а различitim словима различите цифре.

83. Најмања дијагонала правилног дванаестоугла је $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$ см. Одредити обим и површину датог правилног дванаестоугла.

84. Кроз центар O_1 кружнице k_1 пролази кружница k_2 . Дате кружнице се секу у тачкама A и B . Кроз тачку B конструисана је тангента t кружнице k_2 која кружницу k_1 пресеца у тачки C . Доказати да је $AB = BC$.

85. Дат је правоугли трапез $ABCD$, са правим углом код темена B , чије су основице $AB = 8$ см и $CD = 4$ см, а крак $BC = 4$ см. У датом трапезу на случајан начин је изабрано 17 тачака. Доказати да међу изабраним тачкама постоје бар две тачке чије међусобно растојање није веће од $\sqrt{5}$ см.

VIII разред

86. Наћи решење система једначина

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 4x + 4y - 3, \\y^2 + z^2 &= 4y + 4z + 5, \\z^2 + x^2 &= 4z + 4x + 2,\end{aligned}$$

у скупу реалних бројева.

87. Дато је пет било којих природних бројева. Доказати да се међу њима увек могу изабрати два природна броја m и n тако да је $m^4 - n^4$ дељиво са 15.

88. Збир основне ивице a и висине H правилне шестостране призме је 10 см. Одредити a и H , тако да је дужа дијагонала призме најмања могућа. Израчунати површину и запремину те призме.

89. Дат је конвексан четвороугао $ABCD$. Дијагонале AC и BD секу се у тачки O , а подножје нормале из тачке B на дијагоналу AC је тачка M , при чему је $BM = 2k \cdot BO$, где је k реалан број. Ако је површина тог четвороугла P , онда је $P = k \cdot AC \cdot BD$. Доказати.

90. У квадрату $ABCD$ дијагонале AC и BD секу се у тачки O . На страницима BC и CD дате су редом тачке M и N тако да је $BM = CN$. Ако се праве AM и BN секу у тачки P , онда је права OP симетрала угла APN . Доказати.

САВЕЗНО ТАКМИЧЕЊЕ 1998.

VI разред

91. Две јабуке теже колико 3 крушке, а 3 јабуке теже као 4 поморанџе. Сем тога 6 крушака кошта колико 5 поморанџи. Шта је скупље: килограм крушака или килограм поморанџи?

92. О четвороцифреним бројевима a, b, c знају се следећи подаци:

- две средње цифре броја a једнаке су као две одговарајуће средње цифре броја c ;
 - две средње цифре броја b међусобно су једнаке и једнаке су првој цифри броја c ;
 - прва цифра броја a једнака је последњој цифри броја c ;
 - обрнуто, прва цифра броја c једнака је последњој цифри броја a ;
 - прве цифре бројева a и b су међусобно једнаке;
 - број c једнак је збиру бројева a и b ;
- (a) Одредити број b .
- (б) Колико постоји различитих могућности за број a ?

93. У неједнакокраком оштроуглом троуглу ABC из темена A конструисана је тежишна дуж, из темена B конструисана је симетрала угла β , а из темена C висина. Пресечне тачке датих правих су тачке P, Q и R . Доказати да добијени троугао PQR није једнакостраничан.

94. Дат је конвексан четвороугао $ABCD$. Нека је тачка M средиште странице AB , а тачка N средиште странице CD .

- (a) Доказати да је $AD + BC \geq 2 \cdot MN$.
- (б) Какав је четвороугао $ABCD$, ако важи једнакост?

95. Једнакостранични троугао странице 8 см, издељен је на једнакостраничне троуглове странице 1 см повлачењем правих паралелних са страницама датог троугла. Колико укупно једнакостраничних троуглова постоји на тако добијеној слици?

VII разред

96. Одреди цифре x, y и z тако да у декадном систему важи једнакост

$$\frac{1}{x+y+z} = 0,xyz.$$

97. Нека су a и b цели бројеви такви да је израз $a^2 + 9ab + b^2$ дељив са 11. Доказати да тада израз $a^2 - b^2$ дељив са 11.

98. У једнакокраком троуглу ABC је угао при врху $\angle CAB = 30^\circ$, а висина из темена A је 2 см. Одредити целе бројеве m, n и p , тако да је крак троугла $b = m\sqrt{2}(n\sqrt{3} + p)$.

99. Нека је m дужина средње линије, а h дужина висине трапеза чије су дијагонале нормалне. Доказати да је $m \geq h$.

100. Може ли на математичкој олимпијади присуствовати 1999 учесника (рачујући и госте), ако сваки од њих има тачно 3 пријатеља учесницима?

VIII разред

101. Одредити најмањи природан број n , који има број делилаца једнак броју делилаца броја 1998, при чему се делиоцима природног броја сматрају и 1 и сам тај број.

102. Нека су n и k природни бројеви. Дати су искази:

- 1) $n + 1$ је дељиво са k ;
- 2) $n = 2k + 5$;
- 3) $n + k$ је дељиво са 3;
- 4) $n + 7k$ је прост број.

Одредити све вредности за n и k , ако се зна да су три од четири дата исказа тачна, а један нетачан.

103. Права правилна четвороstrана пирамида $SABCD$ чија је висина 8 cm и бочна ивица 10 cm, пресечена је са равни која садржи теме A и нормална је на бочну ивицу SC . Ова раван сече бочне ивице SB , SC и SD редом у тачкама K , L и M .

- a) Доказати да је права KM паралелна са BD .
- b) Израчунати површину четвороугла $AKLM$.

104. У произвољном конвексном петоуглу $ABCDE$ дужина странице AE је 4 cm. Нека су P , Q , S и T редом средишта дужи AB , CD , BC и DE , а M и N редом средишта дужи PQ и ST . Израчунати дужину дужи MN .

105. Квадрат је подељен на пет дисјунктних правоугаоника једнаких површина тако да темена квадрата припадају различитим правоугаоницима, а пети правоугаоник нема заједничких тачака са страницама квадрата. Доказати да је тај пети правоугаоник квадрат.

ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА 2. ЈУНИОРСКОЈ БАЛКАНИЈАДИ

106. Разбојник је пронашао пећину са златом, дијамантима и сандуком са којим може изнети благо. Пун сандук злата тежи 200 kg, пун сандук дијаманата 40 kg. Килограм злата се може продати за 20 дуката, а килограма дијаманата за 60. Разбојник може одједном да подигне и изнесе терет не већи од 100 kg. Колико највише дуката може добити за благо које би изнео одједном?

107. На страницама BC и CD правоугаоника $ABCD$ дате су редом тачке E и F тако да је троугао AEF једнакостраничен. Ако је тачка M средиште дужи AE , онда је и троугао CDM једнакостраничен. Доказати.

108. Одреди најмањи природан број n за који је вредност израза

$$\frac{\sqrt{1998} + \sqrt{n}}{\sqrt{1998} - \sqrt{n}}$$

природан број.

**ДРУГА ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА
МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА**

Атина, 1998.

109. Доказати да је број

$$\underbrace{11 \dots 111}_{1997} \underbrace{22 \dots 222}_{1998} 5$$

потпун квадрат.

110. Дат је конвексан петоугао $ABCDE$, такав да је $AB = AE = CD = 1$, $\angle ABC = \angle DEA = 90^\circ$ и $BC + DE = 1$. Наћи површину петоугла $ABCDE$.

111. Наћи све парове позитивних целих бројева (x, y) који задовољавају једначину $x^y = y^{x-y}$.

112. Да ли је могуће, користећи само три цифре, написати 16 троцифрених бројева, тако да међу њима не постоје два броја који имају исти остатак при дељењу са 16?

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 1999.

IV разред

113. Разлици бројева 23 456 и 19 876 додај разлику највећег петоцифреног и најмањег троцифреног броја.

114. Син и ћерка имају заједно 29 година. Отац је старији од сина 25 година, а мајка од ћерке 22 године. Колики је збир година оца и мајке?

115. Ако 20. фебруара 1999. године у 17 часова у Ваљеву пада киша, може ли се очекивати да ће кроз 1999 сати бити сунчано време?

116. Колику дебљину би имала књига од 1 999 000 страница, ако 100 листова (200 страница) те књиге има дебљину 2 mm?

117. Шта је веће: 43 km^2 и 5 ha или 435 768 a?

V разред

118. Уместо * напиши одговарајуће цифре, тако да наведене операције буду тачно извршене

$$\begin{array}{r} *23 \cdot ** = 16 * 2 \\ + * * * 5 \\ \hline * * * * \end{array}$$

119. Пресек скупова A и B има 6 елемената, а њихова унија 18 елемената. Колико елемената има скуп $B \setminus A$, ако скуп $A \setminus B$ има 4 елемената?

120. Мераугла $\alpha + \beta$ је за $38^\circ 41' 24''$ већа од мереугла $\alpha - \beta$. Одредити меру угла β .

121. Одредити најмањи и највећи шестоцифрен број с различитим цифрама који је дељив са 9.

122. Ако ивицу коцке повећамо за 1 cm онда се њена површина повећа за 66 cm^2 . За колико се повећала запремина коцке?

VI разред

123. Који знак има производ xyz ако је $xy > 0$, $xz < 0$ и $z < 0$? Одговор образложити.

124. Тежина тела на Месецу износи $\frac{4}{25}$ тежине тела на Земљи. Ако је човекова тежина на Земљи 802,5 N, колика би била на Месецу?

125. Дате су једначине: $1 - 999 \cdot (x - 1) = 1999$ и $19 - 99 \cdot (y - 1) = 1999$. Одредити збир решења датих једначина.

126. У једнакокраком троуглу ABC ($AC = BC$) крак AC је продужен преко темена C до тачке D , тако да је $CD = CA$. Доказати да је троугао ABD правоугли.

127. У троуглу ABC , страница AC је већа од странице BC , а симетрала угла γ сече страницу AB у тачки D . Који од углова $\angle ADC$ и $\angle BDC$ је већи?

VII разред

128. Шта је веће: $5 + 2\sqrt{7}$ или $3\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$?

129. Доказати да је вредност израза $16^5 + 2^{15}$ дељива са 33.

130. Производ три узастопна парна природна броја је 13 728. Одредити те бројеве.

131. У полукруг полуупречника r уписати квадрат. Израчунати површину квадрата у зависности од r .

132. Дат је троугао ABC чија је површина 1999 cm^2 . Странице AB , BC и CA продужене су преко темена B , C и A за своју дужину тако да је $AB = BA_1$, $BC = CB_1$ и $CA = AC_1$. Израчунати површину добијеног троугла $A_1B_1C_1$.

VIII разред

133. На једној страни диедра чији је угао 60° , дата је тачка M . Њено одстојање од друге стране диедра је $8\sqrt{3}$ см. Колико је њено одстојање од ивице диедра?

134. Аутомобилиста једног дана пређе $\frac{4}{9}$ свог укупног пута, другог дана $\frac{9}{20}$ од преосталог дела пута, а трећег дана 330 km. Колики је био укупан пут овог аутомобилисте?

135. Решити једначину $|2x - 0,5| = 0,2$.

136. Ако се основна ивица правилне четворостране призме висине 10 см повећа за 3 см, онда се запремина призме повећа за 210 cm^3 . Израчунати површину и запремину призме.

137. Дат је једнакокраки троугао чија је основица 10 см, а крак 13 см. Израчунати површину њему сличног троугла чија је дужа висина 24 см.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 1999.

IV разред


138. Помоћу цифара 0, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 написати најмањи и највећи шестоцифрени број користећи сваку цифру:

а) само једанпут;

б) највише три пута.

- 139.** У првом сандуку има 1999 јабука више него у другом. У ком сандуку ће бити више јабука, и за колико, ако из првог сандука пренесемо у други 1000 јабука?

- 140.** Колико је керамичких плочица облика квадрата, странице 15 cm , потребно за покривање пода правоугаоне просторије чије су димензије 12 m и 27 m ?



Сл. уз задача 142

- 142.** Колико дужи и колико троуглова је нацртано на датој слици?

V разред

- 143.** Дати су скупови: $A = \{1, 2, x, 5, 9\}$ и $B = \{2, y, 3\}$. Одредити све бројеве x и y , такве да скуп B има три различита елемента, при чему је $B \subset A$.

- 144.** Колико има природних бројева мањих од 1000 који нису дељиви ни са 4 ни са 6?

- 145.** Нaћи скup природних бројева који су решења неједначине $1 \leq \frac{x-2}{2} \leq 2$.

- 146.** Два радника копају канал. Први за 6 сати ископа $\frac{12}{25}$ целе дужине канала, а други за 3 сата ископа $\frac{6}{23}$ целе дужине канала. Који радник има бољи учинак за један сат рада?

- 147.** Разлика углова α и β је суплементна са њиховим збиром. Одредити углове α и β , ако је угао β једнак осмини угла α .

VI разред

- 148.** Возећи између града A и града B бициклиста је првог дана прешао $\frac{1}{4}$, а другог дана 30% целог пута. До циља је преостало још 180 km . Колико је растојање између та два града?

- 149.** Дат је број $p = -0,5$. Израчунати вредност израза $x^2 + y^2$, ако је $x = -|-1 + |-p||$ и $y = -|-1 - |p||$.

- 150.** Дат је једнакокраки троугао ABC ($AC = BC$) чији је $\angle ACB = 44^\circ$. Симетрала крака AC сече крак BC у тачки D , а праву AB у тачки E . Упоредити дужи: DA , DB , DC и DE .

- 151.** На страници CD квадрата $ABCD$ дате су тачке E и F тако да $CE = EF = FD$. Дужи AE и BF секу се у тачки M . Доказати тврђења:

a) $\triangle AED \cong \triangle BFC$; б) троугао EFM је једнакокраки.

152. На општинском такмичењу младих математичара учествује 123 ученика од IV до VIII разреда. Доказати да је број такмичара бар из једног разреда већи од 24.

VII разред

153. После два снижења за исти број процената, цена робе се снизила са 25 хиљада на 16 хиљада динара. Колико процената је износило то снижење?

154. Шта је веће: $\sqrt{6 + \sqrt{6}}$ или 3,00001?

155. Дат је конвексни четвороугао $ABCD$ ($ABCD$ није паралелограм). Нека су M, N, P и Q редом средишта страница AB, BC, CD и DA . Доказати да је четвороугао $MNPQ$ паралелограм.

156. Дат је троугао ABC тако да је $AB = 15\text{ cm}$, $\angle BAC = 60^\circ$ и $AC = 8\text{ cm}$. Израчунати висине датог троугла.

157. Доказати једнакост: $\left| \frac{a^2 + b^2}{2} - ab \right| + \left| \frac{a^2 + b^2}{2} + ab \right| = a^2 + b^2$.

VIII разред

158. У једној цистерни има 540 l воде, а у другој 360 l . Из прве се за један сат одлије 3 пута више воде него из друге. Кроз 6 сати у првој цистерни ће остати 60 l воде мање него у другој. Колико литара воде се одлива сваког сата из прве, а колико из друге цистерне?

159. Решити неједначину $(x - 3)^2 < x(x - 3)$ и решења приказати на бројевној правој.

160. Дужине страница основе квадра су 6 cm и 8 cm , а дијагонала квадра заклапа са основом квадра угао од 45° . Одредити површину и запремину квадра.

161. Дат је круг $k(O, r = 3\text{ cm})$ и тачка M изван круга тако да је $OM = 7\text{ cm}$. Права p која садржи тачку M сече круг у тачкама C и D ($MD > MC$). Ако је $MC = 5\text{ cm}$, израчунати дужину тетиве CD .

162. Дат је скуп тачака A, B, C, D, E које припадају правој p и ван праве p (у истој равни) тачке F, G, H . Колико је:

- a) највише; б) најмање

троуглова одређено овим тачкама?

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 1999.**IV разред**

163. Двојица моторциклиста кренули су истовремено из места A у место B , један другом у сусрет. Први се кретао брзином од 1 km у минуту, а други брзином од 800 m у минуту. Када су се срели, први моторциклиста је прешао 66 km више од другог. Колико је растојање између места A и места B ?

164. Површина једног винограда је 199900 m^2 . Дужина баште је 4 пута мања од дужине винограда, а ширина баште је 5 пута мања од ширине винограда. Колика је површина баште?

165. У изразу $2 * 4 * 6 * 8 * 10 = 9 * 9$ заменити * знацима рачунских операција и заграда, тако да добијена једнакост буде тачна. Урадити то на три начина.

166. Дата је једнакост $AAA \cdot B + C = 1999$. Дешифровати дату једнакост, тако што уместо слова A , B и C треба написати одговарајуће цифре, при чему једнаким словима одговарају једнаке цифре и различитим словима различите цифре. Колико различитих решења има?

167. Миша је у забавном парку купио 5 жетона и започео игру против компјутера. У свакој партији у којој Миша победи компјутер, као награду, добија нових 5 наградних жетона. По завршетку игре Миша се хвалио да је одиграо 50 партија и 8 пута победио компјутер. Његов друг Горан је тврдио да је то немогуће. Ко је био у праву Миша или Горан?

V разред

168. Јоца је замислио један број. Затим га је повећао 4,5 пута, а потом га умањио за 12,3 и добио 5,7. Који број је замислио Јоца?

169. Један канап пресечен је на два дела, тако да је један део једнак половини канапа увећаној за $0,5\text{ m}$. Ако се други део канапа подели тако да његов већи део буде једнак половини канапа увећаној за $0,5\text{ m}$, онда је преостали део канапа $1,5\text{ m}$. Колика је укупна дужина канапа?

170. Одредити најмањи седмоцифрен природан број који је дељив са 36 и чије су све цифре различите.

171. Дата је права p и две тачке A , B са исте стране праве p (права AB није ни паралелна са правом p , ни нормална на праву p). Конструисати концентричне кружнице k_1 и k_2 тако да кружница k_1 додирује праве p и AB , а кружница k_2 садржи тачке A и B .

172. Распоредити 14 тачака на 7 правих тако да на свакој правој буду по 4 тачке.

VI разред

173. Нека су α , β и γ углови троугла ABC . Израчунати углове α , β и γ , ако је $\alpha = 0,4\beta$ и $\gamma = 4\alpha$.

174. Два друга Јанко и Марко добили су једнаке суме новца. Марко је купио бомбоне чија је цена 40 динара за килограм, а Јанко друге бомбоне чија је цена 60 динара за килограм. Затим су те бомбоне помешали. Колика је цена једног килограма мешавине купљених бомбона?

175. Конструисати троугао ABC , ако су дати следећи елементи: странница $AB = 4\text{ cm}$, тежишна дуж $BB_1 = 5\text{ cm}$ и угао $\angle ABC = \beta = 60^\circ$.

176. Из темена B и D паралелограма $ABCD$ конструисане су нормале BE и DF на дијагоналу AC . Доказати да је $BEDF$ паралелограм.

177. Збир 1999 различитих простих природних бројева је паран број.

а) Да ли је производ тих 1999 простих бројева паран или непаран број?

б) Доказати да међу њима постоји 1998 бројева чији је збир паран број.

в) Доказати да међу њима постоји 1998 бројева чији је збир непаран.

VII разред

178. Ако су краци неједнакокраког трапеза међусобно нормални, онда је збир квадрата његових основица једнак збиру квадрата његових дијагонала. Доказати.

179. Израчунати површину правилног дванаестоугла, ако је полупречник круга описаног око дванаестоугла једнак 6 cm.

180. Одредити вредност полинома $P(x, y) = x^{1998} + 1999y$ ако је $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 10 = 0$.

181. Дијагонале AC и BD паралелограма $ABCD$ са оштрим углом код темена A , секу се у тачки O . Тачка M је на правој AB , при чему је $\angle AMO = \angle MAD$. Доказати да је тачка M једнако удаљена од тачака C и D .

182. Доказати да међу 26 различитих непарних бројева мањих од 100 постоје бар два чији збир је једнак 100.

VIII разред

183. У координатној xOy равни дате су тачке $O(0, 0)$, $M(3, 4)$ и $N(x, 0)$. Одредити једначине правих OM и MN , ако је површина троугла OMN једнака 14.

184. Израчунати површину и запремину правилне четворостране пирамиде чија је висина 17 cm, а површина дијагоналног пресека 204 cm^2 .

185. Доказати да број чији декадни запис садржи једино цифре 2 и 6 није разлика квадрата два природна броја.

186. Дат је конвексан четвороугао $ABCD$ површине P . Доказати да је $AB \cdot BC + CD \cdot DA \geqslant 2P$.

187. Дата је шаховска табла 8×8 и 3 топа различите боје. На колико се начина могу разместити 3 топа тако да се они међусобно не „нападају“. (Топови се „нападају“ ако се налазе у истој хоризонтали или вертикални.)

ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА 3. ЈУНИОРСКОЈ БАЛКАНИЈАДИ

188. Дате су једначине $x^2 - y^2 = 4^n$ и $x^2 - y^2 = 5^{1999}$, при чему су непознате x и y природни бројеви. Одредити природан број n , тако да дате једначине имају једнак број решења.

189. На табли је написан деветоцифрен број чије су све цифре различите и различите од нуле. Доказати да је за ма који распоред цифара могуће избрисати неке од датих цифара, тако да преостали број буде потпун квадрат који је најмање двоцифрен број.

190. Дат је скуп бројева $S = \{1, 3, 5, 7, -8, -12, 13, -14, -16, 21\}$. Иван и Јелена играју следећу игру: наизменично узимају по један број из скупа S . Победник је играч који на крају има већу апсолутну вредност збира изабраних бројева. Ако Јелена игра прва, може ли изабрати такву стратегију да обавезно побеђује?

191. Дат је трапез $ABCD$ ($AB > CD$). Продужеци кракова AD и BC секу се у тачки E , а средишта дужи AB и CD су редом тачке M и N . Одредити угао AEB , ако је $MN = \frac{1}{2}(AB - CD)$.

192. У равни α је дато n кругова једнаких полупречника, при чему је центар сваког круга изван преосталих $n - 1$ кругова. Ако је M унутрашња тачка свих кругова, доказати да је $n \leqslant 5$.

ТРЕЋА ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

Софија, 1999.

193. Нека су a, b, c, x, y реални бројеви, такви да је $a^3 + ax + y = 0$, $b^3 + bx + y = 0$ и $c^3 + cx + y = 0$. Ако је $a \neq b \neq c \neq a$, доказати да је $a + b + c = 0$.

194. За сваки број $n = 0, 1, \dots, 1999$ број A_n је дефинисан са $A_n = 2^{3n} + 3^{6n+2} + 5^{6n+2}$. Наћи највећи заједнички делилац бројева $A_0, A_1, \dots, A_{1999}$.

195. Дат је квадрат S дужине странице 20. Нека је M скуп чији су елементи четири темена квадрата S и 1999 произвољних унутрашњих тачака квадрата S . Доказати да постоји троугао са теменима из скупа M чија површина је мања или једнака $\frac{1}{10}$.

196. Дат је једнакокраки троугао ABC , $AB = AC$. Нека је D произвољна тачка дужи BC таква да је $BC > BD > DC > 0$. Нека су редом k_1 и k_2 описани кругови троуглова ABD и ADC . Нека су редом BB' и CC' дијаметри кругова k_1 и k_2 , и M средиште дужи $B'C'$. Доказати да је површина троугла MBC константна, односно не зависи од положаја тачке D .


ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2000.

IV разред

197. При сабирању неколико бројева ученик је направио следеће грешке: у једном сабирку цифру јединица 2, заменио је са 9, цифру десетица 4 са 7 и цифру стотина 8 са 3. За колико је промењен тачан збир?

198. За три месеца Нада је потрошила 1350 динара. Првог и другог месеца је потрошила 856 динара, а другог и трећег 800 динара. Колико динара је потрошила Нада првог и трећег месеца заједно?

199. Одредити решење једначине $10^5 - x = 2000$.



200. Збир обима три једнака правоугаоника износи 360 см. Израчунати дужину и ширину једног од ових правоугаоника ако је дужина за 1 dm већа од ширине.

201. Колико троуглова има на датој слици?

Сл. уз задатак 201

V разред

202. Скупови A и B дати су следећим једнакостима: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A \setminus B = \{1, 2\}$ и $B \setminus A = \{4, 5\}$. Одредити скупове: $A \setminus (A \cap B)$ и $(A \cup B) \setminus B$.

203. Дате су кружнице $k_1(M, 3 \text{ cm})$ и $k_2(N, 2 \text{ cm})$ које се додирују:

(а) споља; (б) изнутра.

Конструисати дате кружнице и израчунати растојање MN .

204. Доказати да је збир свих природних бројева од 1 до 1000 делив са 7.

205. Углови α и β су суплементни, а пет шестина угла α и трећина угла β су комплементни углови. Одредити углове α и β .

206. Дешифровати сабирање: $AB + ABC + ABCD = 2000$, ако једнаким словима одговарају једнаке, а различитим словима различите цифре.

VI разред

207. Троуглови ABC и $A'B'C'$ су подударни. На страницима AB и $A'B'$ редом су изабране тачке M и M' такве да је $\angle BCM = \angle B'C'M'$. Доказати да је $AM = A'M'$.

208. Одредити цифре a и b тако да број $\overline{a2000b}$ буде делив са 36.

209. На правој AB , одређеној хипотенузом правоуглог троугла ABC дате су тачке D и E . Ако тачке D и E не припадају страници AB и ако је $AD = AC$, а $BE = BC$, израчунати $\angle DCE$.

210. Одредити све природне бројеве који не задовољавају неједначину $|x + 2|(5x - 15) > 0$.

211. У правоуглом троуглу један од углова једнак је 40° . Доказати да симетрала правог угла полови угао који образују висина и тежишна дуж из темена правог угла.

VII разред

212. Шта је веће: $5\sqrt{2} + 4\sqrt{3}$ или $3\sqrt{5} + 7$?

213. Конструисати квадрат чија је површина 20 cm^2 .

214. У једној школи је 35% девојчица, а дечака је за 252 више него девојчица. Колико у школи има дечака, а колико девојчица?

215. Израчунати обим троугла чија је једна страница дужине 24 см, а одговарајућа висина и тежишна дуж 8 см, односно 10 см.

216. Славина A пуни базен за 12 часова, а славина B за 15 часова. Одводна цев C празни базен за 10 часова. За које време ће се напунити базен ако су истовремено отворене славине A и B и одводна цев C ?

VIII разред

217. Колико је равни одређено са 2000 правих које се секу у једној тачки и од којих по три не припадају истој равни?

218. Лека и Јарко су поделили 1416 динара. Када је Лека потрошио $\frac{4}{7}$ свога дела, а Јарко $\frac{3}{8}$ свога, имали су једнаке износе. Колико новца је свако од њих добио приликом поделе?

219. Ако се свака ивица коцке повећа за 30% , за колико процената се повећа површина, а за колико запремина коцке?

220. У троуглу ABC је $\angle BAC = 36^\circ$. Симетрале унутрашњег и спољашњег угла BAC секу праву BC редом у тачкама M и N , тако да је $AM = AN$. Ирачунати остале улове троугла ABC .

221. Одредити све природне бројеве n такве да је $n^2 + 2n + 2000$ потпун квадрат.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2000.

IV разред

222. Из два пристаништа кренула су истовремено, један другом у сусрет, два брода. Први брод се кретао брзином од 22 km/h , а други брод брзином 28 km/h .

Колико је растојање између пристаништа, ако су се бродови срели после 40 часова путовања?

223. Пера, Васа и Огњен имају заједно 160 кликера. Ако Пера да Огњену 17 кликера, а Васа поклони Огњену 12 кликера, онда ће Пера и Васа имати једнак број кликера, а Огњен колико и Пера и Васа заједно. Колико кликера је имао сваки дечак?

224. Ако се једна страница квадрата повећа два пута, а друга за 22 mm, добије се правоугаоник чији је обим за 2000 mm већи од обима датог квадрата. Колика је страница датог квадрата?

225. Дат је двоцифрен број. Ако му се са десне стране допише исти тај број добија се четвороцифрен број. Колико пута је добијени број већи од датог броја?

226. Конструисати магични квадрат чији су елементи бројеви: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27.

V разред

227. Дати су скупови: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$. Одредити скуп X ако је $X \subset (A \cup B)$, $X \cap A = A \setminus B$ и $X \cap B = B \setminus A$.

228. Весна са 77 корака једнаке дужине пређе 67 m, а Иван са 88 корака једнаке дужине пређе 78 m. Чији корак је дужи и за колико?

229. Дат је збир бројева $\overline{7a}8\overline{5} + \overline{34}a\overline{5} + \overline{1}a2\overline{1}a$. Коју цифру треба написати уместо слова a тако да добијени збир буде делив са 9?

230. Углови a и b су суплементни, а углови b и c комплементни. Израчунати углове a , b и c , ако је збир углова a и c једнак 142° .

231. За учвршћивање једне коњске потковице, поткивач употреби 5 минута. Колико најмање времена треба да 48 поткивача поткују 60 коња, ако приликом поткивања коњ мора стајати на три ноге?

VI разред

232. Одредити све целе бројеве x за које је $6 < -(-x) < 10$ и $|x| < 8$.

233. Три друга Јарко, Лека и Пеђа деле извесну суму новца. Јарко је добио трећину, Лека четвртину остатка, а Пеђа 100 динара више од Јарка. Колико новца је било и колико је свако од њих добио?

234. На страницама AB , BC , CD и DA квадрата $ABCD$, дате су редом тачке M , N , P и Q , тако да је $AM = BN = CP = DQ$. Доказати да је четвороугао $MNPQ$ такође квадрат.

235. Унутрашњи углови троугла ABC односе се као $9 : 16 : 20$. Одредити угао између симетрале угла и висине из темена највећег угла троугла.

236. Раша има шуму облика правоугаоника димензија 30 m и 70 m , у којој се налази 34 стабла. Може ли Раша у својој шуми наћи правоугаоно парче земље димензије 6 m са 10 m , на коме нема ниједног стабла?

VII разред

237. Поређати по величини бројеве: $a = 2^{45}$, $b = 3^{36}$, $c = 4^{27}$ и $d = 5^{18}$.

238. Одредити бројевну вредност израза

$$0.4 \cdot \sqrt{6\frac{1}{4}} - \frac{1}{10} \cdot \frac{5}{2} - 12\sqrt{\left(-\frac{1}{3}\right)^2}.$$

239. Израчунати површину трапеза ако су основице трапеза $a = 30\text{ cm}$ и $b = 16\text{ cm}$, а краци $c = 15\text{ cm}$ и $d = 13\text{ cm}$.

240. Нека су P , Q , R , S средишта страница ромба $ABCD$ чија је страна $a = 5\text{ cm}$, а једна дијагонала $d_1 = 8\text{ cm}$. Доказати да је четвороугао $PQRS$ правоугаоник и израчунати његову површину.

241. Аца, Богдан и Џеџа треба да поделе 2000 динара тако да се делови које добију Аца и Богдан односе као $2 : 3$, а делови које добију Богдан и Џеџа као $9 : 5$. Одредити колико ће свако од њих добити новца.

VIII разред

242. На излет није пошло 174 ученика једне школе, а остали ученици су отпутовали у 18 једнаких аутобуса, при чему је у сваки аутобус ушло по 5 ученика више него што је у аутобусу било седишта. Да је у сваки аутобус ушло онолико ученика колико има седишта, била би потребна још три аутобуса, а у једном од њих би остало 6 празних места. Колико има ученика у тој школи?

243. Решити једначину $||||x| + x| + x| + x| + x| = 2000$.

244. Нека су α и β две паралелне равни међусобно удаљене 12 cm . У равни α дате су тачке A и C , а у равни β тачке B и D . Одредити угао који права одређена тачкама C и D заклапа са равни α , ако права одређена тачкама A и B заклапа са равни α угао од 30° и ако је $AB + CD = 48\text{ cm}$.

245. Око круга са центром O описан је четвороугао $ABCD$. Доказати да су $\angle AOB$ и $\angle COD$ суплементни.

246. Кроз теме A паралелограма $ABCD$ конструисана је права p која дијагоналу BD сече у тачки E , праву DC у тачки K и страницу BC у тачки F . Доказати да је $AE^2 = EF \cdot EK$.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2000.

IV разред

247. Колико ће се тона сена добити са ливаде дужине 750 m и ширине 200 m, ако се са сваког ара просечно накоси 240 kg траве и ако се зна да маса сена чини четвртину масе траве?

248. Трећина збира три броја је 2 000. Ако је други број три пута већи од првог, а трећи за 5 мањи од првог, израчунај те бројеве.

249. Дешифровати одузимање $**** - *** = 2000$, ако се и умањеник и умањилац читају једнако с лева у десно и с десна у лево.

250. После одређеног броја радних дана зидари су одлучили да убрзају изградњу, па су свака 3 дана посла скратили на 2 дана. Ако је цео посао завршен за 55, уместо за 70 дана, колико се дана радило пре убрзавања посла?

251. Петар, Ана, Марко, Бојан и Гордана су хтели да поделе бомбоне. Свако је редом узимао по једну бомбону док није остало мање него што је њих, а онолико колико је добио свако од њих. Колико је могло бити бомбона? Одредити сва решења.

V разред


252. Аутомобилиста је за 4 сата прешао 360 km. Првог сата је прешао $\frac{4}{15}$ целог пута; другог сата $\frac{7}{8}$ пута који је прешао првог сата; трећег сата два пута мање него што је прешао у прва два сата заједно, а четвртог сата преостали део пута. Колико километара је аутомобилиста прешао четвртог сата?

253. Три пекара су, равномерним радом, за два сата умесили 67 хлебова. Колико хлебова би умесила 4 пекара за 3 сата? За колико сати би 5 пекара умесило 335 хлебова?

254. Одредити просте бројеве p и q , ако је $2 \cdot p + 3 \cdot q = 100$.

255. На једном конгресу било је 2 000 учесника, од којих је сваки био филозоф или математичар, а један број учесника се бавио и филозофијом и математиком. Колико је било учесника у свакој од три категорије, ако је међу филозофима сваки осми и математичар, а међу математичарима сваки тринести и филозоф?

256. Правоугаоник на слици је састављен од шест квадрата. Израчунати обим и површину правоугаоника, ако је страница најмањег квадрата 1 cm.



Сл. уз задатак 256

VI разред

257. У три продавнице је било укупно 2000 kg јабука. Када је из прве продавнице продата шестина јабука, из друге $\frac{3}{13}$ јабука, а из треће трећина јабука, у све три продавнице је остала иста количина јабука. Колико јабука је било у свакој продавници?

258. Ако се број 1000 подели неким бројем остатак је 8 , а ако се број 900 подели истим бројем остатак је 1 . Колики количник је у првом, а колики у другом дељењу?

259. Конструисати троугао ABC , ако су дате тачке A_1 , B_1 и C' , при чему је A_1 средиште странице BC , B_1 средиште странице AC , а C' подножје висине из темена C .

260. Нека су тачке P , Q , R , S , редом средишта страница AB , BC , CD и DA паралелограма $ABCD$. Даље, нека је $AQ \cap PD = \{K\}$, $AQ \cap RB = \{L\}$, $SC \cap RB = \{M\}$ и $PD \cap SC = \{N\}$. Доказати да је четвороугао $KLMN$ паралелограм и да је $KL = \frac{2}{5}AQ$.

261. Четири дечака су поделили све кликере којима располажу. Први је добио половину кликера и још један кликер. Други је добио половину преосталих кликера и још један кликер. Трећи је добио половину преосталих кликера и још један кликер. Четврти је добио половину преосталих кликера и још један кликер. Колико кликера је добио сваки дечак?

VII разред

262. Да ли је вредност израза $1,494949\dots + \sqrt{7+4\sqrt{3}} + \sqrt{7-4\sqrt{3}}$ рационалан или ирационалан број?

263. Нека су a , b , c и d реални бројеви. Ако је $(ab+cd)^2 = (a^2+c^2)(b^2+d^2)$, онда је $ad=bc$. Доказати.

264. Дат је произвољан троугао ABC . Нека је P пресечна тачка симетрале $\angle BAC$ и праве која полови дужи AC и BC . Доказати да је $\angle APC$ прав.

265. Дата су два паралелограма $ABCD$ и $DEFG$, таква да дуж AB садржи тачку E , а дуж FG садржи тачку C . Доказати да ова два паралелограма имају једнаке површине.

266. Дат је конвексан седмоугао $ABCDEFG$. Чега има више: троуглова или четвороуглова чија су темена – темена датог седмоугла?

VIII разред

267. Кифла кошта пола динара, погачица 2 динара, а ћеврек 5 динара. Да ли је могуће за тачно 100 динара купити тачно 100 пецива?

268. Одредити за које вредности реалног броја m једначина $\frac{mx}{2} - 3 = 2(x - m)$ има негативно решење.

269. Нека је AB тетива датог круга $K(O, r = 4 \text{ cm})$ и нека је C подножје нормале из тачке A на тангенту круга у тачки B . Израчунати $AB^2 : AC$.

270. Основна ивица правилне трострane пирамиде је дужине x , а бочна страна заклапа са равни основе угао од 60° . Одредити x , ако је мерни број површине пирамиде једнак мерном броју њене запремине.

271. Дванаест ученика улази у биоскопску салу у којој су места нумерисана и у којој су слободна само прва два реда са по 6 слободних места. Пет ученика жели да седи у првом реду, док је осталима свеједно где ће седети. На колико начина је могуће испунити жеље свим ученицима?

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2000.

VI разред

272. Решити једначину: $\frac{2}{73} = \frac{1}{60} + \frac{1}{219} + \frac{1}{292} + \frac{1}{x}$.

273. Међу учесницима републичког такмичења сваки такмичар навија или за „Првену звезду“ или за „Партизан“. Сви такмичари који навијају за „Првену звезду“ највише воле математику. Међу онима који навијају за „Партизан“ 10% такође највише воли математику, а преостали су определени између физике и информатике. Колико процената учесника навија за „Првену звезду“, ако 46% такмичара највише воли математику?

274. Један оштар угао датог правоуглог троугла је пет пута већи од другог. Доказати да је хипотенуза четири пута већа од своје висине.

275. У ромбу $ABCD$ оштар угао је 60° . Дате су тачке: M на страници AB и N на страници BC , такве да је $MB + BN = AB$. Доказати да је троугао MND једнакостраничен.

276. На циљу трке првих шест места су заузели: Ана, Дана, Јана, Горан, Зоран и Милан. Судија трке је записао следеће податке о њиховом пласману: а) Прва два места заузеле су особе истог пола; б) Јана се пласирала између Милана и једне девојке; в) Између Милана и Зорана кроз циљ су прошли три особе; г) Горан и Ана су се пласирали непосредно испред девојке. Одредити редослед првих шест такмичара на циљу ове трке.

VII разред

277. Доказати да је број $\underbrace{111\dots111}_{2000} - \underbrace{222\dots222}_{1000}$ потпун квадрат неког природног броја.

278. Решити једначину: $\frac{x(x^2 - 1)(x^2 - 4)}{x + |x|} = 0$.

279. У конвексном четвороуглу $ABCD$, $\angle ACB = 20^\circ$, $\angle ACD = 30^\circ$ и $\angle ADB = 40^\circ$. Одредити $\angle BAC$, ако је $AD = BD$.

280. Оштри углови неједнакокраког трапеза су комплементни. Израчунати обим и површину трапеза, ако је један крак 15 см, мања основица 14 см и висина 12 см.

281. Породица Математиковић има само један фењер и треба да по ноћи, трошним мостом, пређе преко набујале реке. Отац мост пређе за 1 минут, мајка за 2 минута, дечак за 5 минута, а бака за 10 минута. Колико је најмање времена потребно да сви пређу преко моста ако се на мосту истовремено могу наћи највише две особе; ако оне морају са собом имати фењер; ако бржа особа иде брзином спорије и ако ношење преко моста није могуће?

VIII разред

282. Одредити сва реална решења једначине $\sqrt{4 - (x + 1)^2(x - 2)^2} = x^2 + 2x + 3$.

283. Да ли је тачна једнакост: $\left(\frac{8}{11}\right)^2 + \frac{3}{11} = \frac{8}{11} + \left(\frac{3}{11}\right)^2$? Одредити релације које важе између природних бројева a , b и c тако да је увек испуњена једнакост: $\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \frac{b}{c} = \frac{a}{c} + \left(\frac{b}{c}\right)^2$.

284. Дијагонала AC квадрата $ABCD$ је висина која одговара основици једнакокраког троугла AEC . Ако је $AB = 3a$ и ако квадрат $ABCD$ и троугао AEC имају једнаке површине израчунати обим и површину четвороугла који је пресек квадрата $ABCD$ и троугла AEC .

285. Дата је коцка $ABCDA'B'C'D'$ ивице 3 см и на ивицама AB , BC и CC' редом тачке M , N и P такве да је $AM : MB = 1 : 2$, $BN : NC = 2 : 1$ и $CP : PC' = 1 : 2$. Одредити обим и површину фигуре која се добија у пресеку коцке и равни одређене такама M , N и P .

286. Може ли се и како једнакостранични троугао странице 30 см прекрити дисјунктним једнакокраким трапезима чије су странице 2 см, 1 см, 1 см и 1 см?

САВЕЗНО ТАКМИЧЕЊЕ 2000.

VI разред


287. Одредити све уређене парове (x, y) целих бројева x и y , таквих да је $x^2 + \frac{6}{y} = 10$.

288. Одредити најмањи природан број m за који постоји природан број n тако да је $0 < \frac{m}{17} - \frac{n}{7} < 0,01$.

289. У равни су дате три произвољне тачке A, B и C . Конструисати у тој равни три међусобно паралелне праве p, q и r које садрже дате тачке A, B и C , редом, тако да је једна од тих правих једнако удаљена од остале две.

290. На страници AB паралелограма $ABCD$ дата је тачка K таква да је $\angle AKD = \angle DKC$. Права p која садржи средиште P странице BC , паралелна правој AB , сече дуж KD у тачки M , а нормала из K на AB сече праву CM у тачки N . Доказати да је права DN нормална на праву CK .

291. Из једне раскрснице полазе три улице $OA = OB = OC = 4r$ (слика), из којих су сви излази затворени. Инспектор се налази у тачки O (раскрсници) и јури преступника који се налази у једној од улица. Инспектор може да види преступника само ако њихово међусобно растојање није веће од r . Максимална брзина инспектора је два пута већа од максималне брзине преступника. У почетном моменту инспектор не види преступника. Доказати да инспектор може да ухвати преступника.



Сл. уз задатак 291

VII разред

292. Одредити све уређене парове (p, q) простих бројева p и q , таквих да је $p^2 - 2q^2 = 1$.

293. За реалне бројеве a и b важи неједнакост $\left(\frac{1+ab}{a+b}\right)^2 < 1$. Доказати да је апсолутна вредност једног од бројева a и b мања од 1, а другог већа од 1.

294. У оштроуглом троуглу ABC тачка D је средиште странице BC . Нека тачка E дели дуж AD , тако да је $AE : ED = m : n$ и нека права BE сече страницу AC у тачки F . Одредити однос површина троуглова ABF и BCF .

295. Права p паралелна страници AB датог троугла ABC , полови страницу BC и сече симетралу $\angle CAB$ у тачки T . Ако је O центар уписаног круга троугла ABC , доказати да је $\angle ABC = 2\angle OCT$.

296. У координатној равни дате су тачке M, N, A и B са целобројним координатама. Описати најкраће путеве између тачака M и N ако су дозвољене само три врсте кретања:

- (а) дуж правих са једначином облика $x = i$, $i \in Z$;
- (б) дуж правих са једначином облика $y = j$, $j \in Z$;
- (в) дуж дужи AB .

VIII разред

297. Одредити три проста броја таква да је њихов производ седам пута већи од њиховог збира.

298. Производ првих n природних бројева $1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n - 1) \cdot n$ назива се „ n факторијел“ и обележава са $n!$. Да ли се из производа сто бројева $1!, 2!, \dots, 99!, 100!$ може изоставити само један број тако да производ преосталих 99 бројева буде потпун квадрат?

299. Сва темена конвексног многоугла налазе се у унутрашњости квадрата чија је страница дужине 1. Доказати да је збир квадрата дужина страница тог многоугла мањи од 4.

300. У троуглу ABC тачка D припада страници AB , а тачка E је пресек симетрале $\angle BAC$ и странице BC . Ако је $\angle CBD = \angle ACD$ и $AC = BD$, онда је права DE паралелна са правом AC . Доказати.

301. Укупна маса неколико сандука је 10 тона, при чему је маса сваког сандука мања од једне тоне. Колико најмање камиона носивости 3 тоне треба узети, тако да се цео терет од 10 тона може превести одједном?


ЧЕТВРТА ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

Охрид, 2000.

302. Нека су x и y цели бројеви такви да је задовољена једнакост $x^3 + y^3 + (x + y)^3 + 30xy = 2000$. Доказати да је $x + y = 10$.

303. Наћи све целе бројеве n , $n \geq 1$, за које је $n^2 + 3^n$ квадрат целог броја.

304. Полукруг чији пречник EF припада страници BC троугла ABC додирује странице AB и AC редом у тачкама Q и P , као што је показано на слици. Доказати да пресечна тачка K дужи EP и FQ припада висини троугла ABC конструисаној из темена A .



Сл. уз задатак 304

305. На тениском турниру који је одржан на летњем кампу учествовало је два пута више дечака од девојчица. Сваки пар учесника је одиграо тачно једну партију (ниједна партија није завршена нерешено). Однос броја победа девојчица према броју победа дечака био је 7 : 5. Колико је учесника било на турниру?

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2001.

IV разред

306. Плетеном жицом треба оградити башту чије су странице 46 м и 54 м. При томе се на свака 2 м стављају стубови. Колико је потребно стубова и колико метара жице ако се по један стуб налази у сваком углу баште?

307. Површина школског дворишта је 3975 m^2 , а површина игралишта је 24 а. За колико квадратних метара је површина школског дворишта већа од површине игралишта?

308. Један од два сабирка је повећан за 222. Како треба променити други сабирац:

- (а) да би се збир повећао за 150; (б) да би се збир смањио за 50?

309. Од следбеника најмањег парног четвороцифреног броја одузети претходник највећег непарног троцифреног броја.

310. Написати најмањи и највећи седмоцифрени број чији је производ цифара једнак 96.

V разред

311. Нека је скуп $P = \{1, \{2, 3\}, 3\}$. Која тврђења су тачна: $\{1\} \in P$, $1 \in P$, $\{3, 2\} \in P$, $\{2, 3\} \subset P$, $\{\{2, 3\}\} \subset P$, $2 \in P$, $3 \in P$?

312. У равни је дато пет тачака од којих никоје три не припадају једној правој. Колико има дужи са крајевима у тим тачкама, а колико има троуглова са теменима у тим тачкама?

313. Мера угла α је $20^\circ 1'$, а мера угла β је $2001'$. Који од тих углова је већи и за колико?

314. Одредити цифру x тако да израз $13 \cdot \overline{16x} + 2001 \cdot 2000$ буде дељив са 12.

315. Одредити три узастопна природна броја тако да је њихов производ једнак 60.

VI разред

316. Ако је $x = -8$, $y = 3$ одредити вредност израза: $|xy - (-(-y))|$.

317. Висина куће је 11,2 м, а тополе $9\frac{3}{4}$ м. За колико треба да нарасте топола да би билавиша од куће за $2\frac{1}{2}$ м?

318. На страницама AB , BC и CA једнакостраничног троугла ABC дате су тачке A_1 , B_1 и C_1 , тако да је $AA_1 = BB_1 = CC_1$, и при чему је $AA_1 > A_1B$, $BB_1 > B_1C$, $CC_1 > C_1A$. Доказати да је $\triangle A_1B_1C_1$ такође једнакостраничен.

319. Одредити цифре a и b тако да број $\overline{20ab}$ буде дељив са 3 и 29, а да не буде дељив са 6.

320. За зимовање се пријавило $\frac{2}{9}$ ученика више него што је планирано. Пред полазак, због болести, $\frac{3}{11}$ пријављених је морало да одустане од пута, тако да је на зимовање отишло 8 ученика мање него што је планирано. Колико је планирано, а колико је ученика отишло на зимовање?

VII разред

321. Конструисати тачке бројевне праве којима се придржују бројеви: $3 + \sqrt{3}$ и $\sqrt{3} - 3$.

322. Који је број већи: 54^4 или 21^{12} ?

323. Правоугаоник $ABCD$ чије су странице $a = 6\text{ cm}$, $b = 3\text{ cm}$ и једнакостранични троугао ABE имају заједничку страницу $AB = a$ и налазе се са исте стране те странице. Израчунати обим и површину заједничког дела правоугаоника и једнакостраничног троугла.

324. Дата је једнакост $a\sqrt{2} + b = \sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} + 3$. Одредити целе бројеве a и b тако да дата једнакост буде тачна.

325. Једнакокраки троугао има крак дужине 6 см, а угао између кракова је 135° . Израчунати површину тог троугла.

VIII разред

326. У три цака има укупно 64,2 kg шећера. Ако у првом цаку има $\frac{4}{5}$ од количине схећера из другог цака, а у трећем цаку 42,5% од количине из првог цака, колика је маса шећера у првом цаку?

327. На колико начина три дечака и три девојчице могу да седну у један ред тако да особе истог пола не буду једна до друге?

328. Нека је CD висина која одговара хипотенузи правоуглог троугла ABC . Показати да је $CD^2 = AD \cdot BD$.

329. Дужине страница основе квадра су 7 см и 24 см, а дијагонала квадра захвата са основом квадра угао од 60° . Израчунати површину и запремину квадра.

330. Над сваком страницом правоугаоника $ABCD$, као над пречником, конструисани су споља полуокругови, а око правоугаоника је описан круг. Збир површина тако добијених полумесеца једнак је површини правоугаоника. Доказати.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2001.

IV разред

331. Умањилац је смањен за 4567. Како треба променити умањеник да би се разлика повећала за 1234?

332. У павиљонима је смештено 430 излетника. У првом је било 12 излетника више него у трећем, а у другом 14 излетника мање него у трећем, док је у четвртом био једнак број излетника као у трећем павиљону. Колико излетника је смештено у сваком павиљону?

333. Цртањем четири праве у равни круга, поделити дати круг на највећи могући број делова. Колико је то делова?

		16
13		17
	19	


334. У „једнакости“ $5 \cdot 4 + 26 : 2 + 1926 = 2001$ поставити заграде тако да се добије тачна једнакост.

335. Допунити магични квадрат тако да збир бројева у свакој колони, врсти и дијагонали буде једнак.

V разред

336. Нека је M скуп слова која чине реч МАТЕМАТИКА, а T скуп слова која чине реч ТАКМИЧЕЊЕ. Колико двочланих подскупова има пресек скупова M и T ?

337. Одредити колико природних бројева x испуњава услове $\frac{2}{29} < \frac{5x}{2001} < \frac{3}{23}$.



Сл. уз задатак 339

338. Одредити просте бројеве p и q ако је $2p + 3q = 100$.

339. У равни је дат троугао ABC и права n , паралелна правој AB , која садржи теме C . На основу података са слике одредити угао ACB .

340. Марија је имала 3, а Петар 5 чоколада. Њих двоје, заједно са Јеленом, поделили су све чоколаде на равне делове. Јелена је дала 80 динара Марији и Петру и на тај начин платила свој део чоколаде. Како ће Марија и Петар поделити 80 динара?

VI разред

341. Група од 18 деца је добила 150 кликера. Могу ли поделити кликере тако да сваком од њих припадне различит број кликера?

342. Описати речима конструкцију којом би се дати угао од 19° , поделио на деветнаест једнаких делова. (Напомена: конструкцијни поступак дозвољава употребу само шестара и лењира.)

343. Одредити вредност променљиве x у скупу целих бројева, тако да израз $\frac{3x-6}{9}$ има вредност мању од 1 и већу од 0.

344. У троуглу ABC са угловима $\angle ABC = 30^\circ$ и $\angle ACB = 15^\circ$, из темена A конструисана је нормала на страницу AC која сече страницу BC у тачки D . Доказати да је $CD = 2AB$.

345. Ђорђе је купио пун џеп чоколадица. Најпре је срео Ану и дао јој половину свих чоколадица и још пола од једне чоколадице. Затим је срео Бану и дао јој половину преосталих чоколадица и још пола од једне. На крају, када је срео Јелену и дао јој половину чоколадица које су му преостале и још пола од једне, џеп му је био празан. Колико је чоколадица купио Ђорђе?

VII разред

346. Израчунати вредност израза $\frac{3m^2 - 6m + 2}{m^2 + 3m + 2}$ за $m = -\frac{2}{3}$.

347. Конструисати квадрат K странице 3 см и квадрат K_1 , тако да за њихове површине P и P_1 важи: $P = \frac{3}{4}P_1$.

348. Поређати по величини бројеве: $-\frac{666}{667}, -\frac{1333}{1334}, -\frac{1998}{2001}$.

349. Низ од девет бројева се формира тако што је трећи број једнак први минус други, четврти је други минус трећи, пети је трећи минус четврти, итд. (Од трећег броја па надаље, сваки члан низа једнак је разлици двају претходних.) Зна се да је први члан број 40, а девети број 100. Исписати све чланове низа који недостају.

350. Израчунати обим ромба који има површину $\sqrt{8} \text{ cm}^2$ и чији се углови односе као $3 : 1$.

VIII разред

351. Решити једначину $x + |x - 1| = 2 - |x|$, а затим израчунати производ квадрата разлике и збира квадрата њених решења.

352. За које вредности променљиве x , израз $\frac{\frac{2}{3} - 3x}{-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}}$ има вредност већу од 1?

353. Кругови k_1 и k_2 секу се у тачкама A и B . Заједничка тангента их додирује у тачкама M и N . Израчунати збир углова $\angle MAN$ и $\angle MBN$ (углови садрже дуж MN).

354. Ако су a и b дужине основица трапеза, одредити дужину дужи паралелне основицама, која дели трапез на два дела једнаких површина.

355. Коцка ивице a пресечена је равни која садржи дијагоналу једне стране коцке и средишта двеју ивица супротне стране. Израчунати површину тог пресека.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2001.

IV разред

356. Колико цифара се употреби за нумерацију парних страница књиге која има 111 страница?

357. Када се једна страница правоугаоника смањи за 5 см, а друга повећа за 4 см, онда се добија квадрат чија је површина једнака површини правоугаоника. За колико је обим правоугаоника већи од обима квадрата?

358. Одредити најмањи паран природни број чији је збир цифара 60.

359. Једна тона обичне воде садржи 40 g соли, а у једној тони морске воде има 35 kg соли. Која количина обичне воде садржи онолико соли колико се добија испаравањем 200 g морске воде?

360. Дешифровати множење $* * \cdot * \cdot 9 = 2001$, тако што ће се уместо звездица ставити одговарајуће цифре. Колико различитих решења има?

V разред

361. Одредити најмањи природан број који је делив са 15 и код кога је збир цифара 15.

362. Један канап пресечен је на два дела, тако да је један његов део половина канапа увећан за 0,5 m. Затим је мањи део опет подељен тако да је одмерена његова половина и још 0,5 m, а преостали део канапа износи 1,5 m. Колика је укупна дужина тог канапа?

363. Дат је правоугаоник $ABCD$ ($AB > BC$). Нека је s симетрала $\angle BAD$, а D_1 тачка осносиметрична темену D у односу на праву s . Ако је $AD_1 = 4$ см и $D_1B = 7$ см, израчунати обим правоугаоника $ABCD$.

364. Неке стране дрвене коцке ивице a см ($a \in \mathbb{N}$) су обожене плавом бојом, а затим је коцка исечена на коцкице ивице 1 см. Ако 14 коцкица има по две обожене стране и не постоји ниједна коцкица са три обожене стране, колико коцкица нема обожену ниједну страну?

365. На рођендану је укупно 20 гостију, дечака и девојчица. Ана од раније познаје седморицу дечака, Весну осморицу, Тања деветорицу и тако даље све до последње, Лидије која познаје све присутне дечаке. Колико је дечака на рођендану?

VI разред

366. Решити једначину $||x| - 1| - 2000 = 0$.

367. Дат је оштроугли троугао ABC . Из темена A конструисане су дужи AD и AE тако да је $AD \perp AC$, $AD = AC$, $AE \perp AB$ и $AE = AB$, при чему су тачке D и E , као и тачке B и D са различитих страна праве AC . Доказати да је $BD = CE$.

368. Одредити све могуће вредности цифара a и b тако да је производ бројева $\overline{54a}$ и $\overline{63b1}$ делив са 12.

369. Нека је D произвољна тачка у унутрашњости оштроуглог троугла ABC и нека су M, N, P, Q редом средишта дужи AB, BC, CD, DA . Доказати да је четвороугао $MNPQ$ паралелограм.

370. Које године је рођен човек који је ове године напунио толико година колики је збир цифара године његовог рођења?

VII разред

371. Дат је израз $\sqrt{(\sqrt{5} - 3)^2} + \sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$. Да ли је алгебарска вредност датог израза рационалан или ирационалан број?

372. Колико има четвороцифрених природних бројева са различитим цифрама таквих да им је збир цифара једнак 10?

373. Правилан многоугао M има унутрашњи угао који је један и по пут већи од унутрашњег угла правилног многоугла M_1 . Одредити све парове таквих многоуглава M и M_1 .

374. Дат је правилан осмоугао $ABCDEFGH$ чија страница је 2 см. Одредити површину шестоугла $ABCDEF$.

375. Дијагонале AC и BD једнакокраког трапеза $ABCD$ ($AB \parallel CD$) секу се у тачки S тако да је $\angle ASB = 60^\circ$. Ако је M средиште дужи AS , N средиште дужи DS и P средиште дужи BC , доказати да је троугао MNP једнакостраничен.

VIII разред

376. Тест се састоји од 20 задатака. Сваки тачно решен задатак ученику доноси 8 поена, сваки погрешно решен задатак –5 поена, а сваки задатак који није решаван 0 поена. По завршетку теста ученик је сакупио 13 поена. Колико задатака је ученик тачно, а колико погрешно решио?

377. Дате су линеарне функције $f(x) = (2m - 0,5)x - 3$ и $g(x) = (7m + 2)x - 4$. Одредити вредности реалног броја m тако да:

- а) графици функција буду паралелни;
- б) $f(x)$ буде опадајућа, а $g(x)$ растућа функција.

378. Из тачке A која је 120 м удаљена од подножја вертикалног торња BC , врх торња C се види под углом α . Из тачке D , која је за 90 м ближа подножју торња B , врх торња се види под углом $90^\circ - \alpha$. Колика је висина торња?

379. Дата је тространа једнакоивична пирамида $SABC$. Нека је SS' висина пирамиде, а M средиште висине SS' . Доказати да је $\angle AMB = 90^\circ$.

380. Од 3 ученика шестог, 4 ученика седмог и 5 ученика осмог разреда треба формирати екипу од 4 члана коју чине тачно један ученик шестог разреда и бар један ученик седмог разреда. Колико има таквих екипа?

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2001.

VI разред

381. Маса пшенице је 4 250 kg, а њена влажност је 20%. После сушења пшенице, маса пшенице је смањена за 250 kg. Колика је (у процентима) влажност пшенице после сушења?

382. Природан број n при дељењу са 3 даје остатак a , при дељењу са 5 даје остатак b , а при дељењу са 7 даје остатак c . Доказати да је израз $70 \cdot a + 21 \cdot b + 15 \cdot c - n$ делив са 105.

383. У троуглу ABC симетрала угла α сече страницу BC у тачки A_1 , а симетрала угла β сече страницу AC у тачки B_1 . Ако се дужи AA_1 и BB_1 секу у тачки S и ако је угао $\gamma = 60^\circ$, онда је троугао A_1SB_1 једнакокрак. Доказати.

384. Конструисати трапез $ABCD$ ($AB \parallel CD$, $AB > CD$) ако су дати: збир основица $AB + CD$ једнак датој дужи s ; висина трапеза која одговара основици једнака датој дужи h_a ; оштри углови на основици трапеза једнаки редом α и β .

385. Мајка је за излет својој деци спремила три врсте воћа: крушке, јабуке и брескве. Сваком детету је на непрозирној корпици коју је добио залепила и налепницу са његовим именом. Потом је деци саопштила да је Ђорђу спремила 2 крушке и 3 јабуке, Рајку 3 јабуке и 1 брескву, а Пери 3 брескве. Док се Пера купао на реци, Ђорђе и Рајко су заменили налепнице на корпама, тако да ниједна налепница није остала на свом месту. Колико најмање воћа и из којих корпи треба да извуче Пера не завирујући у корпе, да би налепнице потпуно тачно вратио на своја места?


VII разред

386. Најмањи заједнички садржалац два броја је за 20 већи од њиховог највећег заједничког делиоца. Одредити та два броја.

387. Дат је израз $\frac{2^{17} + 2^{16} + \dots + 2^2 + 2^1 + 1}{2^8 + 2^7 + \dots + 2^2 + 2^1 + 1} : 3^3$. Доказати да је вредност датог израза цео број.

388. Дат је једнакостранични троугао ABC и тачка M на страници AB . Над дужи CM конструисан је једнакостранични троугао CMN , при чему су тачке M и N са различитих страна дужи BC . Доказати да су дужи AC и BN паралелне.

389. Дат је правоугаоник $ABCD$ (видети слику). Ако је на слици $a + c = b + d$, онда је збир белих површина са леве стране дијагонале AC једнак збиру белих површина са десне стране дијагонале AC . Доказати.



Сл. уз задатак 389

390. Лека је на табли написао 55 различитих двоцифрених природних бројева, тврдећи да међу њима не постоје два чији је збир 100. Јарко је, не проверавајући, рекао да је то немогуће. Ко је у праву, Лека или Јарко?

VIII разред

391. Наставница је поређала у врсту 20 ученика и поделила им 800 бомбона. Сваки ученик је добио задатак да израчуна количник $\frac{x}{x + 2k - 1}$, где је x број бомбона које је добио, а k редни број свог места у врсти. Испоставило се да су ти количници за свих 20 ученика били једнаки. Колико бомбона је добио ученик који је био дванаести у врсти?

392. На шаховском турниру свако игра са сваким по једну партију. Такмичари су мајстори и велемајстори. На крају турнира се испоставило да су сви велемајстори победили све мајсторе и у тим партијама сакутили половину поена који се могу добити на целом турниру. Ако у свакој партији победник добија 1 поен, поражени 0 поена, а у случају ремија (нерешеног исхода) оба играча добијају по пола поена, доказати да је број учесника турнира квадрат неког природног броја.

393. Правилна троstrана пирамида $ABCS$, основне ивице a и висине H пресечена је са равни која садржи средишта основних ивица AB и AC и паралелна је са бочном ивицом AS . Израчунати обим и површину пресека.

394. Дата је четвртина круга одређена међусобно нормалним полупречницима OA и OB . Права p паралелна са тетивом AB сече лук AB у тачки C (тачка C је једна од две пресечне тачке), а продужетке дужи OA и OB у тачкама P и Q . Доказати да је $AB^2 = PC^2 + QC^2$.

395. По кругу треба распоредити цифре 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Да ли је могуће направити такав распоред да збир сваке три узастопне цифре:

Ако је могуће, навести по један пример таквих распореда.

САВЕЗНО ТАКМИЧЕЊЕ 2001.

VI разред

396. Ако се прва цифра природног броја a премести на последње место добија се природан број b који је три пута мањи од a . Доказати да је број a делив са 27.

397. Колико пута ће се од поноћи до подне поклопити велика и мала казалька на сату, не рачунајући поноћ, а рачунајући подне? Израчунати времена тих поклапања.

398. У оштроуглом троуглу ABC , са $\angle ACB = 60^\circ$, тачке A' и B' су редом подножја висина троугла из темена A и B , а тачка C_1 је средиште странице AB . Доказати да је троугао $A'B'C_1$ једнакостраничен.

399. Нека су P , Q , R и S редом средишта страница AB , BC , CD и DA конвексног четвороугла $ABCD$. Тачка M је унутар тог четвороугла, таква да је $APMS$ паралелограм. Доказати да је тада и $MQCR$ такође паралелограм.

400. Брачни пар Мирко и Љубица позову на вечеру своје пријатеље, три брачна пара. Попут су сви стигли истовремено, почели су да се рукују, при чему се свако руковао са неколико људи, а нико се није руковао са својим брачним другом. Када су завршили са руковањем, Мирко је питао сваког (и Љубицу) колико пута се руковао. Добио је седам различитих одговора. Са колико се људи рукovala Љубица?

VII разред

401. Постоје ли природни бројеви a , b и c , такви да важи једнакост $(a+b)(b+c)(c+a) = 340$?

402. Постоје ли природни бројеви m и n , такви да су бројеви $m^2 + n$ и $n^2 + m$ квадрати природних бројева?

403. Страница AB конвексног четвороугла $ABCD$ је два пута већа од странице CD . Дијагонала AC нормална је на страницу BC , а дијагонала BD нормална је на страницу AD . Одредити угао између дијагонала четвороугла.

404. Дат је правоугли троугао ABC , где је C теме правог угла, а D подножје хипотенузине висине. Нека су r , r_1 и r_2 редом полупречници кругова уписаних у троуглове ABC , ACD и BCD . Доказати да је $r + r_1 + r_2 = CD$.

405. Грађани града A увек говоре истину, грађани града B увек говоре лажи, а сваки грађанин града C наизменично говори истину и лаж. Дежурни ватрогасац је телефоном примио поруку из једног од ових градова: „Код нас је пожар“, јавио је један грађанин. „Где?“, питао је дежурни ватрогасац. „У граду C “, одговорио је исти грађанин. У који град треба да оде ватрогасна екипа?

VIII разред

406. Дато је 2001 различитих бројева таквих да ако се сваки од њих замени са збиром осталих добија се исти скуп бројева. Одредити производ датих бројева.

407. Дат је скуп $\{1, 2, \dots, n\}$. Овај скуп је разбијен на два подскупа, тако да први подскуп садржи тачно три елемента, означимо их са a , b и c , а сви остали елементи чине други подскуп. Да ли је могуће да вредност израза $ab+bc+ca$ буде једнака разлици производа елемената првог подскупа и збира елемената другог подскупа, ако је:

$$\text{a)} n = 12; \quad \text{б)} n = 17?$$

408. Дат је једнакостранични троугао ABC чија је површина 7 cm^2 . На страницама AB , BC и CA дате су редом тачке P , M и N , тако да је $AP : PB = BM : MC = CN : NA = 2 : 1$. Праве AM , BN и CP секу се у тачкама Q , R и S . Одредити површину троугла QRS .

409. Обим троугла ABC је $2s$. Тангента на кружницу уписану у дати троугао, која је паралелна страници AB , сече странице AC и BC редом у тачкама D и E . Колику највећу вредност може имати дужина дужи DE ?

410. Темена коцке нумерисана су са осам различитих бројева из скупа $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Збирни бројеви којима су нумерисана темена на истој страни коцке су међусобно једнаки и нису дељиви бројем из скупа S , који не учествује у нумерацији. Одредити број из скупа S који не учествује у нумерацији.

ПЕТА ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

Кипар, 2001.

411. Наћи све природне бројеве a, b, c такве да је $a^3 + b^3 + c^3 = 2001$.

412. Дат је $\triangle ABC$, код кога је $\angle ACB = 90^\circ$, $AC \neq BC$, а тачке L и H су на страници AB такве да је $\angle ACL = \angle LCB$, а CH је висина на AB . Доказати:

- (а) за сваку тачку X на дужи CL важи $\angle XAC \neq \angle XBC$;
- (б) за сваку тачку X на дужи CH важи $\angle XAC \neq \angle XBC$.

413. Дат је једнакостранични $\triangle ABC$. Нека су D и E произвољне тачке на страницима AB и AC , редом. Ако су DF и EG симетрале углова $\triangle ADE$, где је $F \in AE$ и $G \in AD$, докажи да је збир површина $\triangle DEF$ и $\triangle DEG$ не већи од површине $\triangle ABC$. Објаснити када важи једнакост.

414. Дат је конвексан многоугао са 1415 страница и обимом од 2001 см. Доказати да постоје три темена овог многоугла, која образују троугао чија је површина мања од 1 cm^2 .

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2002.

IV разред

415. Бранко је у једној кутији имао 256 маркица, а у другој 252. У албум је ставио четвртину маркица из прве и трећину из друге кутије. Колико је маркица Бранко ставио у албум, а колико му је остало у свакој кутији?

416. Одреди број који је мањи од 25432 за толико за колико је број 658 мањи од 1024.

417. Збир обима три једнака правоугаоника износи 540 см. Израчунај:

- (а) половину обима једног правоугаоника;
- (б) дужину једног од ових правоугаоника ако му је ширина 40 см.

418. Ана је записала прва 2002 природна броја један за другим,
123456789101112 ... 200020012002. Колико је укупно цифара записала?

419. Петар и Павле треба да поделе 2002 динара, тако да Петар добије 6 пута више новца од Павла. Колико новца ће добити Петар, а колико Павле?

V разред

420. Одреди све троцифрене бројева дељиве са 15 код којих је цифра јединица једнака цифри стотина.

421. 120 ученика су на тесту решавали два задатка. Први задатак је решило 65 ученика. 70 ученика није решило други, а 20 ученика је решило оба задатка. Колико ученика је решило тачно један задатак?

422. Ако би пут био дугачак онолико m^m колико у m^3 има mm^3 , за које време би тај пут прешло возило које за 1 h пређе 50 km?

423. У равни α су дате праве p и q које се секу у тачки A . Колико је полуравни одређено на тај начин? Које су то полуравни?

424. Мера угла $3\alpha - \beta$ је за $63^\circ 45' 36''$ мања од мере угла $3\alpha + 2\beta$ и за $74^\circ 37' 16''$ већа од мере угла $\alpha - \beta$. Наћи мере углова α и β .

VI разред


425. Висина куће је $12\frac{3}{4}$ m, а тополе 8,7 m. Колико би требало да израсте топола, да би била виша од куће за 3,9 m?

426. Одредити вредност израза $|mn - (-(-n))|$ за $m = 8$ и $n = -4$.

427. Нека симетрала s странице AB троугла ABC сече страницу BC у тачки D . Ако је $\angle CAB = 73^\circ 28' 40''$, а $\angle ABC = 43^\circ 33' 20''$, колики је $\angle CAD$?

- 428.** Дате су праве r , s и t при чему је $t \parallel s$ и r сече t и s (слика). Одредити тачке R и T ($R \in r$, $T \in t$) тако да буду симетричне у односу на праву s .

- 429.** Нека је n природан број већи од 1. Збир n узастопних целих бројева је 2002. Одредити најмање такво n .



Сл. уз задатак 428

VII разред

- 430.** Израчунај $\sqrt{\left(\frac{1}{x} - x\right)^2}$ ако је $\frac{1}{x} = \sqrt{0,04}$.

- 431.** Израчунај $\frac{2^{3x} \cdot 3^{2x}}{6^x}$, $x \in \mathbb{N}$.

- 432.** Конструисати квадрат K_1 странице 3 см и квадрат K тако да је површина квадрата K једнака половини површине квадрата K_1 .

- 433.** Израчунај површину и обим правоуглог троугла ако је дата једна катета $b = 3$ см и тежишна дуж која одговара тој катети $t_b = 2,5$ см.

- 434.** У полукруг попречнича $r = 8$ см уписан је правоугаоник (два темена припадају луку, а два пречнику) чија је мања странница $b = 4$ см. Израчунај обим правоугаоника ако:

- (а) једна од мањих странница правоугаоника припада пречнику полукруга;
 (б) ниједна од мањих странница правоугаоника не припада пречнику полукруга.

VIII разред

- 435.** За коју вредност променљиве x израз $13 - \frac{5}{2 + (0,3 + x)^2}$ има најмању вредност?

- 436.** Око једнакокраког троугла основице 4 см и угла при врху 30° описана је кружница. Израчунај дужину кружног лука који одговара краку троугла.

- 437.** Ако се дужина квадра повећа за 25%, ширина за своју трећину и висина смањи за 10%, како се мења запремина?

- 438.** На кружници пречника 8 см нанеси редом лукове $AB = 90^\circ$, $BC = 60^\circ$ и $CD = 120^\circ$. Израчунај површину четвороугла $ABCD$.

- 439.** Може ли разлика квадрата два природна броја бити 2002?

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2002.

IV разред

- 440.** Два аутомобила крећу се у сусрет један другом. Један прелази 76 km/h а други 12 km/h више од првог. Колико ће бити удаљени један од другог 3 часа после сусрета?

441. У једном руднику раде рудари у три смене. У првој смени ради 126 рудара, у другој 42 рудара више него у првој, а у трећој половина збира рудара прве две смене. Колико рудара ради у трећој смени?

442. Правоугаоник чији је обим 2002 cm подељен је правом која је паралелна мањој његовој страници на један квадрат и један правоугаоник. Колики је обим мањег правоугаоника ако је обим квадрата 1000 cm?

443. Мирослав је записивао природне бројеве један за другим,
123 ... 9101112 Коју је цифру записао на 2002. месту?

444. Збир два броја је 825. Када се већи подели мањим, количник је 8, а остатак 15. Који су то бројеви?

V разред

445. Ако је $A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A \cap B \cap C = \{1, 2\}$, $B \setminus C = \{4, 5\}$ и $C \setminus A \neq \emptyset$, одредити скуп C .

446. Одредити природан број n и прост број p тако да важи $\frac{n}{2002} = \frac{1}{p}$.

447. Укупна запремина једног квадра и четири коцке је 2002 cm^3 . Зна се да су ивице квадра 2 cm, 5 cm и 91 cm, а ивица једне од коцки је 10 cm. Колике су ивице преостале три коцке ако се зна да су им мерни бројеви неки природни бројеви?

448. На страницама троугла уочене су тачно по две тачке. Одредити број правих одређених са тих шест тачака, а које не пролазе кроз темена троугла.

449. Наћи $n \in \mathbf{N}$ тако да буде $n \cdot (n + 1) \cdot (2n + 1) = 180$.

VI разред

450. Одредити све целобројне вредности променљиве x у изразу $\frac{20}{-5x + 10}$ тако да израз има вредност већу од 1.

451. Спољашњи угао једнакокраког троугла је:

- (а) 121° , (б) 65° .

Одредити унутрашње углове тог троугла. (Размотрити све могућности.)

452. У равни квадрата $ABCD$ је дата тачка M тако да су дужи CM и DM подударне. Доказати да су углови DAM и MBC једнаки.

453. Лопта која слободно пада сваки пут од скочи од земље до висине за $\frac{3}{5}$ мање од висине са које пада. Ако је у трећем од скоку достигла висину од 32 cm, наћи дужину пута који ће лопта прећи до момента када четврти пут додирне земљу.

454. На колико начина се број 2002 може написати као производ три природна броја од којих хе први једноцифрен, други двоцифрен и трећи троцифрен број? Исписати све могућности.

VII разред

455. Наћи цифру која је на 2002. децималном mestу броја $\frac{13}{101}$.

456. Израчунај вредност израза

$$\left(\sqrt{625} + 3 \cdot \sqrt{(-12)^2} \right) : \left(\frac{2}{5} \cdot \sqrt{0,25} + 0,58 \cdot \sqrt{100} \right).$$

457. Један угао правоуглог троугла је 60° а висина која одговара хипотенузи је $2\sqrt{3}$ см. Израчунај обим и површину тог троугла.

458. Странице правоуглог троугла су 3 см, 4 см и 5 см. Постоји ли тачка у унутрашњости троугла која је од сваке странице удаљена мање од 1 см?

459. Постоје ли прости бројеви p, q, r ($p \neq q \neq r$) такви да је $pq + qr + rp = 2002$?

VIII разред

460. Одреди све рационалне бројеве a који задовољавају неједначину $\frac{3a - 2}{a + 1} < 0$.

461. Дати једнакокрако-правоугли троугао поделити са четири праве на три подударна квадрата и три подударна троугла.

462. Коцка је исечена известан број пута паралелно једној страни. Укупна површина добијених делова је 2002 пута већа од површине полазне коцке. Колико пута је коцка расечена?

463. Дата је полукружница пречника $AB = 8$. Полукружница је тачкама C и D подељена на три подударна лука. Израчунати површину фигуре ограничene дужима AC и AD и луком CD .

464. Имамо 12 штапова, сваки дужине 13. Треба их исећи на делове дужине 3, 4, 5 тако да се од добијених делова може направити 13 троуглова, сваки са страницама дужине 3, 4 и 5. Како треба исећи штапове?

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2002.**IV разред**

465. Површина једног винограда облика правоугаоника је 67200 m^2 . Дужина баште је 5 пута мања од дужине винограда, а ширина баште је 6 пута мања од ширине винограда. Колика је површина баште?

466. На једном турниру учествовало је 8 екипа подељених у две групе по 4 екипе. У првом кругу играла је свака екипа са сваком у својој групи по једну утакмицу. Победници група играли су још једну утакмицу за победника турнира. Колико је укупно одиграно утакмица на турниру? Објасните.


467. Парне странице једне књиге су нумерисане са 1234 цифре. Колико та књига има листова ако је последња нумерисана страница парна?

468. За четвороцифрени број кажемо да је леп ако је написан са две цифре 5 и две цифре 4. Наћи најмању и највећу разлику два различита лепа четвороцифрена броја.

469. Дешифровати сабирање на десној страни

$$\begin{array}{r}
 & A \\
 & AB \\
 & ABC \\
 + & ABCD \\
 \hline
 2002
 \end{array}$$

V разред



Сл. уз задатак 472

470. Ако од броја x одузмемо збир бројева $3\frac{1}{5}$ и $\frac{7}{8}$, та разлика је већа од разлике бројева $3\frac{1}{5}$ и $\frac{7}{8}$. Одредити све такве x .

471. Израчунај збир свих природних бројева који при дељењу са 7 дају количник једнак остатку.

472. Подели дату фигуру на четири подударна дела и израчунај обим и површину једног од тих делова.

473. У једном одељењу на свака 3 дечака „долазе“ 2 девојчице. Ако би се том одељењу прикључила шесторица дечака, онда би дечака било двоструко више него девојчица. Колико је дечака а колико девојчица било у том одељењу?

474. Дата је дуж AB и симетрала s те дужи, која сече AB у тачки S . Ван дужи AB , а на симетрали s_1 дужи BS дата је тачка M . Користећи само ленђир конструисати праву која садржи M и нормална је на s . Објаснити поступак конструкције.

VI разред

475. У правоуглом троуглу угао који граде висина и тежишна дуж које одговарају хипотенузи је мере 24° . Колики угао образују симетрала правог угла и тежишна дуж која одговара хипотенузи?

476. Наћи три различита цела броја a, b, c тако да је $abc = 2002$ и да је збир $|a| + |b| + |c|$ највећи могући.

477. Разломак $\frac{179}{140}$ представити као збир три разломка са једноцифреним имениоцима.

478. Конструисати троугао ABC ако је страница $BC = 6$ см, тежишна дуж $t_b = 5$ см и висина $h_a = 4$ см.

479. Одредити колико најмање пута треба редом исписати број 2002 један за другим да би се добио број делив са 66 и у том случају одредити количник.

VII разред

480. Два чиниоца се разликују за 5. Ако сваки чинилац повећамо за 7, производ се повећа за 364. Израчунај чиниоце.

481. Израчунати површину правилног дванаестоугла чија је највећа дијагонала 2 cm.

482. У унутрашњости троугла са странницама дужине 6 cm, 8 cm и 10 cm уочене су четири произвољне тачке. Доказати да међу њима постоје бар две које се налазе на растојању мањем од 5 cm.

483. Ако се после 2002. децималног места броја $\frac{1}{14}$ изостави 99 цифара (наредних децималних места), да ли ће добијени број бити мањи од $\frac{1}{14}$? Одговор образложити.


484. За које реалне вредности a, b, c важи

$$\frac{a^{2002} + b^8 + c^6 + 1}{2} = a^{1001} + b^4 - c^3 - 1 ?$$

VIII разред

485. Дата је коцка $ABCDA_1B_1C_1D_1$ ивице дужине a . Ако су E, F, G, H, I, J средишта ивица $AB, BC, CC_1, C_1D_1, D_1A_1, A_1A$ (слика), наћи површину пирамиде са врхом B_1 и основом $EFGHIJ$.

486. Колико има четвороцифрених бројева чије су све цифре различите, а да се прва и последња цифра разликују за два?



Сл. уз задатак 485

487. Једначином $26|x| + 154|y| = 2002$ је у xOy -равни одређен један паралелограм. Наћи његову површину.

488. Доказати да је број $1999 \cdot 2000 \cdot 2001 \cdot 2003 \cdot 2004 \cdot 2005 + 36$ потпун квадрат.

489. Дат је квадрат $ABCD$. Тачка E је средиште странице BC . Ако је тачка F на страници CD тако да је дуж EF нормална на AE , доказати да је $\angle EAB = \angle FAE$.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2002.

VI разред

490. Производ једног двоцифреног и једног троцифреног броја је број који се у декадном систему записује помоћу неколико цифара 2. Одредити све такве двоцифрене и њима одговарајуће троцифрене бројеве.

491. Симетрале унутрашњег и спољашњег угла код темена C троугла ABC секу праву AB у тачкама M и N . Ако је троугао MNC једнакокрак и угао ACB седам пута већи од угла ABC , израчунати све унутрашње углове троугла ABC .

492. Доказати да је

$$\frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 8} + \cdots + \frac{1}{2000 \cdot 2002} < \frac{1}{4}.$$

493. На страници CD квадрата $ABCD$ дата је тачка M . Симетрала угла BAM сече страницу BC у тачки N . Доказати да је $AM = DM + BN$.

494. Доказати да међу 30 узастопних природних бројева, од којих је најмањи већи од 5, има највише 8 простих.

VII разред

495. Ако су m и n било која два троцифрена броја, доказати да тада број m^n има мање од 3000 цифара.

496. Доказати да је у правилном деветоуглу разлика дужина најдуже и најкраће дијагонале једнака дужини странице деветоугла.

497. Ако је $a^2 + b^2 = (a + b - c)^2$, где је $b \neq c$ и $a + b - c \neq 0$, тада је

$$\frac{a^2 + (a - c)^2}{b^2 + (b - c)^2} = \frac{a - c}{b - c}.$$

Доказати.

498. У правоугаонику $ABCD$ тачка M је средиште дужи AB , а E пресек дијагонале AC и дужи DM . Ако је $AB = \sqrt{2}$ и $BC = 1$, доказати да је тада $\angle CED$ прав.

499. Сви природни бројеви од 1 до 10 написани су један за другим у произвољном поретку. Испод сваког од тих 10 бројева написан је његов редни број (испод првог 1, испод другог 2 итд.), а затим су сабрани бројеви који се налазе један испод другог. Доказати да се бар два од тако добијених десет бројева (збирова) завршавају истом цифром.

VIII разред

500. Наћи сва целобројна решења једначине $2^x + 1 = y^2$.

501. У квадрат је уписан правоугаоник тако што су странице тог правоугаоника паралелне дијагоналама квадрата, а темена тог правоугаоника су на страницама квадрата. Наћи највећу могућу површину на тај начин уписаног правоугаоника ако је страница квадрата 5 cm.

502. 20 жутих и 30 зелених робота направе 80 аутомобила за 4 дана, а 50 жутих и 40 зелених робота направе 230 аутомобила за 6 дана. Колико аутомобила направи 160 жутих и 180 зелених робота за 8 дана?

503. Нека је $OABC$ пирамида чије су ивице OA , OB и OC међусобно нормалне. Доказати да је

$$(P_{\triangle ABC})^2 = (P_{\triangle OAB})^2 + (P_{\triangle OBC})^2 + (P_{\triangle OCA})^2.$$

504. Квадрат је са 9 правих паралелних једној и 9 правих паралелних другој страници подељен на 100 правоугаоника од којих су тачно 9 квадрати. Доказати да су од тих 9 квадрата бар два подударна.

САВЕЗНО ТАКМИЧЕЊЕ 2002.

VI разред

505. Нека су A_1 , B_1 , C_1 средишта страница BC , CA и AB троугла ABC . Ако је D подножје висине из темена C и $AC \neq BC$, доказати да су тачке A_1 , B_1 , C_1 и D темена једнакокраког трапеза.

506. Нека је $ABCD$ квадрат, ABF једнакостранични троугао у спољашњости квадрата и BCE једнакокраки троугао у спољашњости квадрата са основицом BC и углом при врху од 30° .

- (а) Доказати да је троугао FCE једнакокрако-правоугли.
- (б) Одредити углове троугла FBE .

507. Одредити све просте бројеве n , такве да скуп $\{n+2, n^2+4, 6n+1, n^3+2\}$ садржи само просте бројеве.

508. Одредити најмањи природан број који је делјив са 4 и чији је збир цифара једнак 2002.

509. Колонију од 200 бактерија напао је један вирус. У току првог минута вирус уништи једну бактерију, а затим се он подели на два нова вируса и свака од преосталих бактерија се подели на две нове. У следећем (другом) минуту два вируса униште две бактерије, сваки по једну, а затим се сваки од њих подели на два вируса и свака од преживелих бактерија се подели на две бактерије. Процес се даље наставља на исти начин. Колико времена треба да вируси униште све бактерије?

VII разред

510. Нека је α унутрашњи угао правилног m -тоугла, а β унутрашњи угао правилног n -тоугла. Одредити све парове (m, n) ако је $\alpha : \beta = 2 : 3$.

511. У свакој од три посуде запремине 61 налази се 41 боје. У различитим посудама су различите боје. Дозвољено је пресипати из једне посуде у другу цео број литара (посуде су баждарене на литре). Како постићи да у све три посуде буде иста мешавина? (Других посуда нема, а боја се не сме просипати.)

512. Нека је $S(n)$ збир цифара природног броја n . Одредити n ако је:

$$(a) n + S(n) = 2002; \quad (b) n + S(n) + S(S(n)) = 2002.$$

513. Нека је $A_1A_2\dots A_9$ правилан деветоугао, O центар њему описане кружнице, M средиште странице A_1A_2 , N средиште мањег лука A_2A_3 и S средиште дужи ON . Израчунати угао OMS .

514. Нека су $AB = 4$, $BC = 8$, $CD = 13$ и $DA = 11$ странице конвексног четвороугла $ABCD$. Израчунати угао између његових дијагонала AC и BD .

VIII разред

515. Ако су x , y и z реални бројеви за које важи

$$x^2 + 2yz = x, \quad y^2 + 2zx = y, \quad z^2 + 2xy = z,$$

доказати да је $\left| |x + y + z| - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$.

516. Одредити све парове природних бројева (m, n) за које $\left| \frac{m}{77} - \frac{n}{13} \right|$ има најмању могућу позитивну вредност.

517. Висина трапеза $ABCD$ је 4, а његове основице су $AB = 7$ и $CD = 5$. Тачка K припада дужи AB и важи $AK = 3$, L је средиште дужи AD , а M је пресечна тачка дужи CK и BL . Израчунати површину четвороугла $LMCD$.

518. Дата је коцка $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Колико пута је запремина коцке већа од запремине заједничког дела тетраедара ACB_1D_1 и BDA_1C_1 ?

519. Нека је $S(m)$ збир цифара природног броја m . Низ бројева формира се на следећи начин: $a_1 = n$, где је n неки природан број и

$$a_2 = a_1 - S(a_1), \quad a_3 = a_2 - S(a_2), \quad \dots$$

Ако је a_{13} први члан у низу који је једнак нули, одредити n .

ШЕСТА ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

Тргу-Муреш (Румунија), 2002.

520. Нека је ABC троугао, такав да је $AC = BC$ и нека је P тачка на оном луку AB описане кружнице на коме се не налази тачка C . Нека је D тачка на правој PB тако да је права CD нормална на PB . Доакзати да је $PA + PB = 2PD$.

521. Две кружнице k_1 и k_2 различитих полупречника имају заједнике тачке A и B и њихови центри O_1 и O_2 су са различитих страна праве AB . Нека су B_1 и B_2 дијаметрално супротне тачке тачки B на одговарајућим кружницама k_1 и k_2 . Тачке M_1 на k_1 и M_2 на k_2 су изабране тако да је $\angle AO_1M_1 = \angle AO_2M_2 < 180^\circ$ и да је B_1 у унутрашњости $\angle AO_1M_1$, а B у унутрашњости $\angle AO_2M_2$. Тачка M је средиште дужи B_1B_2 . Доказати да је $\angle MM_1B = \angle MM_2B$.

522. Наћи све природне бројеве N који имају следеће особине:

- (а) N има тачно 16 делилаца $1 = d_1 < d_2 < \dots < d_{15} < d_{16} = N$;
- (б) делилац са индексом d_5 (тј. d_{d_5}) једнак је $(d_2 + d_4)d_6$.

523. Нека су a, b, c позитивни бројеви. Доказати да је

$$\frac{1}{b(a+b)} + \frac{1}{c(b+c)} + \frac{1}{a(c+a)} \geq \frac{27}{2(a+b+c)^2}.$$

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2003.

IV разред

524. У пет судова било је 256 литара млека. Када је из првог суда изливено 12 литара, а из другог 19 литара, у свих пет судова налазила се иста количина млека. Колико је литара млека било у сваком суду пре изливања млека из прва два суда?

525. У правоугаоник дужине 8 см и ширине 6 см уцртан је други правоугаоник чије су странице паралелне и на растојању 1 см од страница првог правоугаоника. За колико је обим првог правоугаоника већи од обима другог?

526. Железничка пруга пролази кроз три тунела. Дужина првог и другог тунела је 1440 m, дужина првог и трећег тунела је 1350 m, а дужина другог и трећег тунела је 1520 m. Колика је дужина сваког од тунела?

527. За колико је збир парних бројева треће стотине већи од збира непарних бројева треће стотине?


528. Ако за четвороцифрене бројеве чији је збир цифара четири кажемо да су „четвртасти“, нађи највећу могућу разлику између два „четвртаста“ броја.

V разред

529. Дужине страница правоугаоника, мерених у центиметрима, изражавају се природним бројевима. Површина правоугаоника је 24 cm^2 . Колико таквих неподударних правоугаоника постоји?

530. Ако за углове α , β и γ важи да је $\alpha + \beta = 90^\circ$, $\alpha + \gamma = 180^\circ$ и α је трећина разлике углова γ и β , израчунати $\alpha + \beta + \gamma$.

531. При дељењу неким природним бројем k бројева 73, 92 и 111 добијени су редом остаци 1, 2 и 3. Нађи највећи такав број k .



Сл. уз задатак 532

532. Израчунати меру непознатог угла α датог на слици ако су праве a и b паралелне.

533. На тесту из математике је било 20 задатака. За сваки тачно урађен задатак добија се три бода, а за неурађен или нетачно урађен одузима се један бод. Ако је Петар на тесту добио 36 бодова, колико задатака је тачно урадио?

VI разред

534. Симетрала крака AC једнакокраког троугла ABC (са врхом C) сече други крак у тачки D и праву AB у тачки E . Ако је $\angle ACB = 30^\circ$, израчунати углове троугла BED .

535. Који број треба одузети од разлике бројева $5\frac{1}{4}$ и $6,2$ да би добијена разлика била мања од збира тих бројева?

536. Решити једначину $(3|x| + 6) \cdot (2|x| - 6) = 0$.

537. Наћи просте бројеве p и q за које важи $p = q^2 - 1$.

538. Нека је O центар уписане кружнице у троугао ABC . Права која садржи тачку O и паралелна је са страницом AB сече странице CA и CB редом у тачкама K и L . Доказати да је $KL = AK + LB$.

VII разред

539. Израчунати $\frac{(-0,2)^8 \cdot (-0,2)^7}{((-0,2)^6 : (-0,2)^4) \cdot (-0,2)^{10}}$.

540. Нека је T тежиште троугла ABC са правим углом код темена C . Наћи површину и обим тог троугла ако је $CA = 24$ cm, а $BT = 10$ cm.

541. Ако се зна да су $\sqrt{5}$ и $\sqrt{3}$ ирационални бројеви, доказати да је и $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ ирационалан број.

542. У правоугли троугао чије су катете 21 cm и 28 cm упиши квадрат чије су две странице на катетама и четврто теме на хипотенузи. Израчунати дужине одсечака на које теме квадрата дели хипотенузу.

543. Шта је веће: 2003^{2002} или $2002^{2002} + 2002^{2001}$?

VIII разред

544. Тачке A и B су са разних страна равни π . Израчунати дужину дужи AB ако се зна да је $A'B' = 3$ cm, $AA' = 1$ cm и $BB' = 3$ cm где су A' и B' ортогоналне пројекције тачака A и B на раван π .

545. Једна трећина робе продата је са зарадом од 10%, једна четвртина са зарадом од 15%, а остатак са губитком од 5%. Израчунати набавну цену робе, ако је укупном продајом остварена добит од 2400 динара.

546. Дата је коцка $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Дуж која спаја центар O основе $ABCD$ са теменом A_1 сече дијагоналу коцке AC_1 у тачки P . Дужина одсечка OP је $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Колика ја површина коцке?

547. Израчунати $2^{20} - \sqrt{(1 + 2^{11} + 2^{20})(1 - 2^{11} + 2^{20})}$.

548. Решити једначину $| |x + 3| - 3 | = x + 8$.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2003.

IV разред

549. Површина пода једне дворане је $60\text{ m}^2 54\text{ dm}^2$. Колика је површина ходника који је 6 пута ужи и 4 пута дужи?

550. Странице два квадрата разликују се за 6 см, а њихове површине за 96 cm^2 . Израчунати обим мањег квадрата.

551. Пре 16 година Владе Дивац је био три пута старији од Милоша Вујанића. Колико година сада има Владе Дивац, а колико Милош Вујанић, ако је Владе Дивац 12 година старији од Милоша Вујанића?

552. Одредити разлику најмањег непарног четвороцифреног броја чији је збирцифара 4 и највећег парног троцифреног броја чији је производ цифара 16.

553. Сваком од троје деце мајка је дала исти број поморанџи. Када су деца појела по четири поморанџе, остало им је укупно онолико колико је добило свако дете. Колико је поморанџи добило свако дете?

V разред

554. Нађи најмањи троцифрен број чији скуп делилаца има

- (а) 3 элемента, (б) 4 элемента.

555. Ако су углови α и β комплементни, α и γ суплементни и β је шест пута мањи од γ , израчунати $\alpha + \beta + \gamma$.

556. Дате су две паралелне праве. На једној од њих се налази пет, а на другој три тачке. Колико различитих троуглова одређује тих осам тачака?

557. Када је Аца потрошио 20 динара и половину суме коју је понео, остало му је 30 динара и трећина суме коју је понео. Колико новца је Аца понео?

558. Нека је са X означен скуп слова речи МАТЕМАТИКА, а са Y скуп слова речи ПОЗОРИШТЕ. Одредити скуп S ако је

$$S \subset Y, \quad (X \cap Y) \setminus S = \emptyset \quad \text{и} \quad (Y \setminus X) \cap S = \{\Pi\}.$$

VI разред

559. Решити једначину

$$0,4 \left(\frac{2}{3}x - 1 \right) + \frac{3}{5} = \left(-2\frac{1}{4} \right) : 0,9 .$$

560. Права којој припада тежишна дуж која одговара краку једнакокраког треугла, дели обим тог треугла на два дела. Један је 15 см, а други 12 см. Израчунати дужине страница тог треугла.

- 561.** Решити у скупу \mathbf{Z} неједначину $|x - 3| \leq 3 - x$.
- 562.** У једнакокраком троуглу ABC ($AC = BC$) чији је обим 2003 см угао под којим се секу висине које одговарају основици и краку је 58° . Доказати да је основица већа од 667 см.
- 563.** На две гомиле се налазе кликери тако да се број кликера на првој гомили према броју кликера који се налазе на другој гомили односи као 4 према 3 . Ако се два кликера са једне гомиле преместе на другу гомилу нови однос је 3 према 2 . Колико кликера је било на свакој од гомила?

VII разред

- 564.** Доказати да $37 \mid 333^{2003} + 555^{2003}$.
- 565.** Дат је квадрат K_1 чија је површина P_1 . Конструисати квадрат K_2 са површином P_2 тако да важи $P_1 : P_2 = 4 : 3$.
- 566.** Решити једначину
- $$(2003^{89})^{5x^2} = 2003^{2002} \cdot 2003^{2003}.$$
- 567.** Дијагонала једнакокраког трапеза $ABCD$ ($AB \parallel CD$) дели средњу линију на одсечке од 3 см и 4 см. Ако је крак $\sqrt{5}$ см, израчунати површину трапеза.
- 568.** (а) Доказати да за сваки природан број $n \geq 2$ важи
- $$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)}.$$
- (б) Доказати да је $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2003}\right)^{2003} < 1$.

VIII разред

- 569.** Решити једначину
- $$(0,8x - 0,5)^2 + (0,6x - 1,3)^2 = 4(0,5x - 0,7)(0,5x + 0,7) - 6(0,15x + 0,08).$$
- 570.** Из гвоздене коцке 20 см треба изваљати плочу са ивицама од 80 см и 50 см. Колика ће бити дебљина те плоче?
- 571.** Нека је m најмањи природан број чији је збир цифара 2003 . Доказати да је $m < 6 \cdot 10^{222}$.
- 572.** Дате су три дужи које се секу тако да им се средишта поклапају (при том ниједна од дужи не садржи неку другу). Колико највише, а колико најмање правих је одређено крајевима те три дужи?
- 573.** Доказати да $31 \mid 1 + 5 + 5^2 + 5^3 + \cdots + 5^{2003}$.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2003.

IV разред

574. Звездице заменити одговарајућим цифрама:

$$\begin{array}{r}
 4 * 3 \cdot 2 *
 \\ \hline
 * 8 3
 \\ * * *
 \\ \hline
 * * * *
 \end{array}$$

575. Странице правоугаоника $ABCD$ су 10 cm и 4 cm . Тачка E припада страници AB , а тачка F страници CD . Обим правоугаоника $AEFD$ је 12 cm . Израчунати површину правоугаоника $EBCF$.

576. Павле је за један посао требало да добије 1300 динара и улазницу за утакмицу. Међутим он је урадио само трећину посла и за то добио 300 динара и улазницу за утакмицу. Колико динара вреди улазница за утакмицу?

577. Из једног лонца у коме се налази 20 литара воде Марко би требало у други, исти такав лонац да одлије 5 литара воде. Како ће то он да уради ако има два празна суда запремине 3 и 7 литара?

578. Којом цифром се завршава производ

$$\underbrace{8 \cdot 8 \cdot 8 \cdots 8}_{2003}$$

(производ 2003 осмице)?

V разред

579. Израчунати разлику највећег и најмањег од правих разломака чији бројиоци и имениоци узимају вредности из скупа $\{2, 3, 5, 8\}$.

580. Звездице заменити одговарајућим цифрама:

$$\begin{array}{r}
 1 5 * * * : * 6 = 4 * *
 \\ * * *
 \\ \hline
 1 0 4
 \\ * 2
 \\ \hline
 3 * *
 \\ * * *
 \\ \hline
 0
 \end{array}$$

581. Углови α и β имају паралелне краке. Ако је $\alpha = 2003'$ колика је разлика $2\beta - \alpha$?

582. Петар има папир облика правоугаоника чије су странице 27 cm и 72 cm. Колика је ивица највеће коцке која се може обложити тим папиром (дозвољена су сва сечења)?

583. Дат је скуп $S = \{1, 2, 3, \dots, 99\}$. Одредити скупове A и B такве да је $A \cup B = S$, $A \cap B = \emptyset$ и да је збир бројева који припадају скупу A једнак збиру бројева који припадају скупу B .

VI разред

584. Одредити пресек и унију скупова целих бројева чији су елементи решења неједначина

$$-8\frac{1}{4} < 3x < 5\frac{2}{5} \quad \text{и} \quad -8\frac{1}{4} < -3x < 5\frac{2}{5}.$$

585. Збир 2003 узастопна цела броја је 2003. Наћи те бројеве.

586. У троуглу ABC симетрала странице AB , висина из темена A и симетрала унутрашњег угла у темену B секу се у једној тачки. Наћи $\angle ABC$.

587. У пољима квадрата 3×3 Јован уписује бројеве $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$. Може ли их уписати тако да сви збирови по хоризонталама (3), вертикалама (3) и дијагоналама (2) буду међусобно различити? Одговор детаљно образложити.

588. Конструисати троугао ако је познато да је његов обим 10 cm и углови $\alpha = 60^\circ$ и $\beta = 45^\circ$. Објаснити конструкцију.

VII разред

589. Колико страница има правилни многоугао ако се у њему могу повући 252 дијагонале?

590. Дат је правоугли троугао са катетама дужина 6 cm и 8 cm. У круг који је уписан у тај троугао, уписан је квадрат. Израчунати површину тако добијеног квадрата.

591. Ако су a, b, c и $\frac{a - b\sqrt{2003}}{b - c\sqrt{2003}}$ рационални бројеви, доказати да је тада $ac = b^2$.


592. Колико има петоцифрених бројева код којих је производ цифара паран?

593. Ако је број облика 2^k најмање четвороцифрен, доказати да не може имати једнаке четири последње цифре.

VIII разред

594. Ако је већи дијагонални пресек правилне шестостране призме квадрат, а мања дијагонала основе има дужину 10 cm, наћи запремину те призме.

595. Доказати да је $2003^{2003} - 2003$ дељиво са три.



Сл. уз задатак 815

596. Дати су квадрати $ABCD$ и $CGFE$ (видети слику). Одредити површину троугла AGE ако је $EF = 10$ см.

597. На колико начина се у квадратиће могу распоредити бројеви 1, 2, 3, 4 и 5

$$\square > \square > \square < \square > \square$$

(сваки број у један квадратић) тако да буду задовољене све неједнакости? Исписати сва решења.

598. Исписан је низ од 2003 цифре. Познато је да је сваки двоцифрен број који сачињавају две цифре у низу (тим редом којим су написане) дељив са 17 или са 23. Ако је последња цифра у низу 1, која је прва?

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2003.

VI разред

599. Ако је

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \overline{abcabc},$$

где је $n \in \mathbf{N}$, а a , b и c су међусобно различите цифре, одредити бар једно n и \overline{abc} .

600. Дат је паралелограм $ABCD$ и права p која са паралелограмом има само једну заједничку тачку, и то теме D . Нека су A' , B' и C' подножја нормала из тачака A , B и C на праву p . Доказати да је $AA' + CC' = BB'$.

601. Нека је збир цифара броја n једнак 2003. Ако ниједна његова цифра није 0, одредити

(а) најмањи;

(б) највећи

број n дељив са 4.

602. У паралелограму $ABCD$ је странница AB једнака његовој дијагонали BD . Доказати да је $2AC > 3AD$.

603. Пет ученика, A, B, C, D и E , учествовали су на окружном такмичењу из математике на ком је било могуће освојити највише 100 поена. Сваки од 5 ученика је освојило различит број поена и сваки од њих је имао више од 91 поен. Ако су A, B и C заједно освојили 285, а B, C и D заједно 282 поена и ако се зна да је A освојио највише поена, а E имао трећи резултат са 96 поена, колико поена је освојио ученик D ? Какав је поредак био на крају такмичења?

VII разред

604. Одредити три последње цифре броја $n = 2^{2008} - 2^{2006} + 2^{2003}$.


605. Нека је $ABCD$ једнакокраки трапез ($AB \parallel CD$). Нека је O центар описаног круга око тог трапеза, а E пресек његових дијагонала. Доказати да је $\angle AOD = \angle AED$.

606. Одредити све реалне бројеве r такве да су бројеви $r + \sqrt{3}$ и $\frac{1}{r} - \sqrt{3}$ цели.

607. Дат је четвороугао $ABCD$. Дуж која спаја средиште M странице AB и средиште N странице CD подељена је дијагоналом AC на два једнака дела. Доказати да је $P_{\triangle ABC} = P_{\triangle ADC}$.

608. У празне кругове (видети слику) уписани су бројеви од 1 до 9, тако да је у сваком кругу по један број и да су збирови бројева у теменима сваког од седам једнакостраничних троуглова међусобно једнаки.

- (а) Доказати да је збир бројева у сваком од тих троуглова једнак 15.
- (б) Одредити једно од могућих решења.



Сл. уз задатак 608

VIII разред

609. Доказати да је $2003^2 + 2^{2003}$ сложен број.

610. Углови троугла ABC задовољавају једнакост $3\alpha + 2\beta = 180^\circ$. Доказати да је $a^2 + bc = c^2$.

611. Ако се зна да је $\frac{x^2 + 2003}{x + 2003}$ цео број, колико различитих целобројних вредности, у том случају, може узети број x ?

612. У правилној четвространој пирамиди, чија је ивица основе дужине 10 см, угао бочне стране према равни основе је 60° . Раван α садржи једну ивицу основе и нормална је на супротну бочну страну. Одредити површину пресека равни α и пирамиде.

613. Бројеви $\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^{100}}$ разбијени су у пет група по 20 бројева. Производ бројева бар једне групе мањи је од $\left(\frac{1}{2}\right)^{1000}$. Доказати.

САВЕЗНО ТАКМИЧЕЊЕ 2003.

VI разред

614. Доказати да је број

$$1^{2003} + 2^{2003} + 3^{2003} + 4^{2003} + 5^{2003} + 6^{2003} + 9^{2003}$$

дељив са 10.

615. Доказати да је збир дужна тежших дужи произвољног троугла ABC већи од полуобима, а мањи од обима тог троугла.

616. Нека је ABC једнакокраки троугао ($AC = BC$), тачка O центар описане кружнице око троугла, а S центар кружнице која додирује основицу AB и продужетке кракова. Ако су тачке O и S симетричне у односу на праву AB , израчунати унутрашње углове троугла ABC .

617. У колико сати између 12 h и 13 h права која пролази кроз подеоке за 6 h и 12 h на бројчанику часовника представља симетралу угла који образују казаљке тог часовника?

618. У свакој клупи у једном разреду седе највише два ученика. Познато је да $\frac{2}{3}$ укупног броја дечака седи у клупама са $\frac{3}{5}$ укупног броја девојчица. Који део ученика седи у пару дечак-девојчица?

VII разред

619. Ако је a позитиван рационалан број који је различит од 1, доказати да $a + \frac{1}{a}$ није цео број.

620. Нека је ABC једнакокраки троугао са правим углом код темена C . Тачка D припада катети AC , тачка G припада катети BC , а тачке E и F су редом подножја нормала из D и G на хипотенузу AB . Ако је $AC = 1$ и ако се површине троугла BGF , петоугла $CDEFG$ и троугла ADE односе као $2 : 2 : 1$, израчунати обим петоугла $CDEFG$.

621. Ако су a, b, m, n природни бројеви, такви да је

$$a + 2003b = m^2, \quad b + 2003a = n^2,$$

доказати да су бројеви a и b дељиви са 3.

622. На табли су записани сви природни бројеви од 1 до 1000. Два играча A и B наизменично бришу по један број, а почиње играч A . Игра се завршава када на табли остану два броја. Ако је збир та два броја дељив са три, победник је A , а ако њихов збир није дељив са три, победник је B . Доказати да играч B има победничку стратегију.

623. Дат је правилан шестоугао $ABCDEF$ и произвољна тачка P унутар тог шестоугла. Доказати да је збир површина троуглова PAB , PCD и PEF једнак збиру површина троуглова PBC , PDE и PFA .

VIII разред

624. Ако су a, b, c дужине страница троугла, доказати да је

$$(a + b - c)(b + c - a)(c + a - b) \leq abc.$$

625. Кружница k која је уписана у оштар угао додирује краке тог угла у тачкама M и N . Нека је P произвољна тачка већег лука MN кружнице k , тачка A подножје нормале из P на MN , а B и C подножја нормала из P на краке тог угла. Доказати да је $PA^2 = PB \cdot PC$.

626. Одредити угао између дијагоналних пресека DBB_1D_1 и DAB_1C_1 коцке $ABCDA_1B_1C_1D_1$ који садрже дијагоналу DB_1 .

627. Дата су тврђења:

- (a) број $x + 1$ је дељив са y ;
- (b) $x = 2y + 5$;
- (c) број $x + y$ је дељив са 3;
- (d) $x + 7y$ је прост број.

Одредити све парове природних бројева (x, y) за које су тачно три од датих тврђења истинита, а једно лажно.

628. Одредити све природне бројеве n мање од 2003, за које је могуће исечи правоугаоник $2003 \times n$ на траке, тако да никоје две немају исту дужину. Под траком дужине k подразумевамо правоугаоник $1 \times k$, где је k природан број.

ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА 7. ЈУНИОРСКОЈ БАЛКАНИЈАДИ

629. Дато је 11 различитих природних бројева. Доказати да међу њима постоји 6 бројева чији је збир дељив са 6.

630. Дата је коцка $ABCDA_1B_1C_1D_1$ ивице a . Одредити површину пресека те коцке са равни која садржи теме D_1 и средишта N и P ивица AB и BC .

631. Дванаестоугао је уписан у кружницу. Шест страница тог дванаестоугла има дужину $\sqrt{3}$, а осталих шест страница има дужину 4. Израчунати површину дванаестоугла.

632. Нека је $A = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2002$ и $B = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 2001$. Доказати да је број $A + B$ дељив са 2003.

**СЕДМА ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА
МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА**

Кушадаси (Турска), 2003.

633. Нека је n позитиван цео број. Број A се састоји од $2n$ цифара и свака од њих је 4, број B се састоји од n цифара и свака од њих је 8. Доказати да је $A + 2B + 4$ потпун квадрат.

634. Нека је у равни дато n тачака тако да никоје три од њих нису колинеарне и са следећом особином: Ако на било који начин означимо те тачке са A_1, A_2, \dots, A_n , изломљена линија $A_1A_2 \dots A_n$ не пресеца саму себе.

Нађи највећу вредност коју n може да има.

635. Нека је k описана кружница око троугла ABC . Уочимо лукове \widehat{AB} , \widehat{BC} , \widehat{CA} тако да $C \notin \widehat{AB}$, $A \notin \widehat{BC}$, $B \notin \widehat{CA}$. Нека су D, E, F средишта лукова \widehat{BC} , \widehat{CA} , \widehat{AB} , респективно. Нека су G и H тачке пресека DE са CB и CA , а I и J тачке пресека DF са BC и BA , респективно. Означимо средишта дужи GH и IJ са M и N , респективно.

(а) Изразити углове троугла DMN у зависности од углова троугла ABC .

(б) Ако је O центар описане кружнице око троугла DMN и P пресечна тачка дужи AD и EF , доказати да O, P, M и N припадају истој кружници.

636. Нека су x, y, z реални бројеви већи од -1 . Доказати да је

$$\frac{1+x^2}{1+y+z^2} + \frac{1+y^2}{1+z+x^2} + \frac{1+z^2}{1+x+y^2} \geq 2.$$

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2004.

IV разред


637. Сабери највећи петоцифрени број написан различитим цифрама и најмањи шестоцифрени број написан различитим цифрама.

638. Умањилац је 2004, а разлика је пет пута већа од умањиоца. Колики је умањеник?

639. Ако се дужина правоугаоника повећа за 4 cm , а ширина за 6 cm добија се квадрат површине 81 cm^2 . Колики је обим правоугаоника?

640. Марија се играла на рачунару тако што је откуцала један иза другог природне бројеве 123456789101112.... Ако је Марија откуцала укупно 219 цифара, колико пута је откуцала цифру 1?

641. Наћи укупну површину стаклених делова на једном крилу прозора (шрафирани део – видети слику) ако су сви његови дрвени делови ширине 5 cm, док је укупна ширина прозора 80 cm, а његова висина 100 cm.



Сл. уз задатак 641

V разред

642. Нацртај кружне линије $k_1(O_1, 2\text{ cm})$ и $k_2(O_2, 3\text{ cm})$ ако је $O_1O_2 = 6\text{ cm}$. Одредити тачке $A \in k_1$ и $B \in k_2$ тако да је дуж AB :

Колика је тада дужина дужи AB ?

643. Одредити све двоцифрене бројеве који при дељењу са 21 дају остатак 10.

644. Израчунај меру угла који је за $2004'$ већи од њему комплементног угла.

645. Одредити све четвороцифрене бројеве мање од 3000 такве да им је производ цифара 105.

646. Одредити све скупове X који задовољавају услове:

$$X \subset \{a, b, c, d, e\} \quad \text{и} \quad X \cap \{a, c, d\} = \{a, d\}.$$

VI разред

647. Збир 10 узастопних целих бројева је -5 . Који су то бројеви?

648. У $\triangle ABC$ повучене су симетрале углова $\angle BAC$ и $\angle ABC$. Под којим углом се секу те две симетрале ако се зна да је $\angle BAC = 2004'$, а $\angle ABC = 86^\circ$?

649. За које вредности променљиве је израз $-7(-2 - 3x)$ већи од количника бројева -49 и 7 ?

650. Нађи збир целобројних решења неједначине $|x + 5| \leq 7$.

651. У троуглу ABC угао β је већи од угла γ за 20° , а мањи од угла α за 20° . Симетрала угла α сече страницу BC у тачки D . шта је веће BD или CD ?

VII разред

652. Делтоид чине два једнакокрака троугла са основицом 40 см и крацима од 25 см, односно 52 см. Израчунати површину делтоида.

653. Да ли је број $0,2323323332\dots$ (број тројки се стално повећава за 1) рационалан? Објаснити.

654. Доказати да је $\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6}}} < 3$.

655. Израчунати: $a = \frac{3\sqrt{501} + \sqrt{3}\sqrt{668} - 3\sqrt{2004}}{\sqrt{2004}}$.

656. За дати једнакостранични троугао конструисати квадрат такав да му је површина $\sqrt{3}$ пута већа од површине датог троугла.

VIII разред

657. За које вредности променљиве p израз $\frac{2p - \frac{3}{4}}{1 - \frac{p}{2}}$ има вредност мању од 1?

658. Површина највећег дијагоналног пресека правилне шестостране призме је квадрат површине 64 cm^2 . Нађи запремину те призме.

659. Збир два броја је 135. Ако 35% једног броја износи колико и 28% другог броја, који су то бројеви?

660. Израчунати $\sqrt{6 + 2\sqrt{5}} - \sqrt{6 - 2\sqrt{5}}$.


661. Израчунати површину круга описаног око правоуглог троугла чије су две странице 2 cm и $\sqrt{5} \text{ cm}$.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2004.


IV разред

662. Израчунати $4008 - 2004 : 6 + 6 \cdot 2004$.

663. Наћи обим и површину фигуре на слици.



Сл. уз задатак 663



Сл. уз задатак 668

664. Хокејашки тим састоји се од 6 играча на леду и 9 резерви на клупи. Сваки од 15 играча провео је исто време у игри на леду (замене су неограничене). Колико је времена сваки играч провео на леду ако меч траје 30 минута?

665. Ако се сва поља шаховске табле (8×8 квадрата) поређају једно поред другог, добије се правоугаоник обима 260 см. Израчунати површину шаховске табле.

666. За неки природан број ћемо рећи да је „занимљив“ ако је записан међусобно различитим цифрама чији је збир једнак 45. Наћи збир највећег и најмањег „занимљивог“ броја.

V разред

667. Наћи све разломке са бројиоцем 8 и имениоцем из скупа природних бројева који су већи од $\frac{2}{5}$ и мањи од $\frac{4}{5}$.

668. Наћи угао α ако су позната два означена угла (видети слику) и ако се зна да су праве a и b паралелне.

669. Колико има четвороцифрених природних бројева записаних само цифрама 2, 3, 5 и 8 (цифре не могу да се понављају) који су дељиви са 12?

670. Збир углова упоредних углу α је 8 пута већи од угла α . Одредити меру угла комплементног углу α .

671. Шта је веће, $\frac{3 * 5 *}{36}$ или $\frac{5 * 3 *}{45}$, ако уместо звездица могу да стоје било које цифре?

VI разред

672. Решити неједначину $|x| + 1\frac{1}{4} > 4,5$.

673. Нека је AB тетива кружне линије $k(O, r)$ и C тачка која припада тој тетиви, таква да је $OC \perp AB$. Доказати да је $AC = BC$.

674. Ако различитим словима одговарају различите цифре, решити ребус

$$\begin{array}{r} \text{БАК} \\ + \text{БЛОК} \\ \hline \text{КЊИГА} \end{array}$$

675. У троуглу ABC је $\angle CAB = 45^\circ$ и $\angle ABC = 60^\circ$. Наћи углове троугла AOS , где је O центар уписане кружнице троугла ABC , а S пресек симетрале $\angle ACB$ и спољашњег угла код темена A .


-10		-7
	-2	

676. Попунити празна поља таблице тако да збирови бројева у свим врстама, колонама и дијагоналама буду једнаки.


VII разред

677. Израчунати $\sqrt{(-4)^2} + (2^2)^2 \cdot \frac{5^{-8+2 \cdot 7}}{\left(\sqrt{13 + \sqrt{139 + \sqrt{(-5)^2}}}\right)^3}$.

678. Израчунати површину осенченог дела правилног осмоугла странице 2 см.



Сл. уз задатак 678



Сл. уз задатак 685

679. Записати у облику разломка број $2,32004200420042004\dots$

680. Израчунати површину трапеза чије су основице дужина $a = 25$ см, $b = 15$ см и краци $c = 6$ см и $d = 8$ см.

681. Шта је веће, $5 \cdot 3^{61}$ или $3 \cdot 5^{41}$?

VIII разред

682. Именилац датог разломка је за два већи од бројиоца. Одредити тај разломак, ако се зна да када се и од бројиоца и од имениоца одузме 1 добије се разломак $\frac{1}{2}$.

683. Нека је $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ правилна четворостррана призма основне ивице 12 cm и висине 8 cm. Израчунати површину пресека $ACMN$ где су M и N средишта ивица $B_1 C_1$ и $A_1 B_1$ редом.

684. Ако је $a(b+c) = bc \left(\frac{a}{2004} - 1 \right)$, где су $a, b, c \in \mathbf{R}^+$, израчунати $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

685. Петоугао $ABCDE$ је добијен „состављањем“ квадрата и једнакостраничног троугла (видети слику). Наћи полупречник описане кружнице око троугла ABD ако је странница тог петоугла дужине a .

686. Наћи све просте бројеве p за које је


$$\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{p}+\sqrt{p+1}}$$

природан број.


ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2004.

IV разред

687. Израчунати обим и површину осенчене фигуре на слици (према датим подацима).



Сл. уз задатак 687



Сл. уз задатак 690


688. Збир два броја је 8016. О којим бројевима је реч ако се зна да је један од њих једнак трећини другог?

689. Ако различитим словима одговарају различите, а истим исте цифре, решити ребус $A + A A + B A A + B A A = 2004$.

690. Навести све троуглове који се виде на слици.



Сл. уз задатак 691a



Сл. уз задатак 691б

691. Ако се табела попуњава као на слици а), уписати у празна поља на слици б) одговарајуће бројеве. Наћи сва решења.

V разред

692. Разлика два угла са паралелним крацима једнака је половини мањег. Израчунати меру угла комплементног мањем углу.

693. Наћи најмањи и највећи троцифрен природан број који при дељењу са 16 има количник исти као и остатак.

694. Ученик је у прва четири разреда порастао 17 cm. Сваке године је порастао природан број центиметара и сваке године више него претходне. У четвртом разреду је порастао три пута више него у првом. Колико је порастао у трећем разреду?

695. Нека су a и b паралелне праве. Нека тачке A, B, C припадају правој a и нека тачке K, L, M припадају правој b . Колико четвороуглова је одређено овим тачкама?

696. У двоцифреном броју прецртана је једна цифра и добијен је број који је 16 пута мањи од првобитног. Одредити све такве двоцифрене бројеве и у сваком од њих цифру коју треба прецртати.

VI разред

697. На стоваришту је било 304 тона робе. Најпре је однето $\frac{3}{8}$ робе, а затим $\frac{4}{5}$ преостале робе. Колико је тона робе остало на том стоваришту?

698. Дат је правоугоник $ABCD$ ($AB = 2BC = a$). Кружна линија са центром у тачки C и полуупречником дужине a сече страницу AB у тачки M . Израчунати $\angle CDM$.

699. Написати разломак $\frac{17}{2004}$ у облику збира два позитивна разломка са троцифреним имениоцима.

700. Конструисати троугао ABC ако је дата страница $AB = 4$ cm, тежишна дуж $BB_1 = 5$ cm и $\angle ABC = 60^\circ$.

701. Ако истим словима одговарају исте, а различитим различите цифре, решити ребус

$$M : A = T - E = M \cdot A = T : I = K - A.$$


VII разред

702. Ако је $a + \frac{1}{a}$ цео број већи од 2, доказати да је $a^3 + \frac{1}{a^3}$ сложен број.

703. У правилан петоугао $ABCDE$ упртан је једнакостранични троугао ABF као на слици. Израчунати угао EFC означен на слици.

704. Доказати да у запису броја 2^{2004} постоји цифра која се појављује бар 61 пут.

705. У једнакокраком трапезу, са краком дужине 5 см, једна основица је два пута дужа од друге. Ако је један унутрашњи угао трапеза 75° , израчунати његову површину.



Сл. уз задатак 703

706. Колико има бројева већих од 500 и мањих од 10000 код којих никоје две суседне цифре нису једнаке?

VIII разред

707. Колико је лима потребно за израду једног шупљег тела које чине омотачи две праве четворострane пирамиде са заједничком основом? Основа има облик правоугаоника са страницима 8 dm и 6 dm, а висине ових пирамида су по 12 dm.

708. Доказати да не постоје позитивни реални бројеви a , b и c , такви да је $a + \frac{1}{b} < 2$, $b + \frac{1}{c} < 2$ и $c + \frac{1}{a} < 2$.

709. У троуглу ABC конструисане су висине AA' и CC' . Ако је H ортоцентар, $AH = HA'$ и $CH : HC' = 2 : 1$,

(а) одредити $\angle ABC$; (б) доказати да је $AB : CC' = 4 : 3$.

710. У једном граду спроведена је анкета у којој је учествовало 20040 ученика који уче или енглески или немачки језик (тачно један од њих). Од ученика који уче енглески језик, из непознатих разлога, 20% је изјавило је да учи немачки и, слично, 20% ученика који уче немачки у анкети је изјавило да учи енглески. По овој анкети 40% ученика у овом граду је изјавило да учи немачки језик. Колико ученика у овом граду учи енглески језик?

711. M и K су тачке на страницима AB и CD , редом, паралелограма $ABCD$, такве да је $AM = CK$, а P је произвољна тачка на страници AD . Нека је $\{E\} = MK \cap PB$ и $\{F\} = MK \cap PC$. Доказати да је:

(а) $P_{\Delta EPF} = P_{\Delta BME} + P_{\Delta CFK}$; (б) $P_{BCFE} = P_{APBEM} + P_{PDKF}$.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2004.

VI разред

712. Сваки пут када погреши при изради домаћег задатка, Милан истргне један лист из свеске. Тако му се десило да из једне свеске истргне 25% листова, а из друге, исте такве свеске, сваки девети лист. Колико је било првобитно у свакој свесци и за колико процената се смањио укупан број листова (у обе свеске заједно) ако је Милан истргао укупно 26 листова?

713. У четвороуглу $ABCD$ углови ABC и ADC су прави. Нека су M и N тачке на страницима BC и DC (редом) такве да је $BM = DN$ и $\angle BAM = \angle DAN$. Доказати да се дијагонале AC и BD тог четвороугла секу под правим углом.

714. Нека је x троцифрен број чије су све цифре међусобно различите и различите од нуле. Збир свих троцифрених бројева који имају цифре исте као и број x је три пута већи од троцифреног броја чије су све цифре једнаке цифри стотина броја x . Одредити број x .

715. Нека је тежишна дуж AA_1 троугла ABC нормална на симетрални угао ABC тог троугла. Дужине страница $\triangle ABC$ су узастопни природни бројеви мерних јединица, рецимо центиметара. Колике су те дужине страница троугла ABC ?

716. На табли су написани бројеви $1, 2, 3, 4, \dots, 221, 222$. Дозвољено је у једном кораку било која два броја увећати за по 1. Да ли се, после извесног броја корака, могу добити сви једнаки бројеви? Одговор детаљно образложити.

VII разред

717. Између сваке две цифре броја 121 уписано је по 2004 нуле. Наћи квадратни корен тако добијеног броја.

718. Површина правоугаоника $ABCD$ је 2004 cm^2 . У троугао ABD уписана је кружна линија са центром у тачки O . Ако уочимо тачку $P \in BC$ и $Q \in CD$ тако да је $OP \parallel CD$ и $OQ \parallel BC$, израчунати површину правоугаоника $OPCQ$.

719. Одредити најмањи природан број n који је истовремено збир 7 узастопних природних бројева, збир 11 узастопних природних бројева, збир 13 узастопних природних бројева и није збир два узастопна природна броја.

720. Кружна линија полупречника 10 см додирује две суседне странице квадрата, а крајње тачке једног пречника припадају другим двема страницама квадрата. Израчунати површину квадрата.

721. Дате су 2004 јединице. Бранко и Ратко играју игру тако што наизменично (један симбол ставља Бранко, па онда Ратко) између јединица редом стављају симbole + и ·, при чему први игра Бранко.

(а) Може ли Бранко да победи ако се игра састоји у томе да вредност израза који се добија треба да буде паран број?

(б) Може ли Ратко да победи ако се игра састоји у томе да вредност израза који се добија треба да буде непаран број?

Подразумева се да оба играча играју без грешке, тј. примењују оптималну стратегију.

VIII разред

722. Воја је решио да у свом воћњаку засади 270 садница. Сваког дана је садио онај број садница који се добија када израчуна збир цифара броја који је збир

броја садница које је засадио претходног дана и његовог збира цифара. Зна се да је првог дана засадио једну садницу. Колико му је дана требало да засади све саднице? Детаљно образложити решење.

723. На страницама BC и CD правоугаоника $ABCD$ уочене су редом тачке M и N тако да је $BM = 2MC$ и $CN = 2ND$. Наћи однос страница тог правоугаоника $ABCD$, ако се зна да је троугао AMN правоугли са хипотенузом AM .

724. Неки број се повећа за 45 ако му цифре јединица и десетица замене места, а исти број се смањи за 270 ако цифре стотина и десетица замене места. шта ће се дрогодити са тим бројем ако цифре стотина и јединица замене места?

725. Наћи најмањи природан број који је 2004 пута већи од збира својих цифара.

726. Нека су M и N тачке на ивицама $A'B'$ и $A'D'$ коцке $ABCDA'B'C'D'$ тако да је $A'M + A'N = AB$. Доказати да је $\angle A'AM + \angle A'AN + \angle MAN = 90^\circ$.

САВЕЗНО ТАКМИЧЕЊЕ 2004.

VI разред

727. Одредити све троцифрене бројеве који имају тачно 5 делилаца (укључујући јединицу и сам број).

728. У једнакокраком троуглу ABC је $\angle ABC = \angle BAC = 40^\circ$. Симетрала угла BAC сече крак BC у тачки D . Доказати да је $AD + DC = AB$.

729. Дат је квадрат $ABCD$. Тачка E припада страници AD , тачка F припада страници DC , при чему је $DE = DF$. Ако је G подножје нормале из D на EC , доказати да је $\angle BGF = 90^\circ$.

730. Дат је једнакостранични троугао ABC странице $AB = 12\text{ cm}$. Нека је M тачка на страници AC , тачка P подножје нормале из M на AB , тачка Q подножје нормале из P на BC и тачка R подножје нормале из Q на AC . Израчунати растојање AM ако се тачка R поклапа са M .

731. Дато је пет природних бројева, Израчунати су сви збирови по два од датих бројева. Да ли добијени збирови могу бити 10 узастопних природних бројева?

VII разред

732. Дат је троугао ABC површине 2004. Нека су M и N , редом, тачке на страницама AB и BC , такве да је $AM : MB = 1 : 3$ и $BN : NC = 2 : 1$. Ако се праве AN и CM секу у тачки S , израчунати површину четвороугла $MBNS$.

733. Ако је $abc = 1$, доказати да је

$$\left(a + \frac{1}{a}\right) \left(b + \frac{1}{b}\right) \left(c + \frac{1}{c}\right) = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{c}\right)^2 - 4.$$

734. На путу је колона аутобуса. Аутобус сматрамо препуним ако је у њему више од 50 путника. Контролори Воја и Раде зауставили су колону. Воја је одредио проценат препуних аутобуса, а Раде проценат свих путника у препуним аутобусима у односу на укупан број путника. Чији је проценат већи?

735. Дат је правоугаоник $ABCD$ код кога је $AB = 2BC$. Кружница k са центром A и полуупречником AD сече дијагоналу BD у тачки M . Израчунати угао BMC .

736. Правоугаоник 2×2005 подељен је на 4010 подударних квадрата странице 1. На колико начина се од њих могу изабрати 2004 квадрата тако да међу њима нема суседних? (Два квадрата су суседна ако имају заједничку страницу.)

VIII разред

737. У равни су дате 2004 тачке. Неки парови тачака су спојени дужима. Доказати да постоје две тачке из којих полази једнак број дужи.

738. Основна ивица правилне тростране призме $ABC A_1 B_1 C_1$ је $AB = a$, а висина је $CC_1 = a\sqrt{2}$. Нека је α раван одређена тачкама A , C_1 и средиштем ивице BB_1 , а β раван одређена тачкама C , B_1 и средиштем ивице AB . Одредити дужину дужи која припада пресеку равни α и β и налази се унутар призме.

739. Доказати да једначина $x^2 + y^3 = z^2$ има бесконачно много решења у скупу природних бројева.

740. Нека је M тачка унутар квадрата $ABCD$, таква да је $\angle MDC = \angle MBD = 20^\circ$. Израчунати угао MAB .

741. Дати су реални бројеви $a_1, a_2, \dots, a_{2004}$, такви да важи

$$a_1 a_{2004} = a_2 a_{2003} = \cdots = a_{1002} a_{1003} = 1.$$

Доказати да је $\frac{1}{1+a_1^{2004}} + \frac{1}{1+a_2^{2004}} + \cdots + \frac{1}{1+a_{2004}^{2004}} = 1002$.

ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА 8. ЈУНИОРСКОЈ БАЛКАНИЈАДИ

742. У изразу $2004^2 * 2003^2 * \cdots * 2^2 * 1^2$ сваку звездицу заменити знаком + или – тако да вредност израза буде прост број.

743. Да ли постоји деветоцифрени природан број чије су све цифре међусобно различите и различите од нуле, који је дељив са 5 и потпун је квадрат?

744. Дат је лењир на коме су обележене две тачке. Користећи само овај лењир конструисати произвољну нормалу на дату праву.

745. Ако је разлика кубова два узастопна природна броја једнака n^2 , доказати да је број n једнак збиру квадрата два узастопна природна броја.

ОСМА ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

Нови Сад, 2004.

746. Доказати да неједнакост

$$\frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} \leq \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

важи за све реалне бројеве x и y , који нису оба једнаки нули.

747. Нека је ABC једнакокраки троугао, $AC = BC$, нека је M средиште дужи AC и нека је l права која пролази кроз тачку C а ортогонална је на AB . Кружница кроз B , C и M сече l у тачкама C и Q . Изразити полупречник круга описаног око троугла ABC преко $m = CQ$.

748. Ако су природни бројеви x и y такви да су бројеви $3x+4y$ и $4x+3y$ потпуни квадрати, доказати да су и x и y дељиви са 7.

749. Дат је конвексан полигон са n темена, $n \geq 4$. Разложимо на произвољан начин тај полигон на троуглове чија су темена истовремено и темена полигона, тако да никоја два од тих троуглова немају заједничких унутрашњих тачака. Обојимо у црно троуглове који имају две странице које су такође странице полигона, у првено троуглове чија је само једна страница истовремено и страница полигона, а у бело оне троуглове који немају заједничких страница са полигоном. Доказати да је број црних троуглова за два већи од броја белих.


ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2005.

IV разред

750. Напиши разлику производа $4050 \cdot 6$ и количника $5004 : 6$, и одреди њену вредност.

751. У скупу N_0 одреди решења неједначине $2524 - x > 2425$.

752. Бранко, Воја и Драган имају 36 ораха. Када је Бранко дао Воји 6 ораха, а Воја Драгану 4 ораха, сваки од њих је имао исти број ораха. Колико је ораха имао сваки од њих на почетку?



Сл. уз задатак 753

753. На слици је дат квадрат $ABCD$, подељен на четири правоугаоника и један мали квадрат. Обим сваког од правоугаоника је 90 mm. Ако је дужина сваког од тих правоугаоника два пута већа од ширине, наћи колико је пута обим квадрата $ABCD$ већи од обима осенченог квадрата.


754. Колико има непарних четвороцифрених бројева који су дељиви са 5?

V разред

755. Одредити скуп свих троцифрених бројева дељивих са 9 чије цифре припадају скупу $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ и могу се понављати.

756. Израчунај меру угла који је за $2005'$ већи од њему суплементног угла.

757. Од 18 белих ружа, 45 жутих ружа и 72 црвене руже направљен је највећи могући број букета са истим бројем ружа истих боја (све руже морају бити употребљене). Ако је цена једне беле руже 10, жуте 15, а црвене 20 динара, одреди највећи могући број букета и израчунај колико ће да кошта један такав букет.



Сл. уз задатак 758

758. Квадрат $ABCD$ подељен је на четири правоугаоника и један мали квадрат (види слику). Сви правоугаоници имају једнаке одговарајуће странице, а површина сваког од тих правоугаоника је 506 cm^2 . Ако су дужине страница сваког од правоугаоника узастопни природни бројеви, колико пута је површина квадрата $ABCD$ већа од површине осенченог квадрата?

759. Дат је скуп $S = \{1, 2, 3, \dots, 2005\}$. Постоје ли скупови A и B такви да је $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = S$ и збир бројева из скупа A једнак је збиру бројева из скупа B ? Образложи одговор.

VI разред


760. Одреди углове троугла ако су збир и разлика два спољашња угла једнаки $\alpha_1 + \beta_1 = 220^\circ$, $\alpha_1 - \beta_1 = 16^\circ$.

761. Тачке A , B и права p се налазе у једној равни и тачке A и B су са исте стране праве p . Одредити на правој p тачку M за коју је збир растојања од тачака A и B најмањи.

762. Израчунај збир свих целобројних решења неједначине $|x - 1| < 2005$.

763. На слици је дат четвороугао (правоугли трапез) тако да је $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$ и $AD = 2BC$. Доказати да је $AC = CD$.

764. Одреди целе бројеве a , b и c који задовољавају услове $a < b < c$, $abc = 308$ и $ac = -28$.



Сл. уз задатак 763

VII разред

765. Ако је $a = 5$ и $b = -0,2$, израчунај $a^{2004} \cdot b^{2006}$.

766. У правоуглом троуглу ABC је $\angle ACB = 90^\circ$, $b = 3$ см и $t_b = 2,5$ см. Нaђи површину и обим троугла ABC .

767. Нацртај квадрат $ABCD$ странице a . Конструиши квадрат $A_1B_1C_1D_1$ такав да је $P_{A_1B_1C_1D_1} = \frac{5}{4}P_{ABCD}$.

768. У једнакокраком троуглу ABC ($AC = BC$) је $\alpha + \gamma = 118^\circ$. Шта је веће, висина која одговара краку или висина која одговара основици?

769. Постоје ли узастопни природни бројеви a , b и c такви да је $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{53}{60}$?

VIII разред

770. Ако се свака ивица коцке повећа за 20% , за колико ће се процената повећати површина те коцке?

771. Збир два броја је 2005. Ако 17% једног броја износи колико 68% другог броја, који су то бројеви?

772. Нека су α и β две паралелне равни, међусобно удаљене 12 см. У равни α дате су тачке A и C , а у равни β тачке B и D . Одреди угао који права, одређена тачкама C и D , гради са равни α , ако права одређена тачкама A и B гради са равни α угао од 30° и $AB + CD = 48$ см.

773. Колико се највише различитих природних бројева може сабрати да се добије збир 2005?

774. На колико различитих начина три друга могу поделити 7 кликера? Узети у обзир и могућност да неки од другова може добити све кликере.


ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2005.

IV разред

775. Ученик је замислио један број. Прво је тај број помножио бројем 12, а други пут бројем 9 и саопштио да је први производ већи од другог за 270. Који је број замислио ученик?

776. Дато је шест картона облика правоугаоника дужине 3 см и ширине 2 см. Користећи све дате картоне саставити један правоугаоник. (Квадрат је такође правоугаоник.) Израчунати:

- (а) највећи могући
 обим тако састављеног правоугаоника.
- (б) најмањи могући



Сл. уз задатак 777

777. Одреди површину приказане фигуре ако је јединица мере један квадратнић са квадратне мреже.

778. Цена две оловке и три свеске је 100 динара, а цена три оловке и две свеске је 75 динара. Колико је потребно новца за куповину 60 свезака и 41 оловке?


779. Природни бројеви a и b су такви да важи $a - b = 2005$. Наћи најмању вредност израза $2005 \cdot a - 2004 \cdot b$.

V разред


780. Разлика два упоредна угла једнака је половини мањег. Доказати да је угао комплементан мањем углу једнак четвртини мањег угла.

781. Цена две оловке и три свеске је 100 динара, а цена три оловке и две свеске је 75 динара. Колико највише предмета се може купити за 2005 динара?

782. У равни је дато пет тачака као на слици. Да ли има више дужи са крајевима у тим тачкама или троуглова са теменима у тим тачкама?



Сл. уз задатак 782



Сл. уз задатак 784

783. У четвороцифреном броју $\overline{32\clubsuit 4}$ замени \clubsuit одговарајућом цифром тако да добијени број буде дељив са 12.

784. У кругове (видети слику) уписати бројеве тако да све три једнакости приказане шемом буду тачне.

VI разред

785. Одредити све целе бројеве n такве да је $-\frac{1}{3} < \frac{n+1}{15} < \frac{1}{5}$.

786. Цена две оловке и три свеске је 100 динара, а цена три оловке и две свеске је 75 динара. Ако је за 101 предмет плаћено 2005 динара, колико је купљено свезака, а колико оловака?

787. Висине CD и AE оштроуглог троугла ABC секу се у тачки H . Ако је $AB = CH$ израчунати $\angle ACB$.

788. Бројеве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 уписати у девет поља квадрата (видети слику) тако да производи по колонама и врстама буду једнаки датим бројевима (доле и десно).

789. У квадрату странице 44 см дато је 2005 тачака. Доказати да се од тих тачака могу изабрати две чије је међусобно растојање мање од 2 см.

			135
			336
			8
252	48	30	

Сл. уз задатак 788

VII разред

790. Доказати да је број \overline{abcabc} , где су $a, b, c \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ и $a \neq 0$, дељив са 7, 11 и 13.

791. Израчунати висину једнакокраког трапеза површине 16 cm^2 ако се зна да су му дијагонале нормалне.

792. Цена две оловке и три свеске је 100 динара, а цена три оловке и две свеске је 75 динара. Да ли може да се за 2005 динара купи 205 предмета?

793. Дат је правоугли $\triangle ABC$ такав да је $\angle ACB = 90^\circ$, $CA = \sqrt{5}$ и $CB = 2\sqrt{5}$. Нека је $D \in AB$ и $CD = \sqrt{5}$. Одредити обим и површину троугла BCD .

794. Доказати да не постоје прости бројеви p, q и r такви да је $p^2 + q^2 + r^2 = 2005$.


VIII разред

795. Наћи заједничка решења неједначина:

$$\frac{3}{4}y - \frac{2}{3}(y-1) \geq 0 \quad \text{и} \quad \frac{1-y}{2} - \frac{2+y}{3} < 0.$$

796. Цена две оловке и три свеске је 100 динара, а цена три оловке и две свеске је 75 динара. На колико начина се може потрошити 2005 динара за набавку свезака и оловака?

797. Ако правилну четворострану призму пресечемо једном равни која садржи ивицу основе и са основом захвата угао од 30° , добијамо тела чије су запремине у односу 1 : 2. Израчунати запремину те правилне четворостране призме у зависности од странице основе.



Сл. уз задатак 798

798. У квадрат странице a уписан је круг, а затим је (видети слику) уписан још један мали круг који додирује велики круг и две странице квадрата. Наћи површину мањег круга.

799. Милан је написао десет узастопних природних бројева. Збир цифара ниједног од тих бројева није дељив бројем седам. Који је најмањи број који је Милан могао да напише?

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2005.

IV разред

800. Колико је укупно цифара потребно одштампти за нумерацију књиге која има 225 страница?

801. Збир два броја је 2005, а њихова разлика умањена за 1 је 1000. Одредити те бројеве.

802. Квадрат је разрезан на два правоугаоника. Збир обима тих правоугаоника је за 210 cm већи од обима квадрата. Површина једног правоугаоника је четири пута већа од површине другог. Израчунај обим мањег правоугаоника.

803. Звездице заменити цифрама, тако да се добије тачна једнакост:

$$7 * 8 = * 9 \cdot 8 + 7 *$$


804. У празна поља (види слику) уписати бројеве тако да збирови по три броја у свакој врсти, колони и дијагонали буду међусобно једнаки.

	4	
10		
5		7

Сл. уз задатак 804

V разред

805. Израчунати меру угла α (види слику) ако су праве a и b паралелне.



Сл. уз задатак 805

		4
7		5
10		

		0,4
7		5
10		

Сл. уз задатак 809

806. Мерни бројеви дужина ивица квадра су природни бројеви. Површина квадра је $P = 592 \text{ cm}^2$, а запремина $V = 960 \text{ cm}^3$. Ако је дужина једне ивице тог квадра $a = 12 \text{ cm}$, одредити дужине остале две ивице.

807. Одредити најмањи природан број дељив са 36 који је записан само цифрама 4 и 7.

808. Један пешчани сат мери 10 min (пресипање садржаја песка из једног у други део траје 10 min), а други пешчани сат мери 7 min. Како се коришћењем ова два сата може измерити 23 min?

809. У празна поља (види слику) уписати бројеве тако да зброви по три броја у свакој врсти, колони и дијагонали буду међусобно једнаки.

VI разред

810. Одредити све целе бројеве x за које је $|x| < 3$ и $|1 - x| < |1 + x|$.

811. На страницама ромба $ABCD$ дате су тачке E, F, G и H које припадају редом страницама AB, BC, CD и DA тако да важи $AE = AH = CF = CG$. Доказати да је четвороугао $EFGH$ правоугаоник.

812. Одредити све просте бројеве p, q и r такве да је $p + 5q + 7r = 47$ (p, q и r не морају бити различити).

813. Одредити најмањи разломак $\frac{x}{y}$ (x и y природни бројеви) такав да су количници $\frac{x}{y} : \frac{11}{210}$ и $\frac{x}{y} : \frac{11}{280}$ природни бројеви.

814. Конструисати троугао ABC ако је дато $h_a = 4 \text{ cm}$, $t_a = 6 \text{ cm}$ и $t_b = 9 \text{ cm}$.

VII разред

815. Средишта страница правилног шестоугла странице дужине a су темена новог шестоугла. Доказати да је тај нови шестоугао правилан и одредити његову површину у зависности од a .

816. Одредити три проста броја чији је производ 47 пута већи од њиховог збира.

817. Нека је $ABCD$ четвороугао чије се дијагонале секу под правим углом. Ако су M и N средине страница AD и BC доказати да је $2MN \leqslant AD + BC$.

818. Број је „ружичаст“ ако у свом запису има цифре 1 и 2 које су суседне. Колико има „ружичастих“ четвороцифрених бројева којима су све цифре различите?

819. Од квадрата са страницама целобројне дужине треба сложити правоугаоник површине 2005. Колико је најмање квадрата потребно?

VIII разред

820. Дата је функција $y = (2m + 1)x + 6$.


- (а) Одредити вредност броја m тако да њен график садржи тачку $M(4, 3)$.
 (б) За ту вредност броја m , одредити удаљеност координатног почетка од тог графика.

821. На страници AB троугла ABC уочена је тачка D . Нека су r , r_1 и r_2 редом дужине полупречника уписаних кружница у троуглове ABC , ADC и DBC . Доказати да је $r_1 + r_2 > r$.

822. Одредити просте бројеве p , q и r тако да важи $p + pq + pqr = 2005$.

823. Теме коцке удаљено је 2005 см од дијагонале коцке. Наћи површину и запремину те коцке.

824. Бројеви 1, 2, 3, 4, 5 и 6 могу се уписати у кругове (види слику) тако да су збирници по сва три правца међусобно једнаки. Доказати да је збир бројева уписаних у кругове који чине нацртани троугао делив са 3.



Сл. уз задатак 824

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2005.**VI разред**

825. У хотелу Славија у Врњачкој Бањи цена пансиона је у фебруару повећана за 20%, а онда у марту снижена за 20%. У исто време у хотелу Звезда је у фебруару прво снижена цена за 20%, а затим повећана за 20%. Сада је разлика у цени пансиона 240 динара. Колика је та разлика била пре прве промене цене?

826. Доказати да у $\triangle ABC$ чије су странице a , b и c и t_c дужина тежишне дужи из темена C важи

$$\frac{a+b-c}{2} < t_c < \frac{a+b}{2}.$$

827. Троцифрени број \overline{abc} је за 860 већи од троцифреног броја \overline{def} . Одредити све шестоцифрене бројеве \overline{abcdef} који су дељиви са 9.

828. Нека је $ABCD$ ромб. Конструисати кружницу тако да су темена датог ромба на једнаким растојањима од те кружнице. Колико има решења? [Под растојањем тачке M од кружнице $k(O, r)$ подразумевамо број $|OM - r|$.]

829. Природни бројеви од 1 до mn уписани су у поља табеле $m \times n$ (m врста и n колона). У поља прве врсте, слева на десно, уписани су редом бројеви $1, 2, \dots, n$; затим су у поља друге врсте, опет слева на десно, уписани редом

бројеви $n+1, n+2, \dots, 2n$ итд. Ако је број 77 уписан у пету врсту, 127 у седму врсту и 307 у последњу врсту, одредити бројеве m и n .

VII разред

830. Шта је веће, $\frac{\sqrt{11} + \sqrt{7}}{6}$ или $\frac{1}{\sqrt{12} - \sqrt{6}}$?

831. Симетрала угла ACB сече страницу AB троугла ABC у тачки D . Ако је центар O уписане кружнице у троугао ADC уједно и центар кружнице описане око троугла ABC , израчунати углове троугла ABC .

832. Нека су p, q и r прости бројеви, а a, b и c такви природни бројеви да важи:

$$p = a^b + c, \quad q = b^c + a, \quad r = c^a + b.$$

Доказати да су у том случају два од бројева p, q и r међусобно једнака.

833. У троуглу ABC је $\angle BAC = 65^\circ$, $\angle ABC = 55^\circ$ и $AB = 10$ см. Ако је A' подножје висине из темена A , а B' подножје висине из темена B тог троугла, израчунати дужину дужи $A'B'$ и углове троугла $A'B'C$.

834. У квадрату странице $a = 31$ см на произвољан начин је распоређено 2005 тачака. Доказати да међу датим тачкама постоје бар две чије је растојање мање од 1 см.

VIII разред


835. Одредити све природне бројеве m и n који су решења једначине

$$\frac{5}{m} + \frac{401}{n} = 1.$$

836. Нека је $ABCV$ правилна тространа пирамида основне ивице a и бочне ивице b . Нека је T тежиште бочне стране BCV и S подножје висине пирамиде из врха V . Доказати да се дужи AT и VS секу и одредити у којој размери пресечна тачка дели дуж AT .

837. У круг су уписани квадрат и једнакостраничен троугао тако да ниједно теме квадрата није истовремено и теме троугла. Доказати да постоји лук одређен двема од тих седам тачака чија дужина није већа од $\frac{O}{24}$ (O – обим круга).

838. Тачке X и Y припадају страницима BC и CD квадрата $ABCD$ (видети слику). Дужине дужи XY , AX и AY су редом 3, 4 и 5. Одредити дужину странице квадрата.



Сл. уз задатак 838

839. Један хотел има 40 соба. Цена једнодневног издавања собе је 1000 динара. Ако би се та цена повећала за 50 динара, једна соба би осталла празна, ако би се повећала за 100 динара, две собе би остале празне, итд. Трошкови одржавања једне издате собе су 100 динара дневно. Колико би требало да буде цена једнодневног издавања собе, па да дневна зарада хотела буде највећа?

САВЕЗНО ТАКМИЧЕЊЕ 2005.

VI разред

840. Одредити све просте бројеве p и q за које важи једнакост $249 \cdot p^3 + q = 2005$.

841. У троуглу ABC симетрале спољашњих углова код темена A и B секу праве BC и CA редом у тачкама D и E , тако да је $AD = BE = AB$. Израчунати углове троугла ABC ако је:

- (a) $\alpha < 90^\circ$; (b) $\alpha > 90^\circ$.

842. Анка, Бранка и Весна су купиле по један примерак исте књиге и при томе потрошиле, редом, 100% , $55\frac{5}{9}\%$ и 50% новца који је свака од њих имала код себе. Онда су решиле да укупни остатак новца међусобно поделе на једнаке делове. Бранка је дала Анки 100 динара. Колико је новаца Анки дала Весна?

843. Дат је једнакокраки тругао ABC код кога је $AC = BC$. Симетрала угла ABC сече крак AC у тачли D . Права p садржи тачку D , нормална је на BD и сече праву AB у тачки E . Доказати да је $BE = 2 \cdot AD$.

844. На кружници су редом дате тачке A_1, A_2, \dots, A_{108} . Свакој тачки је додељен један природан број тако да важе следећи услови:

- (а) тачкама A_1 , A_{19} и A_{50} су редом додељени бројеви 1, 19 и 50;
 (б) збир бројева који су додељени било ком низу од 20 узастопних тачака је 1000.

Одредити који је број додељен тачки A_{100} .

VII разред

845. У оштреуглом троуглу ABC висине BE и AG секу се у тачки D . Тачке M , N , P и Q су, редом, средишта дужи AD , BD , BC и AC . Доказати да је четвороугао $MNPQ$ правоугаоник.

846. Доказати да је број $2002 \cdot 2003 \cdot 2004 \cdot 2006 \cdot 2007 \cdot 2008 + 36$ квадрат неког природног броја.

847. Ако су a и b природни бројеви и ако је број $ab + 1$ дељив са 24, онда је и број $a + b$ дељив са 24. Доказати.

848. Шесторка цифара $abcdef$ представља време на дигиталном часовнику. При томе цифре ab одређују број сати од 00 до 23, цифре cd одређују број минута од 00 до 59, а цифре ef одређују број секунди од 00 до 59. Колико има оваквих шесторки за које и шесторка цифара $fedcba$ представља време које се може прочитати на дигиталном часовнику?

849. Нека је ABC једнакокраки троугао код кога је $AC = BC$ и угао при врху C једнак 20° . Ако је M тачка на краку BC и $CM = AB$, одредити величину угла AMB .

VIII разред

850. Одредити најмањи број облика $101010\dots10101$ који је дељив са 9999.

851. Дужина основне ивице правилне тростране пирамиде је 3 dm. Пирамида је пресечена са равни која садржи једну основну ивицу и нормална је на наспрамну бочну ивицу и при томе је дели у односу 9 : 8, рачунајући од темена основе. Израчунати површину пирамиде.

852. Ако су a , b и c дужине страница троугла, онда је

$$\left| \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} - \frac{b}{a} - \frac{c}{b} - \frac{a}{c} \right| < 1.$$

Доказати.

853. Дат је правilan седмоугао $ABCDEFG$ странице 1. Доказати да је

$$\frac{1}{AC} + \frac{1}{AD} = 1.$$

854. На кружници је дато 2005 плавих и 2005 првених тачака које деле кружницу на 4010 подударних лукова. Свака првена тачка је средиште неког лука са плавим kraјевима. Доказати да је свака плава тачка средиште неког лука са првеним kraјевима.

ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА 9. ЈУНИОРСКОЈ БАЛКАНИЈАДИ

855. Дат је правоугли троугао ABC са правим углом код темена B и $BC < AB < 2BC$. Нека је M тачка катете AB , таква да је $AM = BC$ и нека је N тачка катете BC , таква да је $CN = BM$. Одредити угао између плавих AN и CM .

856. Дат је квадрат странице 2. Унутар квадрата дато је 2005 тачака тако да никоје три нису колинеарне. Квадрат је подељен на троуглове чија су темена

све дате тачке и сва темена квадрата. Странице троуглова се међусобно не секу. Доказати да постоји троугао чија површина није већа од $\frac{1}{1003}$.

857. Нека су a, b, c и d бројеви из интервала $[0, 1]$. Доказати да је

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}{4} - \frac{1}{4} \leq \left(\frac{a+b+c+d}{4} \right)^2.$$

Када важи једнакост?

ДЕВЕТА ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

Вериа (Грчка), 2005.

858. Нађи све природне бројеве x, y који задовољавају једначину

$$9(x^2 + y^2 + 1) + 2(3xy + 2) = 2005.$$

859. Нека је ABC оштроугли троугао уписан у кружницу k . Познато је да тангента на кружницу k у тачки A сече праву BC у тачки P . Нека је M средиште дужи AP , а R друга тачка пресека кружнице k и праве MB . Права PR сече поново кружницу k у тачки S , различитој од R . Доказати да су праве AP и CS паралелне.

860. Доказати да:

- (а) постоји 5 тачака у равни таквих да међу свим троугловима са теменима у тим тачкама постоји 8 правоуглих троуглова;
- (б) постоје 64 тачке у равни такве да међу свим троугловима са теменима у тим тачкама има бар 2005 правоуглих троуглова.

861. Нађи све троцифрене природне бројеве \overline{abc} такве да је

$$\overline{abc} = abc(a + b + c)$$

где је \overline{abc} декадни запис броја.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2006.


IV разред

862. Шта је веће: $27 \cdot 10^6$ или $3 \cdot 10^7$?

863. На основу података на слици израчунати површину фигуре (мере су дате у метрима).

864. Израчунати збир $1 + 2 + 3 + \dots + 2006$.

865. Слагањем 12 једнаких квадрата странице 1 см (један до другог, тако да имају заједничку страницу) треба направити правоугаоник. Навести сва решења и одредити који ће од тако добијених правоугаоника имати најмањи обим.



Сл. уз задатак 863

866. Нађи највећи шестоцифрен непаран број чији је збир цифара 4.

V разред

867. Одредити све скупове X за које је $\{2, 3, 4, 5\} \cup X = \{2, 3, 4, 5\}$.

868. Разлика угла α и њему упоредногугла β је 48° . Израчунати угао комплементан углу β .

869. Одредити све цифре a такве да је производ $\overline{17a} \cdot 520$ дељив са 12.

870. Дуж AB чија је дужина 28 см подељена је тачкама P и Q на три дела, тако да је први део два пута мањи од другог, а два пута већи од трећег. Ако су M и D средишта крајњих делова, израчунати дужину дужи MD .

871. Ивице дрвеног квадра су 21 см, 24 см и 27 см. Све стране квадра обојене су плавом бојом, а затим је цео исечен на једнаке коцке највећих могућих ивица. Колико тих коцки има плаво обојену само једну страну?

VI разред

872. Одредити све двоцифрене бројеве који су 4 пута већи од збира својих цифара.

873. Нека је D средиште крака BC једнакокраког троугла ABC . Израчунати дужину основице AB тог троугла ако је познато да је његов обим 25 см, а да је обим троугла ABD за 1 см већи од обима троугла ADC .

874. Израчунати збир свих природних бројева којима је при дељењу са 6 количник једнак остатку.

875. У оштроуглом троуглу ABC је $\angle BAC = 2\angle ABC$. Доказати да висина из темена C и симетрала угла BCA образују угао једнак полуразлици углова BAC и ABC .

876. Каубој пешачи од места А до места Б, а враћа се назад јашући, и за све то му је потребно $5\frac{1}{4}$ сати. Да је пешачио у оба смера требало би му 7 сати. Колико би му времена требало да је јахао у оба смера? (Подразумева се да каубој пешачи и јаше константним брзинама.)

VII разред

877. Упоредити бројеве $\sqrt{7} - \sqrt{7}$ и 2.

878. Доказати да вредност израза $(8^{2n+1} \cdot 16^n) : 4^{5n+1}$ не зависи од природног броја n .

879. Израчунати обим једнакокраког трапеза ако су му оштри углови 45° , дужина висине $2\sqrt{2}$ см и површина 32 см 2 .

880. Цифра десетица два различита двоцифрена броја је 6. Ако у сваком од њих цифре десетица и јединица замене места, производ тако добијених бројева је једнак произвodu датих бројева. О којим бројевима је реч?

881. Страница AB правоугаоника $ABCD$ је два пута већа од странице BC . Нека је E тачка странице AB таква да су углови AED и DEC једнаки. Одредити величину тих углова.

VIII разред

882. Доказати да је $4x^2 - 4x + 3 > 0$ за сваки реалан број x .

883. Збир дужина катета датог правоуглог троугла је 22 см. Ако се једна катета смањи за 4 см, а друга повећа за 2 см, добија се правоугли троугао чија је површина једнака површини датог троугла. Одредити дужине катета датог троугла.

884. Одредити бројеве x , y и z такве да је $xy = 20$, $yz = 35$ и $xz = 28$. Наћи сва решења.

885. У кружницу полупречника дужине R смештено је шест подударних мањих кружница полупречника дужине r , тако да свака додирује велику кружницу и две суседне мале кружнице. Одредити R у функцији од r .

886. Колико има четвороцифрених бројева у којима се појављују тачно две различите цифре?


ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2006.

IV разред


887. Одредити разлику највећег и најмањег шестоцифреног броја записаних помоћу цифара 0, 2, 3, 6, 7 и 9, тако да се свака цифра појављује у сваком од бројева тачно једном.

888. Ако су x и $x - 2006$ природни бројеви, колико решења има неједначина $x - 2006 < 6002$?

889. Од два правоугаоника чије су дужине страница 15 см и 3 см делимичним преклапањем (као на слици) добијена је фигура (у облику слова Т). Израчунати обим тако добијене фигуре.



Сл. уз задатак 889



Сл. уз задатак 890

890. Квадрат је подељен на четири једнака правоугаоника (као на слици). Ако је обим једног од тако добијених правоугаоника 20 см, одредити површину квадрата.

891. Колико листова има књига ако је за нумерисање њених страна употребљено тачно 77 седмица?

V разред

892. Одредити све парове цифара x и y тако да важи $\frac{x}{5} - \frac{2}{y} = \frac{4}{5}$.

893. Означимо са $*$ операцију на скуповима дефинисану са $A*B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Одредити $A * B$ ако је $A = \{x \mid x \in \mathbf{N}, 500 \leq x \leq 2005\}$, а $B = \{x \mid x \in \mathbf{N}, x$ паран, $1000 \leq x \leq 2006\}$.

894. Збир два угла износи $\frac{8}{9}$ правогугла, а један од њих је за четвртину правогугла већи од другог. Колики су ти углови?

895. Множењем два двоцифрена броја добија се број у чијем се запису појављују једино седмице. Одредити све такве парове двоцифрених бројева.

896. У једној години је било 53 петка. Ако је 1. јануар био четвртак, који дан је био 1. април?

VI разред

897. Одредити 2006-у цифру иза децималне запете у децималном запису броја $\frac{21}{37}$.

898. При сабирању два децимална броја ученик је непажњом код једног од бројева померио децималну запету за два места удесно. Услед тога је уместо резултата 62,5876 добио 295. Које бројеве је ученик требало да сабере?

899. У оштроуглом једнакокраком троуглу ABC дужина основице AB већа је од дужине крака BC . Симетрала угла на основици и висина из истог темена граде угао од 18° . Колики је угао на основици тог троугла?

900. Нека је $ABCD$ правоугаоник ($AB > BC$), а тачке E и F су такве да су троуглови AED и CDF једнакостранични и тачка E припада унутрашњости и правоугаоника $ABCD$ и троугла CDF . Доказати да је троугао BEF једнакостраничан.

901. Таблица 5×5 попуњена је на произвољан начин бројевима из скупа $\{-1, 0, 1\}$. Посматрају се зброви тих бројева по врстама, колонама и обе дијагонале таблице. Доказати да међу њима бар два морају бити једнака.

VII разред

902. Израчунати вредност израза $\frac{a^2 + b^2}{ab}$ ако се зна да је $\frac{a+b}{b} = 2 - \sqrt{2}$.

903. Нека су a и b дужине основица AB и CD , а c дужина крака једнакокраког трапеза $ABCD$ са узајамно нормалним дијагоналама. Доказати да је $c = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$.

904. Нека је $a = 2^{2005} - 2^{2004} + 2^{2003}$, $b = 2^{2004} - 2^{2005} + 2^{2006}$, а $c = 3\sqrt{3} \cdot 2^{2003}$. Доказати да је збир квадрата нека два од бројева a, b, c једнак квадрату трећег.

905. Нека су P и R тачке страница AB и CD паралелограма $ABCD$ и нека је $\{Q\} = PC \cap BR$ и $\{S\} = AR \cap DP$. Доказати да је површина четвороугла $PQRS$ једнака збиру површина троуглова ASD и BCQ .

906. Бројеви $1, 2, \dots, 9$ су подељени у три групе. Доказати да бар у једној од тих група производ бројева није мањи од 72.

VIII разред

907. Ако су x и a реални бројеви такви да важи $x + \frac{1}{x} = a$, изразити $x^4 + \frac{1}{x^4}$ у функцији од a .

908. Одредити цифре x , y и z такве да је $\frac{1}{x+y+z} = 0.\overline{xyz}$. Наћи сва решења.

909. Дужине катета правоуглог троугла ABC су a и b . Симетрала правог угла код темена C сече хипотенузу у тачки D . Израчунати дужину дужи CD .

910. Одредити све реалне бројеве a за које једначина $|x - 1| + |x - 2| = a$ има бесконачно много решења.


911. Одредити запремину квадра код кога су растојања од тачке пресека дијагонала до ивица једнака 7 см, 8 см и 9 см.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2006.**IV разред**

912. Одредити све троцифрене бројеве чији производ са неким једноцифреним бројем је 2030.

913. Мирко је од комада картона облика квадрата одсекао комаде облика осам једнаких малих квадрата тако да је остао комад облика фигуре као на слици. Ако је површина те фигуре 200 mm^2 , израчунати њен обим.

914. На сваком од такмичења из математике, српског језика и природе из једне школе учествовало је по 30 ученика. Колико је ученика из те школе учествовало на сва три такмичења ако се зна да је 23 ученика учествовало на по тачно једном, а 23 ученика на по тачно два такмичења?



Сл. уз задатак 913

915. Ако неком броју допишемо са десне стране 9, добијени број поделимо са 13, затим количнику допишемо са десне стране 1 и добијени број поделимо са 11, добијамо број 21. Који је почетни број?

916. Од три коцке са ивицама дужине 1 см, 2 см и 3 см треба направити (само прислањањем, без сечења) тело најмање могуће површине. Колика је та површина?

V разред

917. У једној корпи налазе се црвене, а у другој беле руже. Број црвених једнак је $\frac{7}{8}$ броја белих ружа. Ако се 7 белих ружа премести у корпу са црвеним ружама, у корпама ће бити исти број ружа. Колико има црвених ружа?

918. Производ пет узастопних природних бројева је број $\overline{95 * 4*}$. Одредити непознате цифре.

919. Нека је $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{a, b, 4\}$, $C = \{2, 4, c\}$, $D = \{a, b, 3\}$, $E = \{1, b\}$. Одредити бројеве a, b, c и d тако да важи $B \subset A$, $C \subset A$, $D \subset A$ и $E \subset B$. Подразумева се да су у сваком од датих скупова елементи различити.

920. Пресек правоугаоника $ABCD$ и $PQRS$ је правоугаоник $TURS$, при чему је $PQUT$ квадрат површине 25 cm^2 . Израчунати површину правоугаоника $ABCD$ ако је површина правоугаоника $TURS$ једнака $\frac{2}{7}$ површине правоугаоника $PQRS$, а такође једнака $\frac{2}{11}$ површине правоугаоника $ABCD$.

921. Првих десет простих бројева исписани су један иза другог у растућем поретку. На тај начин је добијен низ цифара. Избрисати девет цифара из тог низа тако да број који чине преостале цифре буде највећи могућ.

VI разред

922. Разлика $\frac{7}{9}$ једног и $\frac{7}{9}$ другог броја је $\frac{3}{7}$. Колико износи разлика $\frac{3}{4}$ другог и $\frac{3}{4}$ првог броја?

923. Кроз центар O уписане кружнице у троугао ABC повучена је права паралелна са AB која сече AC у тачки K , а BC у тачки L . Ако је дужина дужи AB једнака c , а обим троугла KLC једнак s , колики је обим троугла ABC ?

924. Одредити најмањи 2006-тоцифрен природан број који се записује само цифрама 0, 2 и 6, а дељив је са 18.

925. Тачка M је средиште странице AD паралелограма $ABCD$, а тачка K је пресек дужи BD и CM . Доказати да је $3KD = BD$.

926. Продавац има шест балона запремине 7, 9, 13, 14, 15 и 16ℓ . Неки од њих су напуњени соком од боровнице, неки соком од рибизле, а само један је празан. Укупна запремина сока од боровнице је два пута већа од укупне запремине сока од рибизле. Одредити садржај сваког балона.

VII разред

927. Одредити скуп свих целих бројева a за које је $\frac{a^2}{a+3}$ цео број.

928. Израчунати површину ромба чији је обим 36 см, а збир дужина дијагонала 20 см.

929. Одредити све двоцифрене бројеве \overline{ab} чији је корен једнак $a + \sqrt{b}$.

930. Израчунати дужину странице правилног дванаестоугла уписаног у круг чији је полупречник дужине R .

931. Колико има петоцифрених бројева који се исто читају и са леве на десну и са десне на леву страну?

VIII разред

932. Данас (15-тог априла 2006.) једна особа пуни толико година колики је збир цифара године њеног рођења. Које године је рођена та особа?

933. Одредити све парове реалних бројева k и n , такве да график функције $y = kx + n$ садржи тачку $M(4, 6)$ и са графиком функције $y = x + 2$ и x осом гради троугао површине 36.

934. Око круга чији је полупречник дужине 2 см описан је једнакокраки трапез површине 20 cm^2 . Израчунати дужине страница тог трапеза.

935. Нека су a , b и c реални бројеви различити од нуле, такви да је збир њихових реципрочних вредности једнак нули. Доказати да је збир бројева a , b и c различит од нуле.

936. Коцка чија је страница дужине 5 см пресечена је са равни која од три ивице са заједничким теменом A одсеца дужи AM , AN и AP једнаке дужине. Ако је однос запремина тако добијених делова коцке $371 : 4$, одредити разлику површина тих делова.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2006.

VI разред

937. Да ли је могуће бројеве $1, 2, \dots, 9$ распоредити у табелици 3×3 тако да производи бројева у свакој врсти и свакој колони буду међусобно једнаки?

938. У једној туристичкој агенцији авионска карта за Лондон може се купити са попустом од 10% ако се резервише од 7 до 13 дана раније од дана путовања, са попустом од 25% ако се резервише од 14 до 29 дана раније од дана путовања и са попустом од 40% ако се резервише 30 и више дана раније од дана путовања. Путник је купио карту за 21 000 динара. Да је резервисао дан касније морао би да је плати 4 200 динара више. Колико дана пре путовања је путник резервисао карту?

939. Нека су тачке E и F средишта страница AD и CD правоугаоника $ABCD$. Ако је тачка G пресек дужи AF и EC , доказати да је $\angle EBF = \angle EGA$.

940. Велики миксер у фабрици еурокрема напуни се славином за течну црну чоколаду за 23 минута, а славином за течну белу чоколаду за 17 минута. После колико времена од отварања славине за црну треба отворити славину за белу чоколаду, тако да у миксеру који је на почетку био празан, на крају буде 2,5 пута више црне него беле чоколаде?

941. У спољашњости правоуглог троугла ABC конструисани су квадрати чије су странице хипотенуза AB и катета AC . Доказати да су растојања од средишта A_1 катете BC до пресека дијагонала сваког од квадрата једнака.

VII разред

942. Испитати да ли постоји природан број од којег се, премештањем прве цифре иза последње, тј. иза цифре јединица, добија пет пута већи број.

943. Нека је k круг са центром O и полупречником дужине 10 cm. Тетиви AB круга k одговара централни угао од 90° . У троугао ABO уписан је круг k_1 , а у област одређену тетивом AB и мањим луком AB уписан је највећи могући круг k_2 . Одредити однос дужина полупречника кругова k_1 и k_2 .

944. Одредити све просте бројеве p такве да број $p^2 + 11$ има тачно 6 различитих делилаца.

945. Квадрати природних бројева записани су редом један за другим: 1491625 Одредити цифру која се налази на 2006. месту у том низу.

946. Тачка D је средиште странице BC троугла ABC , а E је тачка дужи AD таква да је $AE : ED = 3 : 1$. Одредити однос дужи AF и FC , где је F пресечна тачка праве BE и странице AC .

VIII разред

947. Одредити све четвороцифрене природне бројеве \overline{abcd} за које важи


$$\frac{a+b+c}{2} = \frac{a+b+d}{8} = \frac{a+c+d}{8} = \frac{b+c+d}{6}.$$

948. (а) Одредити све могуће остатке при дељењу куба природног броја са 7.

(б) Испитати да ли постоје природни бројеви x и y такви да је $x^3 + y^3 = 2^{2006}$.

949. На столу се налази суд облика праве четворострane призме висине 10 cm, чија је основа квадрат странице дужине 4 cm. У суду је вода која заузима више од половине његове запремине. Суд се нагне тако да додирује сто само једном својом основном ивицом, а угао између равни основе суда и равни стола је 30° . Тада вода дође до горње ивице суда, али не пређе преко ње. Одредити висину празног дела суда пре његовог нагињања.

950. Дато је 50 позитивних реалних бројева чији је збир 100. Доказати да међу њима постоје три броја чији збир није мањи од 6.



Сл. уз задатак 951

951. Дата су два подударна једнакокракоправоугла троугла чије су катете дужине 1 cm (као на слици). Одредити максималну површину пресека ових троуглова која се може добити померањем троуглова по правој p .

САВЕЗНО ТАКМИЧЕЊЕ 2006.

VI разред

952. Троцифрени број \overline{abc} је прост, а број \overline{cba} је куб једног природног броја. О којим бројевима је реч?

953. Нека је K средиште тежишне дужи CC_1 троугла ABC и M пресечна тачка правих AK и BC . Одредити однос дужина дужи CM и MB .

954. На столу су три свеће једнаких дужина, али неједнаких дебљина. Јагода је у 8 h упалила прву свећу, а после једног сата и друге две. Сат после тога су се изједначиле по дужини прва и трећа свећа. Када ће се изједначити по дужини прва и друга свећа ако трећа цела изгори за 8 сати, а друга цела изгори за 12 сати?


955. У једнакокраком троуглу ABC је $\angle CAB = \angle ABC = 40^\circ$. Симетрала угла CAB сече наспрамни крак у тачки D . Доказати да је $AD + DC = AB$.

956. Јелена и Радован играју следећу игру. На листу облика паралелограма наизменично уписују кругове, све једнаке величине, који се не поклапају међу собом и не излазе из оквира папира. Победник је онај ко упише последњи круг. Доказати да Јелена, ако она прта први круг, може да игра тако да сигурно побеђује.

VII разред

957. Да ли постоје прости бројеви p , q и r такви да је

$$pqr + pq + qr + rp + p + q + r = 2006 ?$$



Сл. уз задатак 958

958. Квадрат $ABCD$ странице a разрезан је на 5 фигура једнаких површина као на слици. Тачке F и G припадају дијагонали AC , а дужи NH и ME паралелне су дијагонали BD . Израчунати обим петоугла $BEFGH$.

959. Нека је

$$\frac{1}{1 \cdot 6 \cdot 11} + \frac{1}{6 \cdot 11 \cdot 16} + \frac{1}{11 \cdot 16 \cdot 21} + \cdots + \frac{1}{1996 \cdot 2001 \cdot 2006} = \frac{p}{q}$$

и нека су p и q узајамно прости бројеви. Доказати да број q није дељив са 2006.

960. Кошаркаш на тренингу изводи слободна бацања. Прво је промашио, а испоставило се да је на крају тренинга имао проценат успешности (однос броја датих кошева и броја свих покушаја) слободних бацања већи од 80%. Доказати да је у једном тренутку проценат успешности овог кошаркаша био тачно 80%.

961. У унутрашњости правоугаоника чије су странице 7 см и 3 см на произволјан начин је распоређено 9 тачака. Доказати да постоје две тачке чије је растојање мање од $\sqrt{5}$ см.

VIII разред

962. За природан број кажемо да је палиндром ако се исписивањем цифара у обрнутом поретку добија исти број (на пример, 7482847 је палиндром). Наћи највећи петоцифрени палиндром који је дељив са 101.

963. У троуглу ABC тачка A_1 је средиште странице BC , а тачка E је пресек симетрале угла CAB и странице BC . Круг описан око троугла AEA_1 сече странице AB и CA , редом, још у тачкама F и G . Доказати да је $BF = CG$.

964. Производ три позитивна броја је 1, а њихов збир је већи од збира њихових реципрочних вредности. Доказати да је тачно један од ових бројева већи од 1.

965. На рукометном турниру за победу се добија 2 бода, за реми 1 бод, а за пораз 0 бодова. Зна се да је свака екипа играла са сваком једанпут и да је победничка екипа на крају освојила 7 бодова, другопласирана 5 бодова, а трећепласирана екипа 3 бода. Колико бодова је имала екипа која је била последња на турниру?

966. У троуглу ABC је $\angle A = 60^\circ$, $\angle C > 60^\circ$, D и E су тачке на страници BC такве да је AD симетрала угла CAB , а AE симетрала угла BAD и $CD = DE$. Одредити $\angle BCA$.

ИЗВОРНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА 10. ЈУНИОРСКОЈ БАЛКАНИЈАДИ

967. Одредити највећи природан број n , такав да је број $n^2 + 2006n$ потпун квадрат.

968. Дат је једнакокраки троугао чија је основица a и крак b . Ако за углове на основици важи $\angle ABC = \angle BCA = 80^\circ$, онда је $a^3 + b^3 = 3ab^2$. Доказати.

969. Правоугаоник је са 6 хоризонталних и 6 вертикалних правих подељен на 49 мањих правоугаоника. Обими малих правоугаоника су цели бројеви. Доказати да је и обим великог правоугаоника цео број.

ДЕСЕТА ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА


Чишинау (Молдавија), 2006.

970. Доказати да за сваки сложени број $n > 4$, број $2n$ дели производ $(n - 1)!$.

971. Нека је ABC једнакокраки троугао са $AB = AC$ и $\angle BAC < 60^\circ$. Нека су D и E унутрашње тачке странице AC такве да је $EB = ED$ и $\angle ABD = \angle CBE$. Симетрале углова ACB и BDC секу се у тачки O . Израчунати $\angle COD$.

972. Цео број $n > 1$ се зове *савршеним* ако је збир свих његових делилаца (укључујући 1 и n) једнак $2n$. Наћи све савршене бројеве n такве да су $n - 1$ и $n + 1$ прости бројеви.

973. Нека је $n \geq 2$ цео број. Из квадратне таблице $2n \times 2n$ (састављене од 1×1 малих квадрата) уклоњени су неки од малих квадрата, и то: средња два из реда број 2, средња четири из реда број 3, ..., средња $2n - 2$ из реда број n , средња $2n - 2$ из реда број $n + 1$, ..., средња четири из реда број $2n - 2$ и средња два из реда број $2n - 1$, тако да се добила нова фигура (као што је показано на датој слици за $n = 4$). Наћи највећи број 2×1 правоугаоника који се могу поставити на добијену фигуру, без преклапања, тако да сваки правоугаоник прекрива тачно два мала квадрата.



Сл. уз задатак 973

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2007.

III разред

974. Израчунај:

a) $462 + 231 =$ б) $892 - 351 =$
в) $486 + 392 - 678 =$

975. Које бројеве треба написати на црте тако да једнакост буде тачна:

$$8 \cdot \underline{\quad} + 8 : \underline{\quad} = 60 ?$$

976. Мењајући место тачно једном „штапићу“ учини да једнакост постане тачна:

$$\text{II} + \text{IV} + \text{VI} = \text{XIV}.$$

Нађи два различита решења.

977. Користећи цифре 5 и 2 можеш да напишеш 8 троцифрених бројева (цифре се могу понављати).

- а) Одреди два таква броја чији је збир 77.
б) Одреди два таква броја чија је разлика 33.

Нађи сва могућа решења.


978. Софија је написала број који је за 70 већи од броја који је за 148 мањи од 600. Који број је Софија написала?

IV разред

979. Ако је $a + b = 2\ 006\ 000$, израчунати $a + 444\ 444 + b$.

980. Брат има 20, а сестра 6 година. За колико година ће брат бити два пута старији од сестре?

981. Дужина странице квадрата је 2007 см. Тада је паралелним дужима подељен на 27 једнаких правоугаоника, као на слици. Израчунати обим једног од тих правоугаоника.



982. У једној основној школи је 1458 ученика, а у другој 946. Колико ученика треба преместити из једне школе у другу тако да у обе школе буде исти број ученика?

Сл. уз зад. 981


983. Збир три различита четвороцифрена броја је 10 000. Ако је a највећи од та три броја, колика је највећа могућа вредност броја a ?

V разред


- 984.** Производ $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9$ поделити бројем 4536.
- 985.** Разлика мера два комплементна угла је $2007'$. Одредити мере тих углова.
- 986.** Одредити све четвороцифрено бројеве деливе са 15 код којих је цифра десетица 5, а цифра стотина 1.
- 987.** Дуж AB дужине 60 см тачкама C и D подељена је на три неједнака дела. Растојање средишта крањних делова је 45 см. Колика је дужина дужки CD ?
- 988.** Скупови A и B имају исти број елемената. Ако је $A \cup B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ и } x < 18\}$, а $A \cap B = \{1, 2, 7, 13, 17\}$, одредити скупове A и B знајући да је сваки елемент скупа $A \setminus B$ већи од сваког елемента скупа $B \setminus A$.

VI разред

- 989.** Израчунати вредност израза $\frac{9 \cdot \left(-2007 + \frac{2007}{9} \right)}{(9 \cdot 2007 - 2007) : 9}$.
- 990.** Израчунати збир заједничких целобројних решења неједначина $7x - 16 \geq -58$ и $-9x + 73 > 100$.
- 991.** У троуглу ABC тачка M је средиште странице AB . Ако је MN паралелно са AC и MP паралелно са BC (као на слици), доказати да је $\triangle AMP \cong \triangle MBN$.



Сл. уз зад. 991



Сл. уз зад. 993

- 992.** Упоредити бројеве a и b ако је

$$\begin{aligned} a &= 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots + 2005 - 2006, \\ b &= 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + \cdots + 2005 - 2007. \end{aligned}$$


- 993.** Израчунати углове једнакокраких троуглова ABC ($AC = BC$) и BDE ($BE = DE$) (видети слику).

VII разред


994. Израчунати x ако је $\frac{1}{9} \cdot 3^{10} + \frac{1}{3} \cdot 3^9 - 5 \cdot 3^8 = x \cdot 3^8$.

995. Поредјати бројеве $-5\sqrt{2}$, $4\sqrt{3}$, $-3\sqrt{5}$ и $2\sqrt{6}$ по величини од већег ка мањем.

996. Користећи податке са слике одредити меру угла $\alpha + \beta$.



Сл. уз зад. 996



Сл. уз зад. 1001

997. Упоредити бројеве 15^{15} и 45^{10} .

998. Израчунати површину једнакокраког трапеза $ABCD$ чије су дијагонале узајамно нормалне, а дужина висине је 5 см.

VIII разред

999. Дужина правоугаоника повећана је за $p\%$, а ширина је смањена за $p\%$. Ако се површина правоугаоника смањила за 16% , одредити p .

1000. У скупу реалних бројева решити неједначину

$$\frac{x}{2 \cdot 3} + \frac{x}{3 \cdot 4} + \frac{x}{4 \cdot 5} + \frac{x}{5 \cdot 6} - x \geq -\frac{2}{3}.$$

1001. Правоугаоник се састоји од шест квадрата, као на слици. Ако је површина троугла ABC једнака 32 cm^2 , израчунати површину троугла ADE .

1002. У скупу реалних бројева решити једначину $x + |x| = \frac{x}{|x|}$.

1003. У простору су дате две различите паралелне праве и три различите тачке. Колико највише равни оне одређују?


ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2007.**III разред**

1004. Израчунај:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a) $438 + 163$; | b) $908 - 159$; |
| v) $60 : 5 + 5 \cdot 3$; | g) $85 + 15 : 5$. |

- 1005.** Нацртaj на свом папиру круг са центром у тачки O и две праве m и n које се секу ван тог круга (види слику).

- a) Нацртај тачку B која припада и нацртаном кругу и правој n .
 - b) Нацртај праву s која сече праву n у тачки B и пролази кроз центар O круга.
 - в) Нацртај тачке C и D у којима права s сече кружну линију (кружницу).
 - г) Шта представља дуж OC за дати круг?



Сл. уз. зад. 1005

- 1006.** Симонида је рекла: „За три године ќу имати три пута мање година од своје мајке, која сада има 27 година.“ Колико година Симонида има сада?

- 1007.** Милан је поподне гледао пренос утакмице на ТВ-у од 14 часова и 30 минута до 16 часова и 15 минута, а увече емисију о рибама од 19 часова и 15 минута до 20 часова и 10 минута.

- a) Колико је трајао пренос утакмице?
б) Да ли је дуже трајао пренос утакмице или емисија о рибама и за колико?

- 1008.** Број 509 има збир цифара 14 јер је $14 = 5+0+9$. Нађи највећи троцифрени број чији је збир цифара 12 и најмањи троцифрени број чији је збир цифара 21, а затим и разлику тих добијених бројева.

IV разред

- 1009.** Између две цифре броја 664422 уписати цифру 3 тако да добијени седмоцифрени број буде:

- (а) највећи могући. (б) најмањи могући.

- 1010.** Годишњи комплет Математичких листова састоји се од шест свешчица. Свешчице не морају имати исти број страница, али се зна да свака свешчица има 40 или 44 странице. Одредити може ли годишњи комплет Математичких листова имати укупно 260 страница.

- 1011.** Правоугаоник је са две паралелне праве подељен на три једнака квадрата. Колико пута је обим тог правоугаоника већи од обима једног од квадрата?


- 1012.** Љиља и Биља заједно имају 228 динара, а Маша и Таша 166. Ако Љиља има 70 динара више од Маше, ко има више динара, Биља или Таша и за колико?

- 1013.** Колико има троцифрених природних бројева чији је збир цифара једнак 4, а колико четвороцифрених природних бројева чији је производ цифара једнак 4?


V разред

1014. Цифрама 1, 4, 5 и 7 написати све троцифрене бројеве чије су све цифре међусобно различите, а деливи су са 3.

1015. Израчунати мере углова на слици.



Сл. уз зад. 1015



Сл. уз зад. 1017

1016. У једној школи сваки ученик учи бар један од два језика, енглески и француски. Енглески језик учи $\frac{4}{5}$ свих ученика, а француски $\frac{3}{4}$. Који део свих ученика учи оба језика?

1017. Правоугаоник $ABCD$ подељен је на шест квадрата, као на слици. Одредити површину правоугаоника $ABCD$ ако је обим квадрата $EFGH$ једнак 8 см.


1018. Поређати, од мањег ка већем, бројеве $\frac{2}{9}$, $\frac{25}{111}$ и $\frac{447}{2007}$.

VI разред

1019. Одредити збир целобројних решења неједначине $|x - 1| < 6$.

1020. Симетрале углова BAC и ABC троугла ABC секу се под углом од 124° . Одредити меру угла ACB .

1021. Аца, Бора и Веса су имали неколико кликера у кеси. Аца је пришао и додао онолико кликера колико је било у кеси и још 1 кликер. Затим је Бора пришао и додао два пута онолико кликера колико је у том тренутку било у кеси и још 3 кликера. Последњи је пришао Веса и додао три пута онолико кликера колико је у том тренутку било у кеси и још 5 кликера. Ако је на крају у кеси било 149 кликера, колико кликера је било у кеси на почетку?



Сл. уз зад. 1022

1022. На дужи AD дата је тачка B , таква да су троуглови ABC и DEB правоугли, а троугао CBE једнакокрако правоугли, као на слици. Доказати да су троуглови ABC и DEB подударни.

1023. У једној школи има 800 ученика. Доказати да бар три ученика имају рођендан истог датума.

VII разред

1024. Израчунати вредност израза $\sqrt{(\sqrt{5} - 5)^2} - (\sqrt{5} - 5)$.

1025. У правоуглом троуглу ABC дужине катета AC и BC су редом 30 см и 40 см. Ако је C_1 средиште хипотенузе, а C_2 подножје хипотенузине висине, израчунати дужину дужи C_1C_2 .

1026. Дужине страница AB и BC правоугаоника $ABCD$ су редом 5 см и 3 см. Пресек праве која садржи тачке B и C и симетрале угла BAD је тачка M , а пресек праве која садржи тачке A и D и симетрале угла BCD је тачка N . Израчунати површину четвороугла $ANCM$.

1027. Одредити најмањи природан број који је дељив са 15, а свака цифра му је 0 или 4.

1028. Одредити најмањи природан број који се може добити кад се у изразу $1 * 2 * 3 * \dots * 2005 * 2006$ свака звездица замени са + или -.

VIII разред

1029. У једначини $3 \cdot (x - 4k) - 2k = 3 \cdot (2x - 3) + 1$ број k је реалан параметар. Одредити све вредности тог параметра за које је решење једначине веће од -2 .

1030. У једнакостраничан троугао ABC уписана су три круга, тако да сваки од њих додирује по две странице и уписан је круг k тог троугла. Одредити однос површине круга k и збира површина та три уписане кругове.

1031. Одредити скуп свих вредности позитивног реалног броја a за које неједначина $|x - 2| < a$ има тачно четири решења у скупу целих бројева.

1032. Коцка чија ивица је дужине 10 см пресечена је једном равни на два квадра. Одредити однос запремина тих квадара ако је однос њихових површина $2 : 3$.


1033. На свакој страници квадрата дате су по 3 тачке тако да ниједна од њих није теме квадрата. Колико је троуглова одређено овим тачкама?

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2007.**IV разред**


1034. Колико има троуглова на слици? Навести те троугллове.

1035. На колико начина Воја, Раде и Зоран могу да поделе 7 једнаких кликерса, тако да сваки од њих добије бар један кликер?

1036. Травњак је облика правоугаоника чија је краћа странница дужине 16 м. Око травњака је направљена стаза исте ширине на свим правцима (као на слици) чија је површина 176 m^2 . Израчунати дужину друге странице правоугаоника



Сл. уз зад. 1034



Сл. уз зад. 1036

(травњака) ако пешак који обиђе целу стазу идући спољном ивицом те стазе пређе 16 m више него пешак који обиђе целу стазу идући унутрашњом ивицом те стазе.

1037. У шуми је укупно било 565 фазана и јаребица. Када је број фазана порастао 3 пута, а број јаребица порастао 5 пута, било их је укупно 2007. Колико је фазана, а колико јаребица било на почетку у шуми?

1038. Дата је једнакост ВУК + ЛОВАЦ = БАЈКА. Иста слова заменити истом цифром, а различита слова различитим цифрама, тако да једнакост буде тачна. Познато је да слово Л треба заменити цифром 5. Детаљно образложити.

V разред

1039. Одредити све природне бројеве a и b такве да је $\frac{a}{10} + \frac{b}{15} = \frac{5}{6}$ и $\frac{1}{2} < \frac{a}{10} < \frac{3}{4}$.

1040. Стена у облику коцке чија је дужина ивице 10 m исечена је на једнаке коцкице чије су дужине ивица 1 dm. Ређањем тих коцкица једне поред друге поплочана је правоугаона стаза ширине 1 m. За колико сати би ту стазу прешао пешак који сваког сата прелази 5 km?

1041. Одредити све просте бројеве p , q и r такве да је $2p + 3q + 4r = 2006$.

1042. При дељењу бројева 287 и 431 природним бројем n добијају се редом остаци 1 и 2, а при дељењу броја 231 бројем $n+1$ добија се остатак 3. Одредити све такве бројеве n .

1043. Нацртати 6 правих и 7 тачака тако да свака од тих правих садржи тачно 3 од тих тачака.

VI разред

1044. Одредити све парове природних бројева a и b таквих да је $a + b = 30$ и $\frac{2005}{2007} = \frac{198}{223} + \frac{a}{b}$.

1045. Нека је $ABCD$ паралелограм код кога је $AB > BC$. Права p која садржи пресек дијагонала O и нормална је на дијагоналу BD сече страницу AB у тачки M и страницу CD у тачки N . Доказати да је четвороугао $MBND$ ромб.

1046. Ако су a и b прости бројеви већи од 3 и $a > b$, доказати да је производ $(a+b) \cdot (a-b)$ дељив са 12.

1047. У оштроуглом троуглу ABC тачке D и E су средишта страница AC и BC . Ако се симетрале углова ADE и BED секу на страници AB , доказати да је $AB = \frac{AC + BC}{2}$.

1048. Одредити колико има једнакокраких троуглова чије странице имају целобројне дужине (у см), а обим им је једнак 2005 см.

VII разред

1049. Доказати да је $\sqrt{5 + \sqrt{\sqrt{17} + \sqrt{37}}} + \sqrt{2} > 3$.

1050. У квадрат чија је дужина странице 10 см уписан је правилни дванаестоугао, тако да свакој страници квадрата припада по једна страница дванаестоугла. Израчунати дужину странице тог дванаестоугла.

1051. Упоредити бројеве $3^{2007} - 2^{3000}$ и $2007 \cdot 2^{2007}$.

1052. Испитати да ли постоји троугао чије су дужине висина 1 см, 2 см и 3 см.

1053. Одредити колико има четвороцифрених бројева који се записују помоћу цифара 1, 2 и 3, али тако да се ниједна од тих цифра не појављује више од два пута у запису броја.

VIII разред

1054. Доказати да је број $2007^{2005} - 2007$ дељив са 90.

1055. Бочна страна правилне тростране пирамиде је једнакокраки троугао са углом од 30° при врху. Дужина бочне ивице је 8 см. Израчунати површину те пирамиде.

1056. Израчунати разлику израза $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 2005^2$ и $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + 2004 \cdot 2006$.

1057. Хипотенузе BC и AD правоуглих троуглова ABC и ABD секу се у тачки E . Ако је дужина дужи AC једнака 6 см, а дужина дужи BD једнака 3 см, израчунати растојање тачке E од дужи AB .

1058. Петоцифрен број је „петоразлик“ ако су му све цифре различите и припадају скупу $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Израчунати збир свих таквих бројева.

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 2007.

VI разред

1059. Одредити све седмоцифрене бројеве који почињу са 7002, а дељиви су и са 5 и са 7 и са 11.

1060. Конструисати паралелограм $ABCD$ чија је дијагонала AC дужине 6 cm, дијагонала BD дужине 4 cm, а висина DD' дужине 3 cm.

1061. На једном тестирању учествовало је 300 ученика, од којих је 10% било дечака. Сви дечаци су освојили исти број бодова, а просечан број бодова девојчица је био 83. Ако је просечан број бодова свих ученика био 84, колико бодова је освојио сваки дечак? (*Напомена.* Просечан број бодова за неколико ученика се рачуна тако што се збир бодова које су освојили ти ученици подели бројем тих ученика.)

1062. Троуглови ABC и $A_1B_1C_1$ су једнакокракоправоугли са хипотенузама AB и A_1B_1 , при чему $C_1 \in BC$, $B_1 \in AB$, $A_1 \in AC$. Доказати да је $AA_1 = 2 \cdot CC_1$.

1063. Дато је 2007 различитих простих бројева. Доказати да се бар 502 од тих бројева завршавају истом цвртом.

VII разред

1064. Ако за реалне бројеве a и b важи једнакост $ab = a - b$, доказати да вредност израза $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - ab$ не зависи ни од a ни од b .

1065. У правоуглом троуглу ABC са правим углом код темена C дата је тачка D таква да је дужина дужи CD једнака 5 cm. Одредити дужину хипотенузе AB ако су и површина троугла ACD и површина троугла BCD једнаке четвртини површине троугла ABC .

1066. Ђирило је написао на табли низ од пет бројева тако да је разлика сваког броја (почев од другог) и његовог претходника један исти број. Онда је дошао Методије и заменио све цифре словима, и то исте цифре истим словима, а различите цифре различитим словима. Тако је добијен запис: A, BC, BD, CE, FF . Које бројеве је написао Ђирило?

1067. Испитати постоји ли природан број n , такав да је збир $2^n + 3^{n+3}$ једнак квадрату неког природног броја.

1068. Нека су D и E тачке у којима уписаны круг троугла ABC додирује стране AC и BC , а O центар тог круга. Ако је F пресечна тачка правих DE и AO , израчунати меру угла AFB .

VIII разред

1069. Одредити најмањи реалан број A , такав да за било који реалан број x за који је $|x - 2| < 0,04$ важи да је $|x^2 - 5| < A$.

1070. Тачка D је средиште странице AC троугла ABC . Симетрала угла ADB сече страницу AB у тачки E , а симетрала угла BDC сече страницу BC у тачки F . Ако је пресек дужи BD и EF тачка M , доказати да је $EM = MF$.

1071. Одредити највећи заједнички делилац свих бројева облика $4^n + 15n - 1$, где је n природан број.

1072. Дужине ивица квадра (у см) су природни бројеви. Ако се површина тог квадра (у cm^2) изражава истим бројем као збир дужина свих ивица тог квадра, одредити дужине ивица тог квадра.

1073. Раша и Гаша имају чоколаду квадратног облика која се састоји од $27 \cdot 27$ коцкица. На почетку је чоколада код Раше. Онај који држи чоколаду пресече је праволинијски једним потезом ножа онако како жели на два дела, али тако да не „оштети“ ниједну коцкицу. Један део поједе, а други да противнику. Губи онај играч који добије само једну коцкицу. Који од двојице играча може смислити стратегију којом побеђује независно од тога како противник игра и која је то стратегија?

ПРВА СРПСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

1074. У унутрашњој области паралелограма $ABCD$ дата је тачка P таква да је $\angle ADP = \angle ABP$ и да је $\angle DCP = 30^\circ$. Одредити меру $\angle DAP$.

1075. На једној прослави било је укупно 2007 особа. За сваке 1003 од тих особа постојала је бар једна особа од преосталих присутних која се познавала са сваком од те 1003 особе. Доказати да је на прослави постојала особа која се познавала са свим присутним особама.

1076. За позитивне реалне бројеве x , y и z важи да је $xyz = 1$. Доказати да је

$$\frac{2}{(x+1)^2 + y^2 + 1} + \frac{2}{(y+1)^2 + z^2 + 1} + \frac{2}{(z+1)^2 + x^2 + 1} \leq 1.$$

1077. Поља таблице димензије 3×3 попуњена су бројевима -1 и 1 . У сваком кораку истовремено се у свако поље таблице упише производ свих бројева који су у пољима која са тим пољем имају заједничку ивицу. Да ли се, независно од тога који су бројеви били у пољима таблице на почетку, овим поступком може добити да у свим пољима таблице буде број 1 ?

1078. Наћи највећи природан број k такав да постоји број облика $1! + 2! + \dots + n!$ ($n \in \mathbb{N}$) чији је делитељ број 3^k . [$m! = m \cdot (m-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$]

1079. Тачке D , E и F припадају редом страницима AB , BC и CA оштроуглог троугла ABC , при чему дужине дужи AE , BF и CD нису веће од $\sqrt{3}$ см. Доказати да површина троугла ABC није већа од $\sqrt{3}$ cm^2 .

**ЈЕДАНАЕСТА ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА
МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА**

Шумен (Бугарска), 2007.

1080. Нека је a позитиван реалан број, такав да је $a^3 = 6(a + 1)$. Доказати да једначина $x^2 + ax + a^2 - 6 = 0$ нема реалних решења.

1081. Нека је $ABCD$ конвексан четвороугао у којем је $\angle DAC = \angle BDC = 36^\circ$, $\angle CBD = 18^\circ$ и $\angle BAC = 72^\circ$. Дијагонале AC и BD секу се у тачки P . Одредити величину $\angle APD$.


1082. У равни је дато 50 тачака, од којих никоје три не припадају истој правој. Свака од тих тачака је обојена једном од четири дате боје. Доказати да постоји боја и најмање 130 разностраничних троуглова чија су темена обојена том бојом.

1083. Доказати да ако је p прост број, тада $7p + 3^p - 4$ није квадрат целог броја.


РЕШЕЊА ЗАДАТАКА

1998. година

1. Како је $9999 : 3 = 3333$ и $1001 : 11 = 91$, то је тражена разлика $3333 - 91 = 3242$.
2. Не може, јер од два узастопна природна броја један је увек паран, а други непаран, па је њихов збир увек непаран број.
3. Када би сви дали по 6 динара сакупили би $32 \cdot 6 = 192$ динара. Значи да су преосталих $246 - 192 = 54$ динара обезбедили дечаци. Како су они дали $9 - 6 = 3$ динара више него девојчице њих има $54 : 3 = 18$, а девојчица је $32 - 18 = 14$.
4. Збир обима оба правоугаоника је $40 + 20 = 60$ см, јер они садрже обим квадрата и још две веће странице правоугаоника (слика). Како је $60 : 5 = 12$ и како је двоструки обим једног правоугаоника једнак троструком обиму другог правоугаоника, то је $O_1 = 36$ см и $O_2 = 24$ см.




Сл. уз задатак 4




Сл. уз задатак 5

5. Тражени троуглови су: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1236, 3458, 6789 и 123456789, па их има укупно $9 + 3 + 1 = 13$ (слика).
6. Како је $A = \{1, 8, 9, 10\}$, $B = \{4, 11, 12, 13\}$ и $C = \{2, 9, 10, 11\}$, то је $A \cap B = \emptyset$ и $(C \setminus A) \cup (A \setminus C) = \{2, 11\} \cup \{1, 8\} = \{1, 2, 8, 11\}$.
7. $\frac{71}{1998} < \frac{72}{1998} = \frac{8 \cdot 9}{9 \cdot 222} = \frac{8}{222} < \frac{8}{221}$.
8. Са слике је очигледно да је $x = (1701 - 1071) : 30 = 630 : 30 = 21$. Тражени бројеви су $1071 : 21 = 51$ и 21 .



Сл. уз задатак 8




Сл. уз задатак 10

9. Угао $\alpha = 33^\circ 18'$; $\beta = 90^\circ - \alpha = 56^\circ 42'$; $\gamma = 180^\circ - \alpha = 146^\circ 42'$.
10. Полупречник круга је $OA - AB = 5 - 3 = 2$ см, па је највеће растојање $AC = AO + OC = 5 + 2 = 7$ см (слика).
11. Решавањем једначина добија се $a = -1800$ и $b = -2196$. Тада је вредност разломка $\frac{a+b}{1998} = \frac{-3996}{1998} = -2$.


12. Како је $3888 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2^4 \cdot 3^5$ то је $m = 3$ и $n = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$. Тада је $3888 \cdot m = 2^4 \cdot 3^5 \cdot 3 = 2^4 \cdot 3^6 = (2^2 \cdot 3^3)^2 = 108^2$ и $3888 \cdot n = 2^4 \cdot 3^5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^6 \cdot 3^6 = (2^2 \cdot 3^2)^3 = 36^3$.

13. Аца за један сат окречи $\frac{1}{10}$ стана. Ако Аца ради 6 сати (4 сам и 2 са Бором) окречиће $\frac{6}{10}$ стана. Значи да Бора за два сата окречи $1 - \frac{6}{10} = \frac{4}{10}$ стана. Дакле, Бора за један сат окречи $\frac{2}{10}$ стана, што значи да би цео стан самостално окречио за 5 сати.


14. Како је $\angle A_1OC_1 = 121^\circ$, то је $\angle A_1OC = 180^\circ - 121^\circ = 59^\circ$ (слика). Тада је $\angle A_1CO = 90^\circ - 59^\circ = 31^\circ$, па је $\angle BCA = 62^\circ$, а $\angle ABC = 59^\circ$. Тада је наспрам већег угла већа страница, па је $AB > AC = BC$.



Сл. уз задатак 14



Сл. уз задатак 15



Сл. уз задатак 19

15. Ако је центар круга M , онда је $AM = BM = r$ (слика). Троуглови AMO и BMO су подударни ($OM = OM$, $AM = BM$ и $\angle A = \angle B = 90^\circ$), па из подударности закључујемо да је и $OA = OB$.

16. Решавањем једначина добијамо $x = 2001$, $y = 669$ и $z = 1998 + \sqrt{3}$, па је $x + y + z = 4668 + \sqrt{3}$.

17. Из $\frac{1998^{1998} + 1998^{1999}}{1999^{1999}} = \frac{1998^{1998}(1 + 1998)}{1999^{1998} \cdot 1999}$ следи $x^{1998} = \frac{1998^{1998}}{1999^{1998}} = \left(\frac{1998}{1999}\right)^{1998}$, па је $x = \frac{1998}{1999}$.

18. Како је $\alpha - \beta = 3\gamma$ и како је $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, то је $2\alpha + \gamma = 3\gamma + 180^\circ$. Дакле, $2\alpha = 2\gamma + 180^\circ$, а само $\alpha = \gamma + 90^\circ$, што значи да је $\alpha > 90^\circ$, а одатле следи да је дати троугао тупоугли.

19. Тражени круг је круг описан око правоугаоника $A_1CB_1C_1$ (слика). Дијагонала d тог правоугаоника је половина хипотенузе $c = 10$ см, дакле 5 см, па је тражени полупречник $r = 2.5$ см.

20. Тражени произвoд је мањи од $100 \cdot 100 = 1000$ и делив са 45, дакле са 5 и са 9. Како је $9 = 3^2$ то број *2*·5 мора бити потпун квадрат мањи од $9999 : 9 = 1111$, што значи да је број *2* мањи од $1111 : 5 = 222$ и делив са 5. Због тога се *2* завршава 0 или 5. У обзир долазе само бројеви 120, 125 и 220. Како је само $125 \cdot 5 = 625 = 25^2$ потпун квадрат то је тражени произвoд $125 \cdot 45 = 75^2$.

21. Нека је тражени двоцифрени број \overline{xy} . Из услова задатка је $9(10x + y) = 100x + y$. Значи да је $10x = 8y$ или $5x = 4y$. Тражене цифре су $x = 4$ и $y = 5$, а тражени број 45, јер је $9 \cdot 45 = 405$.

22. Дата једначина је еквивалентна са следећом једначином: $|x - 1| + |x - 3| = 1998$. Добијена једначина има два решења: $x = 1001$ или $x = -997$.

23. Ако је странница квадрата једнака $4x$, онда је $KD = x$ и $CK = 3x$ (слика). Правоугли троуглови AMB и BCK су слични (имају све углове једнаке). Из сличности је $BC : CK = AM : BM = 4 : 3$, па је $AM = 12$ см. Тада се применом питагорине теореме добија да је $AB = 15$ см, па је површина квадрата 225 см 2 .

24. Дијагонала квадра $D = \sqrt{1^2 + 5^2 + 7^2} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ см. Како је $5\sqrt{3}$ см и дужина дијагонале коцке, то је дужина ивице коцке $a = 5$ см. Површина и запремина коцке су редом $P = 150$ см 2 и $V = 125$ см 3 .


25. Тражени збир је $(11 + 12 + 13 + 14 + 15) \cdot (11 + 12 + 13 + 14 + 15) = 65^2 = 4225$.

26. Нека јесен има x дана. Тада зима има $x - 1$ дан, лето $x + 4$ и пролеће $x + 2$ дана. Дакле $x + x - 1 + x + 4 + x + 2 = 365$, па је $4x + 5 = 365$. Одавде је $x = 90$, тј. јесен има 90 дана, зима 89 дана, лето 94 дана и пролеће 92 дана.

27. Нека је чинилац који је остао исти x . Тада је $24 \cdot x = 1998 - 1110$. Дакле, $24x = 888$ или $x = 888 : 24 = 37$. Други чинилац је $1998 : 37 = 54$.

28. Све масе од 1 kg до 13 kg: 1; 2 = 3 - 1; 3 = 3; 4 = 3 + 1; 5 = 9 - 3 - 1; 6 = 9 - 3; 7 = 9 + 1 - 3; 8 = 9 - 1; 9 = 9; 10 = 9 + 1; 11 = 9 + 3 - 1; 12 = 9 + 3; 13 = 9 + 3 + 1.

29. Ако дате тачке обележимо са A, B, C, D, E и F , онда су тражени троуглови: $ABD, ABE, ABF, ACD, ACE, ACF, ADE, ADF, AEF, BCD, BCE, BCF, BDE, BDF, BEF, CDE, CDF, CEF$ (слика). Има их укупно 18.



Сл. уз задатак 23

5	1	6	5	1	6	5	1
5	6	1	5	6	1	5	6
5	2	3	5	2	3	5	2
5	3	2	5	3	2	5	3

Сл. уз задатак 30

$\begin{matrix} A & B & C \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ D & E & F \end{matrix}$

Сл. уз задатак 29

30. Има укупно 4 решења (слика).

31. Како је $NZD(6, 9, 12, 15) = 3$, то највећа могућа коцка има ивицу 3 см, па коцка садржи $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ таквих мањих коцки, а квадар $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$ мањих коцки. Како је то укупно 68 мањих коцки то се од њих не може направити нова коцка (могло би ако би их било $64 = 4 \cdot 4 \cdot 4$ или $125 = 5 \cdot 5 \cdot 5$).

32. Нека је резултат свих наведених операција број $2k$. Тада је први број $2k - 2$, други $2k + 2$, трећи $2k : 2 = k$ и четврти $2k \cdot 2 = 4k$. Њихов збир је $2k - 2 + 2k + 2 + k + 4k = 9k = 1998$. Дакле $k = 1998 : 9 = 222$. Према томе, први број је 442, други 446, трећи 222, а четврти 888.

33. Производ 24 је могућ у комбинацијама: $1 \cdot 3 \cdot 8, 1 \cdot 4 \cdot 6, 2 \cdot 2 \cdot 6, 2 \cdot 3 \cdot 4$. Тражени бројеви су 164, 416, 324, 432, јер су само њихови двоцифрени завршети дељиви са 4.


34. Мајка је 25 година старија од Раше. Према томе 1992. године Раша је имао x година, а његова мајка $6x$. Дакле, $6x - x = 5x = 25$, па је $x = 5$. То значи да је 1992. године Раша имао 5 година, а његова мајка 30 година. Сада Раша има 11 година, а његова мајка 36 година.

35. Правоугаоника од 12 поља има три врсте: $1 \cdot 12$, $2 \cdot 6$ и $3 \cdot 4$. Како први правоугаоник не постоји на табли 8×8 , то остају само друга два. Правоугаоника $2 \cdot 6$ има $7 \cdot 3 \cdot 2 = 42$, а правоугаоника $3 \cdot 4$ има $6 \cdot 5 \cdot 2 = 60$, па је укупан број тражених правоугаоника 102.


36. Нека је у понедељак било $3x$ гледалаца. У уторак је било за $1/3$ више, дакле $4x$ гледалаца. У среду је опет било $3x$ гледалаца, што значи да их је било за $1/4$ мање него у уторак.

37. Најмањи такав број био би број облика $\overline{1abc}$. Тада је $a + b + c$ једнако 8, или 17 или 26, $a \cdot b \cdot c = 180 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 4 \cdot 5 \cdot 9 = 6 \cdot 6 \cdot 5$. Дакле најмањи такав број је 1566, јер 1459 не долази у обзир пошто није делив са 9.

38. Нека је T тежиште троугла ABC (слика). Из троугла ATC_1 је $\frac{2}{3}t_a + \frac{1}{3}t_c > \frac{c}{2}$. Слично се из троуглова BTA_1 и CTA_1 добија да је $\frac{2}{3}t_b + \frac{1}{3}t_a > \frac{a}{2}$ и $\frac{2}{3}t_c + \frac{1}{3}t_b > \frac{b}{2}$. Сабирањем добијених неједнакости добија се тражена неједнакост.



Сл. уз задатак 38



Сл. уз задатак 39

39. Нека се симетрала угла γ и симетрала странице AB секу у тачки M и нека симетрала странице AB сече страницу BC у тачки K (слика). Како је $\angle ACM = \angle KCM = \angle CMK = \frac{\gamma}{2}$, то је права KM паралелна са AC (паралелни краци). Како је права KM нормална на AB , то је и права CA нормална на AB , па је троугао ABC правоугли.


40. Све ученике поделимо у 7 категорија: прву чине они који су поклонили једну књигу; другу они који су поклонили две књиге; ... седму чине они који су поклонили 7 књига (у осмој категорији је само Дуле, јер је он поклонио највише књига). Како имамо 29 ученика (Дула не рачунамо) расопређених у 7 категорија, то на основу Дирихлеовог принципа $29 : 7 = 4(1)$ постоји категорија у којој има бар 5 ученика.

41. Ако је $x = 19,9819981998\dots$ онда је $10000x = 199819,9819981998\dots$, па је $10000x - x = 9999x = 199800$. Значи $x = \frac{199800}{9999} = 19\frac{1091}{1111}$.


42. Нека је $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} = \overline{xxx} = 111x$ ($1 \leq x \leq 9$). Дакле $n(n+1) = 222x = 2 \cdot 3 \cdot 37 \cdot x$. Како је лева страна производ два узастопна природна броја и како је 37 прост број то $2 \cdot 3 \cdot x$ мора бити 36 или 38. Како 38 није деливо са 3, у обзир долази само 36, па је $x = 6$, а $n = 36$.

43. Нека је $DE = x$ (слика). Тада је $CE = 30 - x$. Из услова задатка $P_{ABCE} = \frac{30+30-x}{2} \cdot h = 2P_{\triangle ADE} = 2 \cdot \frac{x}{2}h$, па је $2x = 60 - x$. Дакле $x = 20$ cm. Тада је очигледно $h = 10\sqrt{3}$ cm и $P = 300\sqrt{3}$ cm 2 .

44. Нека је $\angle BOT = 3x$ (слика). Тада је $\angle COT = 4x$, па је $\angle TBO = 90^\circ - 3x$ и $\angle TCO = 90^\circ - 4x$. Одавде следи да је $30^\circ + 180^\circ - 6x + 180^\circ - 8x = 180^\circ$. Дакле



Сл. уз задатак 43



Сл. уз задатак 44


$14x = 210^\circ$, па је $x = 15^\circ$, одакле добијамо да је $\angle ABC = 90^\circ$ и $\angle BCA = 60^\circ$. Како је $OT = 3\text{ cm}$, то је $OC = 6\text{ cm}$, а $TC = \sqrt{3}\text{ cm}$, па је $BC = 3 + \sqrt{3}\text{ cm}$.

45. I решење. Ако би сви ученици имали мање или једнако 10 динара, онда сви укупно не би имали више од 55 динара, јер је $1+2+\dots+10=55$. Дакле бар један ученик има 11 или више динара. Ако први ученик има 1 динар, други 2 динара, трећи 3 динара, онда седми има најмање 7, осми најмање 8, девети најмање 9, а десети најмање 11 динара (јер сви морају имати различите суме новца). Последња четири имају заједно најмање $11+9+8+7=35$ динара, према томе преосталих 6 ученика имају највише 65, дакле мање од 66 динара.


II решење. Ако 10 ученика има 100 динара, тада „свако“ од њих има просечно 10 динара. Зато шесторица „најсиромашнијих“ не могу имати више од 60 динара.

46. Решавањем дате једначине по x добија се да је $x = 2 + \frac{p}{3}$. Како x може бити само $-1, 0$ или 1 , то је $p = -9, p = -6$ или $p = -3$. Дакле, $p \in \{-9, -6, -3\}$.

47. Ако је $h_c = h_a + h_b$, онда је $\frac{2P}{c} = \frac{2P}{a} + \frac{2P}{b}$ или $\frac{1}{c} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$. Како најкраћој страници одговара највећа висина и како је највећа висина h_c , то је најмања страница c па је $\frac{1}{2} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ или $ab - 2a - 2b + 4 = (a-2)(b-2) = 4$. Једначина има три паре решења $(6, 3), (4, 4)$ и $(3, 6)$ од којих је само $a = b = 4\text{ cm}$ право решење. Код осталих не добијамо троугао, јер је збир две странице мањи од треће ($2+3 < 6$). Површина добијеног троугла је $\sqrt{15}\text{ cm}^2$.



Сл. уз задатак 48



Сл. уз задатак 49

48. Како је $\angle AMB = \angle AKB = 90^\circ$, то је C_1 центар кружнице која садржи тачке A, M, K и B (слика). Дакле, $MC_1 = KC_1$. Ако је $\angle ACB = 60^\circ$, онда је $\angle CAK = \angle CBM = 30^\circ$. Тада је $\angle MC_1K = 60^\circ$ (као централни угао над тетивом KM), па је троугао MKC_1 једнакостраничан.

49. Нека је мерни број ивице дате коцке a (слика). Тада је $AB = a$ и у троуглу ABC' страница $AC' = a\sqrt{3}$, а $BC' = a\sqrt{2}$. Како је троугао ABC' правоугли, његова површина

је $\frac{AB \cdot BC'}{2} = \frac{a^2\sqrt{2}}{2} = \frac{AC' \cdot BM}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot 7$. Одавде је $a = 7\sqrt{\frac{3}{2}}$ см. Површина коцке је $P = 6a^2 = 6 \cdot 49 \cdot \frac{3}{2} = 441\text{ cm}^2$.


50. Запремина коцке је $14 \cdot 14 \cdot 14 = 2744\text{ m}^3$ и коцка се може изделити на 2744 коцке странице 1 м, чије су стране паралелне странама коцке сира. Како у коцки сира има 1998 мишева, онда на основу Дирихлеовог принципа постоји бар једна коцка странице 1 м унутар које се не налази ниједан миш.

51. Ако првобитни број означимо са $10x$, тада је новодобијени број x . Дакле, $10x - x = 9x = 1998$, па је $x = 1998 : 9 = 222$. Тражени број је $10x = 2220$.


52. Ако Јарко има x динара, Лека има три пута више дакле $3x$. Када потроше по 10 динара, Јарко ће имати $x - 10$, а Лека $3x - 10$. Из услова задатка је $3x - 10 = 4(x - 10) = 4x - 40$. Решавањем претходне једначине добија се $x = 30$, па је Јарко имао 30, а Лека 90 динара.

53. Ради се о сабирању $ABBA + CDC = 1998$. Како је $A = 1$, добијамо $1BB1 + CDC = 1998$, па је $C = 7$. Онда је $1BB1 + 7D7 = 1998$, одакле је очигледно $B = 2$ и $D = 7$. Дакле $1221 + 777 = 1998$.


54. Нека је страница датог квадрата a (слика). Када се једна страница квадрата повећа за 3 см, а друга за 6 см, онда се површина повећа за $3 \cdot a + 6 \cdot a + 3 \cdot 6 = 1998$, па је $9a + 18 = 1998$. Одавде је $9a = 1980$, тј. $a = 1980 : 9 = 220$ см.



Сл. уз задатак 54



Сл. уз задатак 58



Сл. уз задатак 63

55. Ако су учествовала 4 такмичара (два оца и два сина) онда је одиграно 6 партија. У случају да је било 3 такмичара (деда, отац и син) одигране су 3 партије.

56. За један дан Душко заврши $1/12$, Ташко $1/15$, а Рашко $1/20$ посла, а сви заједно $\frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \frac{1}{20} = \frac{1}{5}$ посла. За 4 дана, завршиће $4/5$ посла, а преосталу $1/5$ Ташко ће завршити за $\frac{1}{5} : \frac{1}{15} = \frac{1}{5} \cdot \frac{15}{1} = 3$ дана. Дакле Ташко је радио укупно $4 + 3 = 7$ дана.

57. Како је $1998 = 27 \cdot 2 \cdot 37$, то су могући следећи случајеви: $\frac{a}{27} + \frac{b}{74} = \frac{145}{1998}$, $\frac{a}{37} + \frac{b}{54} = \frac{145}{1998}$ и $\frac{a}{74} + \frac{b}{54} = \frac{145}{1998}$. Тада је $74a + 27b = 145$, $54a + 37b = 145$, $27a + 37b = 145$. Прва једначина нема решење. Решење друге једначине је $a = 2$, $b = 1$, а тражени разломци су $\frac{2}{37}$ и $\frac{1}{54}$. Решење треће једначине је $a = 4$, $b = 1$, а тражени разломци су поново $\frac{4}{74} = \frac{2}{37}$ и $\frac{1}{54}$.

58. Све тачке које су једнако удаљене од темена A и B припадају симетрали дужи AB (слика). Све тачке које су од темена C удаљене 3 см припадају кругу са центром у тачки C полу пречника 3 см. Постоје две такве тачке M_1 и M_2 .

59. Како је збир цифара броја ЈОВАН једнак 10 и како су све цифре J, O, B, A и N различите једина могућност је $0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$. Тражени збир је тада очигледно 44444 па је ЈОВАН $\in \{10243, 14203, 30241, 34201\}$.

60. Обележимо златнике словима a, b, c, d, e, f, g, h . На један тас ставимо златнике a, b и c , а на други тас d, e и f . Разликујемо три случаја:

(1) Ако је $a + b + c > d + e + f$, неисправан златник је d, e или f . У другом мерењу упоређујемо d и e : ако је $d \neq e$, неисправан је лакши златник, а ако је $d = e$, неисправан је златник f .

(2) Ако је $a + b + c = d + e + f$, неисправан је лакши од два преостала златника.


(3) Ако је $a + b + c < d + e + f$, као у случају (1), једним мерењем проналазимо лакши златник међу златницима a, b, c .

61. Очигледно је $\frac{3}{4}$ прве цистерне једнако са $\frac{4}{5}$ друге и $\frac{4}{7}$ треће цистерне, тј. $\frac{12}{16}$ прве, једнако је са $\frac{12}{15}$ друге, односно $\frac{12}{21}$ треће цистерне. Дакле, количине млека у цистернама се односе као $16 : 15 : 21$, па је $16k + 15k + 21k = 52k = 780$. Одавде је $k = 15$, што значи да је у првој цистерни било 240, у другој 225, а у трећој 315 литара млека.

62. Како је $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = (-2) \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$ једина могућа комбинација пет различитих целих бројева чији је производ 12, то је $(4 - a) + (4 - b) + (4 - c) + (4 - d) + (4 - e) = (-2) + (-1) + 1 + 2 + 3 = 3$, односно $20 - (a+b+c+d+e) = 3$, па је $a+b+c+d+e = 20 - 3 = 17$.

63. Нека је тачка O пресек дијагонала AC и BD паралелограма $ABCD$ (слика). Тада је $AO = CO$. У троуглу ACD праве AM и DO су тежишне дужи. Значи да је тачка N тежиште. Тада је и дуж CP тежишна дуж (јер садржи тежиште), а то значи да дуж CP дели наспрамну страницу AD на два једнака дела, односно $AP = PD$.

64. Задатак има 3 решења. Тачка M је централно симетрична слика једне од тачака A, B, C , у односу на средиште дужи одређене са преостале две тачке (слика). Треба разликовати случајеве када тачке A, B и C припадају једној правој и када то није случај.




Сл. уз задатак 64

65. Израз $(12 \frac{1}{2} \cdot 2 + 0.2 \cdot 25) : 5 - 5 \cdot (1 \frac{8}{15} : \frac{2}{3} - 1 \cdot 1)$ има вредност $(25 + 5) : 5 - 5 \cdot (\frac{23}{15} \cdot \frac{3}{2} - \frac{11}{10}) = 6 - 6 = 0$.


66. Како је $n^3 + 1997n + 1998 = n^3 - n + 1998n + 1998 = n(n^2 - 1) + 1998(n + 1) = (n - 1)n(n + 1) + 6 \cdot 333(n + 1)$, то је дати број делив са 6 јер је $(n - 1)n(n + 1)$ производ три узастопна природна броја.

67. Нека је тачка O пресек дијагонала ромба (слика). Површина датог ромба је $P = 4 \cdot (AO \cdot BO) : 2 = 2 \cdot AO \cdot BO$. Из правоуглог троугла AOB следи да је $AB^2 = AO^2 + BO^2 = 81$. Како је $AC + BD = 24$ cm то је $AO + BO = 12$ cm и $(AO + BO)^2 = AO^2 + 2 \cdot AO \cdot BO + BO^2 = AO^2 + BO^2 + P = 12^2 = 144$. Одавде је $P = 144 - 81 = 63$ cm².

68. Нека је број страница датог конвексног многоугла једнак је n . Тада је $\frac{2n(2n-3)}{2} - \frac{n(n-3)}{2} = 1998$. Из добијене једнакости следи $4n^2 - 6n - n^2 + 3n = 3n^2 - 3n = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37$ или $3n(n-1) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37$. Дељењем са 3 добијамо $n(n-1) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37 = 37 \cdot 36$. Одавде је $n = 37$, а $2n = 74$. Збир унутрашњих углова првог многоугла је $35 \cdot 180^\circ$, а другог је $72 \cdot 180^\circ$, па је тражена повећање $37 \cdot 180^\circ = 6660^\circ$.



Сл. уз задатак 67



Сл. уз задатак 69

69. Како су тачке M и N редом средишта страница AB и BC троугла ABC , то је MN средња линија троугла, па је MN , а и MP паралелно са AC (слика). Тада је $\angle MAP = \angle CAP = \angle MPA = \frac{\alpha}{2}$ (као углови са паралелним крацима). Дакле, троугао AMP је једнакокрак и $AM = MP$. Како је $AM = MB = MP$, то је и троугао MBP једнакокрак. Како је $\angle BMP = \alpha$, то је $\angle MBP = \angle MPB = 90^\circ - \alpha/2$. Тада је $\angle APB = \alpha/2 + 90^\circ - \alpha/2 = 90^\circ$.

70. Цифре A, A, B и C се могу распоредити на 12 начина: $AABC, AACB, ABAC, ABCA, ACAB, ACBA, BAAC, BACA, BCAA, CAA, CAB, CBA$. У конкретном случају постоје три могуће комбинације цифара A, A, B, C : 1, 1, 8, 9; 8, 8, 1, 9 и 9, 9, 1, 8. Дакле, укупан број таквих четвороцифрених бројева је $12 \cdot 3 = 36$.

71. Значи да треба одредити све парове природних бројева (x, y) који задовољавају дату једначину, јер су у првом квадранту обе координате позитивне. Како је $4x + 7y = 1998$, то је $4x = 1996 - 8y + y + 2$. Дакле, $x = 499 - 2y + \frac{y+2}{4}$. Број x је цео само, ако је $y+2$ дељиво са 4, тј. ако је $y = 4k - 2$. Тада је $x = 499 - 8x + 4 + k = 503 - 7k$. Решење једначине тада можемо приказати табличом на наредној страни.


Из таблице је јасно да тражених тачака (x, y) има тачно 71. Тражени број тачака се може добити и из неједнакости $0 < x = 503 - 7k$ или $0 < y = 4k - 2 < 285$, $k \in N$.

k	0	1	2	...	70	71	72
$x = 503 - 7k$	503	496	489	...	13	6	-1
$y = 4k - 2$	-2	2	6	...	278	282	286


72. Очигледно су златници само у непарним редовима па је укупан број златника $1 + 3 + 5 + \dots + 2k - 3 + 2k - 1 = 625$. Дакле, $2k \cdot k : 2 = k^2 = 625$, па је $k = 25$. Значи да је последњи ред са златницима био $2 \cdot 25 - 1 = 49$ -ти. Према томе, сребрњаци се завршавају или са 48-им или са 50-им редом. У првом случају сребрњака има $2 + 4 + 6 + \dots + 48 = 50 \cdot 12 = 600$, а у другом случају $600 + 50 = 650$.

73. Ако је $AB = x$, онда је $AD = 10 - x$ (слика). Троугао ABD је правоугли, па је $P_{\triangle ABD} = \frac{AB \cdot AD}{2} = \frac{x \cdot (10-x)}{2} = 5x - \frac{x^2}{2}$. Троугао BCD је једнакокрако-правоугли, па је $P_{\triangle BCD} = \frac{BC \cdot CD}{2} = \frac{BC^2}{2} = \frac{BD^2}{4}$. Користећи Питагорину теорему, добија се


$BD^2 = AB^2 + AD^2 = x^2 + (10 - x)^2 = 2x^2 - 20x + 100$, па је $P_{\triangle BCD} = \frac{x^2}{2} - 5x + 25$. Површина четвороугла $ABCD$ је збир површина троуглова ABD и BCD тј. $P = 5x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} - 5x + 25 = 25 \text{ cm}^2$.



Сл. уз задатак 73



Сл. уз задатак 74



Сл. уз задатак 75

74. Троуглови AMF и EMD су слични јер су им сви углови једнаки (слика). Из сличности следи да је $AM : ME = 6a : 2a = 3 : 1$. Из сличности троуглова FBN и CEN добијамо $BN : NE = 3 : 1$. Како је $AM : ME = BN : NE = 3 : 1$, то је $AB \parallel MN$. Тада су слични и троуглови ABE и EMN (сви углови су им једнаки). Из сличности уочених троуглова је $AB : MN = AE : ME = (AM + ME) : ME = 4 : 1$. Из ове релације је $MN = 12a : 4 = 3a$.

75. Нека је $AS = a$, $BS = b$ и $CS = c$ (слика). Тада је запремина дате пирамиде $V = \frac{ab}{2} \cdot \frac{c}{3} = \frac{abc}{6}$. Како је $P_{\triangle ABS} = \frac{ab}{2} = 54$, $P_{\triangle BCS} = \frac{bc}{2} = 96$ и $P_{\triangle CAS} = \frac{ac}{2} = 72$, то се множењем ових трију релација добија $a^2 b^2 c^2 : 8 = 54 \cdot 96 \cdot 72$ или $a^2 b^2 c^2 = 8 \cdot 9 \cdot 6 \cdot 16 \cdot 8 \cdot 9$. Дакле, $abc = 8 \cdot 9 \cdot 6 \cdot 4$, и $ab = 108 = 2 \cdot 9 \cdot 6$, па је $c = 16 \text{ cm}$. Слично је $a = 8 \cdot 9 \cdot 6 \cdot 4 : (2 \cdot 6 \cdot 16) = 9 \text{ cm}$ и $b = 12 \text{ cm}$. Користећи Питагорину теорему добија се да је $AB = 15 \text{ cm}$, $BC = 20 \text{ cm}$ и $CA = \sqrt{337} \text{ cm}$.

76. Очигледно је број јабука које има Гоца дељив са 3, а број јабука које има Нина дељива са 2. С друге стране, тај број је када се јабуке саставе дељив са 5. То значи да су Гоца и Нина имале по $30k$ јабука. Ако продају појединачно, Гоца ће зарадити $10k$ динара, а Нина $15k$ динара, што укупно износи $25k$ динара. Ако продају заједно, онда ће зарада бити $(60k : 5) \cdot 2 = 24k$ динара. Како је $25k = 24k + 4$, то је $k = 4$, па су и Гоца и Нина имале по 120 јабука.


Задатак се може решити и једначином: ако су Гоца и Нина имале по x јабука, онда је $\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = \frac{2x}{5} \cdot 2 + 4$, одакле је $x = 120$.

77. Ако Пеђа стазу претрчи за 24 минута, онда он за 9 минута претрчи $\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$ стазе.


Дакле, за то исто време Дејан претрчи $\frac{5}{8}$ стазе. Ако трче у истом смеру, то значи да сваких 9 минута Дејан побегне Пеђи за $\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{4}$ дужине стазе. То значи да ће му цео круг побећи за $4 \cdot 9 = 36$ минута. За 36 минута Пеђа претрчи један и по круг, а Дејан два и по круга. То значи да ће се у почетној тачки наћи поново после 72 минута, када Пеђа претрчи 3, а Дејан 5 кругова.

78. Нека је тачка E средиште дужи KM , а $\angle KCB = \varphi$ (слика). Како је троугао AMK правоугли, то је $KE = ME = AE = AC$. Дакле, троугао ACE је једнакокрак ($AE = AC$). Како је $\angle KCB = \varphi$, то је и $\angle AKC = \varphi$ (као углови са паралелним крацима). Тада је у једнакокраком троуглу AEK и $\angle EAK = \varphi$. Тада је $\angle AEC =$

2φ (као спољашњи несуседни угао за троугао AEK), па је и $\angle ACE = 2\varphi$. Коначно, $\angle ACB = \angle ACE + \angle KCB = 2\varphi + \varphi = 3\varphi = 3\angle KCB$.



Сл. уз задатак 78



Сл. уз задатак 79

79. I решење. Тачка M припада симетралам спољашњег угла код темена A па је M једнако удаљена од правих AB и AD , тј. $MM_1 = MM_2$ (слика). Међутим, тачка M припада и симетралам спољашњег угла код темена D , па је једнако удаљена од правих AD и CD , тј. $MM_2 = MM_3$. Одавде следи да је $MM_1 = MM_3$, тј тачка M је једнако удаљена од правих AB и CD , што значи да припада правој која саржи средњу линију датог трапеза. На сличан начин се доказује да и тачка N припада правој која садржи средњу линију трапеза.

Нека права MN сече краке AD и BC датог трапеза у тачкама P и Q . Троуглови ADM и BCN су правоугли (доказати), а тачке P и Q су средишта хипотенуза, па је $AD = 2MP$ и $BC = 2NQ$. Како је $AB + CD = 2PQ$, то је обим датог трапеза $O = AD + AB + CD + BC = 2MP + 2PQ + 2QN = 2(MP + PQ + QN) = 2 \cdot MN = 1998$ см.

II решење. Слично можемо дефинисати тачке N_1 , N_2 и N_3 . Тада је $2MN = M_1N_1 + M_3N_3 = M_1A + AB + BN_1 + M_3D + DC + CN_3 = AM_2 + AB + BN_2 + M_2D + DC + CN_2 = AB + CD + AD + BC$.

80. Нека је Миле продао x килограма пасуља. Укупан приход је $8x$. Трошкови су: порез, који износи $0.23 \cdot 8x = 1.84x$, затим набавка пасуља за 5 динара за који је плаћено $(x - 163) \cdot 5 = 5x - 815$ динара и набавка скупљег пасуља за који је плаћено $163 \cdot 10 = 1630$ динара. Дакле, $8x - 1.84x - (5x - 815) - 1630 = 1998$, одакле се добија $x = 2415$ kg.

81. Нека су дати бројеви $n - 2$, $n - 1$, n , $n + 1$ и $n + 2$. Збир њихових квадрата је $(n - 2)^2 + (n - 1)^2 + n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2 = 5n^2 + 2$. Број $5n^2$ се завршава цифрама 0 или 5 па се број $5n^2 + 2$ завршава цифрама 2 или 7. Како се квадрат ниједног природног броја не завршава цифрама 2 или 7, то збир квадрата пет узастопних природних бројева не може бити потпун квадрат.

82. Ради се о сабирању $1000 + 100a + 10b + c + 1000c + 100b + 10a + 1 = 1000b + 100b + 10d + d$. После сређивања добијамо једнакост $1001 + 110a + 110b + 1001c = 1100b + 11d$. Очигледно је и лева и десна страна једнакости дељива са 11, па је $91 + 10a + 10b + 91c = 100b + d$, тј., $90 + 10a + 90c + c + 1 = 90b + d$. Одавде је јасно да је $d = c + 1$, па се дељењем са 10 добија $9 + a + 9c = 9b$, одакле је, због дељивости са 9, a једнако 0 или 9.


Ако је $a = 0$, онда је $b = c + 1 = d$, што је немогуће, јер су бројеви b и d по услову задатка различити. Дакле, $a = 9$, па је $b = c + 2$. Како је $c \neq 0$, то добијамо следећа решења:

- (1) $c = 1, b = 3, d = 2, a = 9$; тј. $1931 + 1391 = 3322$;
- (2) $c = 2, b = 4, d = 3, a = 9$; тј. $1942 + 2491 = 4433$;
- (3) $c = 3, b = 5, d = 4, a = 9$; тј. $1953 + 3591 = 5544$;
- (4) $c = 4, b = 6, d = 5, a = 9$; тј. $1975 + 5791 = 7766$;
- (5) $c = 5, b = 7, d = 6, a = 9$; тј. $1975 + 5791 = 7766$;
- (6) $c = 6, b = 8, d = 7, a = 9$; тј. $1986 + 6891 = 8877$.


83. Површина $P = 6 \cdot P_{OABC} = 6 \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2} = 3(2+\sqrt{3}) \text{ cm}^2$ (слика). Применом Питагорине теореме на правоугли троугао ABM добијамо

$$\begin{aligned}(AB)^2 &= \left(\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{2+\sqrt{3}} - \frac{(\sqrt{2+\sqrt{3}})\sqrt{3}}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}\right)^2 (1 + (2-\sqrt{3})^2) = \frac{1}{4}(2+\sqrt{3})(1+4-4\sqrt{3}+3) = 1.\end{aligned}$$

Према томе, $AB = 1 \text{ cm}$, а обим правилног дванаестоугла је $O = 12 \text{ cm}$.




Сл. уз задатак 83




Сл. уз задатак 84

84. Нека су O_1 и O_2 редом центри кружница k_1 и k_2 и нека је φ угао између тангенте CB и тетиве O_1B , тј. $\angle O_1BC = \varphi$ (слика). Тада је периферијски угао над тетивом O_1B једнак φ , а централни $\angle BO_2O_1 = 2\varphi$. Тада је $\angle AO_2B = 2 \cdot 2\varphi = 4\varphi$, па је периферијски угао над тетивом AB кружнице k_2 једнак 2φ . Угао између тетиве AB и тангенте BC је тада $\angle ABC = 2\varphi$. Тада је $\angle ABO_1 = \angle ABC - \angle O_1BC = 2\varphi - \varphi = \varphi$. Из подударности једнакокраких троуглова AO_1B и CO_1B следи да је $AB = BC$.

85. Дати трапез поделимо на четири подударна трапеза, а затим сваки од добијених трапеза поделимо опет на четири подударна трапеза (слика). Као имамо 17 тачака, а 16 трапеза, на основу Дирихлеовог принципа постоји трапез унутар кога се налазе бар две тачке датог скупа. Како је највеће растојање унутар једног од 16 добијених подударних трапеза, дијагонала трапеза која је једнака $\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \text{ cm}$, то увек постоје две тачке чије растојање није веће од $\sqrt{5} \text{ cm}$.



Сл. уз задатак 85



Сл. уз задатак 88


86. Како је $x^2+y^2 = 4x+4y-3$, то је $(x-2)^2+(y-2)^2 = 5$. Слично, из $y^2+z^2 = 4y+4z+5$ следи $(y-2)^2+(z-2)^2 = 13$, а из $z^2+x^2 = 4z+4x+2$ добијамо $(z-2)^2+(x-2)^2 = 10$. Нека је $(x-2)^2 = a$, $(y-2)^2 = b$ и $(z-2)^2 = c$. Тада је $a+b=5$, $b+c=13$ и $c+a=10$. Решење добијеног система је $a=1$, $b=4$ и $c=9$. Тада је $(x-2)^2=1$, $(y-2)^2=4$ и $(z-2)^2=9$. Зато је $x-2 \in \{1, -1\}$, $y-2 \in \{2, -2\}$, $z-2 \in \{3, -3\}$, односно $x \in \{3, 1\}$,

$y \in \{4, 0\}$, $z \in \{5, -1\}$. Постоји осам решења датог система: $(3, 4, 5)$, $(3, 4, -1)$, $(3, 0, 5)$, $(3, 0, -1)$, $(1, 4, 5)$, $(1, 4, -1)$, $(1, 0, 5)$, $(1, 0, -1)$.


87. Ако је k неки природан број, онда су остаци при дељењу броја k са 15 једнаки 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Тада су остаци при дељењу броја k^4 са 15 редом 0, 1, 1, 6, 1, 6, 1, 1, 6, 10, 1, 6, 1, 1. Дакле, појављују се само 4 различита остатака: 0, 1, 6 и 10. Како имамо 5 различитих природних бројева, а 4 остатака, онда на основу Дирихлеовог принципа, постоје два броја чији су остатаки једнаки, тј. постоје бројеви $m^4 = 15a + r$ и $n^4 = 15b + r$. Тада је $m^4 - n^4 = 15(a - b)$, што је очигледно дељиво са 15.

88. Дужа дијагонала призме је дефинисана релацијом $D^2 = (2a)^2 + H^2$ (слика). Како је $a + H = 10$, то је $D^2 = 4a^2 + (10 - a)^2 = 5(a - 2)^2 + 80$. Дужа дијагонала призме D је најмања и износи $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ см када је $a - 2 = 0$, тј. када је $a = 2$ см и $H = 8$ см. Површина добијене призме је $P = (96 + 12\sqrt{3}) = 12(8 + \sqrt{3})$ см², а запремина је $V = 48\sqrt{3}$ см³.

89. Нека је N подножје нормале из тачке D на дијагоналу AC (слика). Тада су троуглови OBM и ODN слични, јер је $\angle BOM = \angle DON$ (унакрсни углови) и $\angle DNO = \angle BMO = 90^\circ$. Из уочене сличности је $BM : BO = DN : DO = 2k$. Тада је $DN = 2k \cdot DO$, па је $P_{ABCD} = P_{ABC} + P_{ACD} = \frac{AC \cdot BM}{2} + \frac{AC \cdot DN}{2} = \frac{AC}{2}(2k \cdot BO + 2k \cdot DO) = k \cdot AC(BO + DO) = k \cdot AC \cdot BD$, што је и требало доказати.



Сл. уз задатак 89



Сл. уз задатак 90


90. Троуглови ABM и BCN су подударни ($AB = BC$, $BM = CN$ и $\angle ABM = \angle BCN = 90^\circ$) (слика). Из подударности је $\angle BAM = \angle CBN$, па пошто су краци BA и CB нормални, то су и краци AM и BN такође нормални, што значи да је угао $\angle APN = \angle APB = 90^\circ$. Како је и $\angle AOB$ прав, то тачке A , O , P и B припадају једној кружници чији је пречник AB . Тада је $\angle APO = \angle ABO$ (као периферијски углови над тетивом AO) и како је $\angle ABO = 45^\circ$, то је и $\angle APO = 45^\circ$. Дакле, $\angle NPO = \angle APN - \angle APO = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$, па је права BO симетрала угла $\angle APN$.

91. Из услова задатка да две јабуке теже као 3 крушке и да три јабуке теже као 4 поморанџе следи да 6 јабука тежи као 9 крушака и да 6 јабука теже као 8 поморанџи. Одавде следи да 9 крушака теже као 8 поморанџи. Из услова да 6 крушака кошта као 5 поморанџи, закључујемо да 18 крушака кошта као 15 поморанџи. Како 18 крушака тежи као 16 поморанџи, закључујемо да је килограм поморанџи скупљи од килограма крушака.


92. а) На основу услова задатка добијамо да су бројеви a , b и c редом једнаки: $a = \overline{ABCD}$; $b = \overline{ADDE}$ и $c = \overline{DBCA}$. Како је $\overline{ABCD} + \overline{ADDE} = \overline{DBCA}$, прво закључујемо да је $D = 9$. Даље је $A = 4$. Из $D + E = 10 + A$ следи да је $E = 5$, па је $b = 4995$.

б) Како B и C могу бити произвољни бројеви из скупа $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, то постоји 100 могућности за број a .

93. Претпоставимо супротно, тј. да је троугао PQR једнакостраничан (слика). Тада је у правоуглом троуглу $\angle BPD = 60^\circ$, па је $\frac{\beta}{2} = 30^\circ$. Даље, нека је тачка M средиште странице BC . Тада је у троуглу BMQ угао $\angle BQM = 60^\circ$, па је угао $\angle QMB = 90^\circ$, тј. AM је нормално на BC и троугао ABC је једнакокраки, са једним углом на основици једнаким 60° . Дакле, троугао ABC је једнакостраничан, што је супротно претпоставци задатка.



Сл. уз задатак 93



Сл. уз задатак 94

94. Нека је S средиште дијагонале AC (слика). Тада је MS средња линија троугла ABC , а NS средња линија троугла ACD , па је $BC = 2 \cdot MS$ и $AD = 2 \cdot NS$. Сабирањем добијених једнакости следи да је $AD + BC = 2MS + 2NS \geq 2MN$. Ако важи једнакост онда су тачке M , S и N колинеарне, па је $AD \parallel MN \parallel BC$, тј. дати четвороугао је трапез.

95. Најпре бројимо троуглове „једако усмерене“ као дати троугао.

Постоји $8 + 7 + \dots + 1 = 36$ троуглова странице 1 cm, $7 + 6 + \dots + 1 = 28$ троуглова странице 2 cm, $6 + 5 + \dots + 1 = 21$ троуглова странице 3 cm, $5 + 4 + \dots + 1 = 15$ троуглова странице 4 cm, $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ троуглова странице 5 cm, $3 + 2 + 1 = 6$ троуглова странице 6 cm, $2 + 1 = 3$ троугла странице 7 cm, 1 троугао странице 8 cm.

Потом бројимо троуглове „обрнуто усмерене“ у односу на дати троугао. Постоји $7 + 6 + \dots + 1 = 28$ троуглова странице 1 cm, $5 + 4 + \dots + 1 = 15$ троуглова странице 2 cm, $3 + 2 + 1 = 6$ троуглова странице 3 cm, 1 троугао странице 4 cm.

Дакле, укупан број троуглова је 170.


96. Из дате једнакости $\frac{1}{x+y+z} = 0,xyz$ следи $(100x+10y+z)(x+y+z) = 1000 = 2^3 \cdot 5^3$.

Како су x , y и z цифре, највећа могућа вредност $x+y+z$ је 27, а највећа могућа вредност за $100x+10y+z$ је 999. Могући су следећи случајеви $500 \cdot 2$; $250 \cdot 4$; $200 \cdot 5$; $125 \cdot 8$; $100 \cdot 10$; $50 \cdot 20$ и $40 \cdot 25$. Испитивањем закључујемо да само пар $x+y+z = 8$, $100x+10y+z = 125$, испуњава поменуте услове, па је једино решење дате једначине $x = 1$, $y = 2$ и $z = 5$, а тражени број је 0,125.


97. Из услова да је $a^2 + 9ab + b^2$ дељиво са 11 закључујемо да је и $a^2 - 2ab + b^2 + 11ab$ дељиво са 11, па је $(a-b)^2$ дељиво са 11. Како је 11 прост број, то је $a-b$ дељиво са 11, те је израз $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, такође дељив са 11.

98. Нека су BD и AE висине датог троугла ABC (слика). У правоуглом троуглу ABD је угао $BAD = 30^\circ$, па је $BD = \frac{b}{2}$. Нека је $CE = x$. Тада је основица $BC = 2x$, а из израза за површину троугла ABC добијамо једнакост: $AB \cdot BD = BC \cdot AE$, односно $\frac{b^2}{2} = 4x$, јер је $AE = 2$. Одавде је $b^2 = 8x$. Из правоуглог троугла ABE је $b^2 = 4+x^2$, па је $8x = 4+x^2$, а одавде следи $x^2 - 8x + 16 = 12$, тј. $(x-4)^2 = 3 \cdot 4$. Дакле, $x-4 = -2\sqrt{3}$, па је $x = 4 - 2\sqrt{3}$. Сада из $b^2 = 8x$ добијамо: $b^2 = 8(4 - 2\sqrt{3}) = 4 \cdot 2(\sqrt{3} - 1)^2$. Одавде

је $b = 2\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{2}(2\sqrt{3} - 2)$, па је $m = 2$, $n = 1$ и $p = -1$ или $m = 1$, $n = 2$ и $p = -2$.



Сл. уз задатак 98



Сл. уз задатак 99

99. Уочимо тачку E на продужетку основице AB преко темена B , тако да је $BE = CD$ (слика). Нека је M средиште дужи AE . Тада је, због нормалности дијагонала, троугао ACE правоугли. Како је $AE = AB + BE = AB + CD$, то је $MC = m$. Како је MC хипотенуза правоуглог троугла MCC' , а $CC' = h$ катета, то је $m \geq h$. Једнакост важи када је $MC = CC'$, тј. $AC = CE$, а то значи, када да је дати трапез једнакокраки.

100. Нека на олимпијади има n учесника. Пошто сваки учесник има 3 пријатеља значи има $3n$ парова пријатеља. Ако узмемо да је пријатељ учесника A учесник B , онда је један од пријатеља учесника B сигурно учесник A . Дакле, сваки пар се појављује два пута, те је број различитих парова пријатеља $\frac{3n}{2}$. Како 1999 није делив са 2, то је одговор на постављено питање негативан.


101. Напишемо број n у облику $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$. Тада је број делилаца броја n једнак $(k_1+1)(k_2+1)\cdots(k_m+1)$. Како је $1998 = 2^1 \cdot 3^3 \cdot 37^1$, то 1998 има $2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$ делилаца. Како је $16 = 8 \cdot 2 = 4 \cdot 4 = 4 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, бројеви са 16 делилаца морају бити неког од следећих облика: p^{15} ; $p^7 q^1$; $p^3 q^3$; $p^3 q^1 r^1$; $p^1 q^1 r^1 s^1$. Најмањи бројеви тих облика су $2^{15} = 32768$; $2^7 \cdot 3 = 384$; $2^3 \cdot 3^3 = 216$; $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$ и $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$. Према томе, најмањи природан број са тачно 16 делилаца је 120.

102. I решење. Ако је трећи исказ тачан тј. ако је $n+k = 3m$, онда други исказ није тачан јер би из $n = 2k+5$ следило да је $n-2k = n+k-3k = 5$, или $3m-3k = 3(m-k) = 5$, што је немогуће. Такође, ако је трећи исказ тачан, онда ни четврти није тачан, јер је $n+7k = n+k+6k = 3m+6k$, а то је увек сложен број. Према томе, трећи исказ мора бити нетачан, а остала три су тачна. То значи да је $n+1 = ak$ и $n = 2k+5$, па је $2k+6 = ak$. Одавде следи да је $k \cdot (a-2) = 6$, па је $k \in \{1, 2, 3, 6\}$. Тада је $n \in \{7, 9, 11, 17\}$ и $(n+7k) \in \{14, 23, 32, 59\}$. Према томе, једина решења су $(n, k) = (9, 2)$ или $(17, 6)$.


II решење. Постоје четири могућности.

Ако су искази 1), 2) и 3) тачни, а исказ 4) нетачан, онда из $n = 2k+5$, следи да је $n+k = 3k+5$, па исказ 2) искључује исказ 3). Слично је и у случају да су искази 2), 3) и 4) тачни, а исказ 1) нетачан. Ако су искази 1), 3) и 4) тачни, а исказ 2) је нетачан, онда је $n+k = 3m$, па је $n+7k = 3m+6k$, а то не може бити прост број, па и ова комбинација отпада. Дакле, једина преостала комбинација је 1), 2) и 4) су тачни искази, а 3) је нетачан.

103. a) Правоугли троуглови SKL и SML су подударни, па је $SK = SM$ (слика). Због тога је $SK : SB = SM : SD$, па је према обратној Талесовој теореми KM паралелно са BD .



Сл. уз задатак 103




Сл. уз задатак 104


б) Троуглови AON и SOC су слични, па је $AO : ON = SO : OC$, односно $6 : ON = 8 : 6$. Одавде је $ON = 4,5$ см, па је $SN = 3,5$ см. Из а) следи $MK : BD = SN : SO$, одакле је $MK = 5,25$ см. Из површине једнакокраког троугла SAC , добијамо једнакост $AC \cdot SO = AL \cdot SC$, тј. $12 \cdot 8 = AL \cdot 10$, па је $AL = 9,6$ см. Лако се доказује да је $AK = AM$, што значи да је пресек $AKLM$ делтоид, па је тражена површина $P = KM \cdot AL : 2 = 25,2$ см².

104. Нека је R средиште дужи AD (слика). Тачке P, S, Q и R су средишта странница четвороугла $ABCD$, па је $PSQR$ паралелограм. Дијагонале PQ и RS секу се у тачки M , што значи да је MN средња линија троугла RST , па је $MN = \frac{1}{2}TR$. Дуж TR је средња линија троугла ADE , па је $TR = \frac{1}{2}AE$. Дакле, $MN = \frac{1}{4}AE = 1$ см.

105. Нека је дати квадрат јединични (слика). Нека су дужине већих странница правоугаоника редом a, b, c и d при чиму је a већа или једнака од осталих. Тада је $a \geq b$ и $1-d \geq 1-a$. Како су површине правоугаоника једнаке, то је $a(1-d) = b(1-a)$, па (због претходног услова) следи да је $a = b$ и $1-d = 1-a$ тј. $a = d$. Дакле, $a = b = d$. Слично се доказује да је $b = c$, па је $a = b = c = d$. Због тога је унутрашњи правоугаоник квадрат.



Сл. уз задатак 105



Сл. уз задатак 107

106. Нека је разбојник изнео x килограма злата и y килограма дијаманата. Бројеви x и y задовољавају следеће релације:

(1) $x + y \leq 100$, јер разбојник не може понети више од 100 kg;

(2) $\frac{x}{200} + \frac{y}{40} = 1$, јер 1 kg злата заузима $\frac{1}{200}$ део сандука, а 1 kg дијаманата заузима $\frac{1}{40}$ део сандука;

(3) $x \leq 100$, $y \leq 40$.

Из релације (2) следи да је $x + 5y = 200$. Како је $x + y \leq 100$, то је $200 = x + y + 4y \leq 100 + 4y$. Дакле, $4y \geq 100$, а $y \geq 25$. Нека је $y = 25 + k$ ($0 \leq k \leq 15$). Тада је $x + 5y = x + 5(25 + k) = 200$, тј. $x + 125 + 5k = 200$, или $x = 75 - 5k$. Вредност блага је $f(x, y) = 20x + 60y$ (јер 1 kg злата вреди 20, а 1 kg дијаманата 60 дуката), па је

$f(x, y) = 20(75 - 5k) + 60(25 + k) = 1500 - 100k + 1500 + 60k = 3000 - 40k \leq 3000$, јер је k позитиван број или 0.

Дакле, максимална вредност блага је 3000 дуката и добијамо је за $k = 0$, па је $x = 75$ kg, а $y = 25$ kg.

107. Како је $AM = ME$ то је $AE \perp FM$ и $\angle AMF = 90^\circ = \angle ADF$, па је четвороугао $AMFD$ тетивни (слика).

Даље, како је $\angle AFM = 30^\circ = \angle ADM$, то је $\angle MDC = 60^\circ$. Четвороугао $MECF$ је тетивни, јер је $\angle EMF = \angle FCE = 90^\circ$. Како је $\angle MFE = 30^\circ = \angle MCE$, то је $\angle MCD = 60^\circ$, па је троугао CDM једнакостраничан.

108. I решење. Из услова задатка и

$$\frac{\sqrt{1998} + \sqrt{n}}{\sqrt{1998} - \sqrt{n}} = \frac{(\sqrt{1998} + \sqrt{n})^2}{1998 - n} = \frac{1998 + n + 2\sqrt{1998 \cdot n}}{1998 - n}$$

следи да мора бити $1998 \cdot n = k^2$, тј. $2 \cdot 3^3 \cdot 37 \cdot n = k^2$. Најмањи такав природан број n је $n_{min} = 2 \cdot 3 \cdot 37 = 222$. Тада је вредност израза једнака 2.

II решење. Како је $\frac{\sqrt{1998} + \sqrt{n}}{\sqrt{1998} - \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{\frac{1998}{n}} + 1}{\sqrt{\frac{1998}{n}} - 1} = \frac{k+1}{k-1} = 1 + \frac{2}{k-1}$, то је вредност датог израза природан број уколико је $k-1 \in \{1, 2\}$, тј. $k=2$ или $k=3$. Како се за $k=2$ добија да n није природан број, то је једина могућност $k=3$ и $n=222$.

III решење. Нека је $\frac{\sqrt{1998} + \sqrt{n}}{\sqrt{1998} - \sqrt{n}} = k \in N$. Тада је $\sqrt{1998} + \sqrt{n} = k\sqrt{1998} - k\sqrt{n}$, одакле се добија да је $(k-1)\sqrt{1998} = (k+1)\sqrt{n}$, тј. $3(k-1)\sqrt{222} = (k+1)\sqrt{n}$. Одавде, из $\frac{3(k-1)}{k+1} = \sqrt{\frac{n}{222}}$ следи да је $n=222$.

109. Како је


$$\begin{aligned} \underbrace{11 \dots 111}_{1997} \underbrace{22 \dots 222}_{} 5 &= \underbrace{11 \dots 111}_{1997} \cdot 10^{1999} + \underbrace{22 \dots 222}_{1998} \cdot 10 + 5 \\ &= \frac{10^{1997} - 1}{9} \cdot 10^{1999} + 2 \cdot \frac{10^{1998} - 1}{9} \cdot 10 + 5 \\ &= \frac{1}{9} (10^{3996} - 10^{1999} + 2 \cdot 10^{1999} - 20 + 45) \\ &= \frac{1}{9} (10^{3996} + 2 \cdot 5 \cdot 10^{1998} + 25) \\ &= \frac{1}{9} (10^{1998} + 5)^2, \end{aligned}$$

то је

$$\underbrace{11 \dots 111}_{1997} \underbrace{22 \dots 222}_{1998} 5 = \left(\overbrace{1000 \dots 0}^{1997} 5 \right)^2 = \underbrace{(333 \dots 33)}_{1997} 5^2,$$

што је и требало доказати.

110. I решење. Посматрајмо дијагонале AC и AD датог конвексног петоугла $ABCDE$. Као је $AB = AE$ и $\angle ABC = \angle DEA = 90^\circ$, могуће је конструисати троугао чија је висина $AB = AE = 1$ и основица $BC + DE = 1$ (користећи троуглове ABC и AED) (слика). Тада је површина овог троугла једнака $\frac{1}{2}$. Конструисани троугао је подударан троуглу ACD , па је површина петоугла $ABCDE$ једнака 1.



Сл. уз задатак 110

II решење. Нека је AF висина троугла ADC . Уведимо ознаке: $FD = x$, $DE = y$. Тада је, из услова задатка, $BC = 1 - y$ и $CF = 1 - x$. Користећи Питагорину теорему добија се: $AC^2 = 1 + (1 - y)^2$, $AD^2 = 1 + y^2$ и $AF^2 = AC^2 - (1 - x)^2 = AD^2 - x^2$, одакле је $x = y$. Одавде следи да су троуглови AED и ADF подударни, па је $AF = 1$ и $P_{ABCDE} = P_{\triangle ACB} + P_{\triangle ADC} + P_{\triangle AED} = \frac{1 \cdot (1-x)}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot y}{2} = 1$.

111. Како су x и y природни бројеви, то је x^y природан број, па и y^{x-y} мора бити природан број. Одавде следи да је $x - y \geq 0$, тј. $x \geq y$.

Када је $x = y$, дата једначина се своди на једначину $x^x = x^0 = 1$, тј. $x = y = 1$.

У случају када је $y = 1$, очигледно је да мора бити $x = 1$.

Нека је $x > y \geq 2$. Тада је дата једначина еквивалентна једначини $\left(\frac{x}{y}\right)^y = y^{x-2y}$ (1).

Како је $\frac{x}{y} > 1$ и y природан број, то мора бити $x-2y > 0$, тј. $\frac{x}{y} > 2$. Одавде следи да и $\frac{x}{y}$

мора бити природан број. Једначина (1) се може записати у облику $\frac{x}{y} = y^{\frac{x-2y}{y}} = y^{\frac{x}{y}-2}$

(2). Како смо закључили да је $y \geq 2$, то из једначине (2) следи да је $\frac{x}{y} \geq 2^{\frac{x}{y}-2}$, па је

$\frac{x}{y} \leq 4$. Дакле, $\frac{x}{y} \in \{3, 4\}$. За $\frac{x}{y} = 3$, добија се $x = 9$ и $y = 3$, а за $\frac{x}{y} = 4$, добија се $x = 8$ и $y = 2$. Дакле, скуп решења дате једначине је: $\{(1, 1), (8, 2), (9, 3)\}$.

112. Претпоставимо да можемо написати 16 таквих бројева. Као има осам парних и осам непарних остатака при дељењу са 16, то је осам од тих бројева парно, а осам непарно. Одавде следи да цифре не могу бити све непарне нити све парне. Развматрајмо случај када су дате цифре две парне и једна непарна. (Случај са две непарне и једном парном је сличан.) Можемо написати тачно девет непарних троцифрених бројева са датим цифрама: $\overline{a_1 k}, \overline{a_2 k}, \dots, \overline{a_9 k}$, при чему су a_1, a_2, \dots, a_9 двоцифрени бројеви и k дата непарна цифра.

Међу бројевима a_1, a_2, \dots, a_9 три су непарна, тако да међу осам изабраних непарних троцифрених бројева бар пет бројева имају парни „почетак“ $\overline{a_i}$ (парну цифру десетица). Нека су a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 парни двоцифрени бројеви и нека су $\overline{a_1 k}, \overline{a_2 k}, \overline{a_3 k}, \overline{a_4 k}$ и $\overline{a_5 k}$ пет изабраних троцифрених бројева. Бројеви a_1, \dots, a_5 при дељењу са 8 могу имати остатке 0, 2, 4 или 6. Зато је разлика нека два од њих, рецимо $a_1 - a_2$, делива са 8, па 16 дели $a_1 k - a_2 k$, јер је $a_1 k - a_2 k = (a_1 - a_2) \cdot 10$.

Дакле, не можемо написати таквих 16 троцифрених бројева.

1999. година

113. $23456 - 19876 + 99999 - 100 = 103479$.

114. $29 + 25 + 22 = 76$.


115. Како је $1999 = 83 \cdot 24 + 7$, то ће кроз 1999 сати бити $17 + 7 = 24$ сата, то јест поноћ, па никако не може бити сунчано време.

116. Сваких 1000 страница има дебљину $(1000 : 200) \cdot 2 = 10 \text{ mm} = 1 \text{ cm}$. Књига од 1999 000 страница ће имати $1999 \cdot 1 = 1999 \text{ cm}$.


117. $435\,768 \text{ a} = 43\,576\,800 \text{ m}^2 > 43\,050\,000 \text{ m}^2 = 43 \text{ km}^2$ 5 ha.

118. $423 \cdot 54 = 22\,842$.


119. $18 - 6 - 4 = 8$ елемената (слика).



Сл. уз задатак 119



Сл. уз задатак 122



Сл. уз задатак 126

120. Углови $\alpha + \beta$ и $\alpha - \beta$ разликују се за 2β . Дакле 2β је $38^\circ 41' 24''$, а $\beta = 19^\circ 20' 42''$.

121. 102348 и 987651.

122. Означимо ивицу коцке са x (слика). Свака страна коцке повећала се за два правоугаоника страница x и 1 см и један квадрат странице 1 см. Такође, површина сваке стране коцке повећала се за $66 : 6 = 11 \text{ cm}^2$. Дакле, $2x + 1 = 11$, па је ивица коцке 5 см. Њена запремина повећала се за $6 \cdot 6 \cdot 6 - 5 \cdot 5 \cdot 5 = 216 - 125 = 91 \text{ cm}^3$.

123. Како је $xy > 0$ и $z < 0$, то је $xyz < 0$.

124. $80,25 \cdot 0,16 = 12,84 \text{ N}$.

125. $x = -1$ и $y = -19$, па је $x + y = -20$.

126. Ако је $\angle BAC = \alpha$, онда је $\angle BCD = 2\alpha$, а $\angle ADB = 90^\circ - \alpha$ (слика). Тада је $\angle ABD = 180^\circ - \alpha - (90^\circ - \alpha) = 90^\circ$, а то је и требало доказати.


127. Како је $AC > BC$, то је и $\angle ABC = \beta > \angle BAC = \alpha$ (слика). Даље је $\angle ADC = \beta + \frac{\gamma}{2}$, а $\angle BDC = \alpha + \frac{\gamma}{2}$, па је због $\beta > \alpha$ и $\angle ADC = \beta + \frac{\gamma}{2} > \angle BDC = \alpha + \frac{\gamma}{2}$.

128. Како је $5 + 2\sqrt{7} = \sqrt{25} + \sqrt{28}$, а $3\sqrt{3} + 2\sqrt{6} = \sqrt{27} + \sqrt{24}$ и како је $\sqrt{25} > \sqrt{24}$, а $\sqrt{28} > \sqrt{27}$, то је $5 + 2\sqrt{7} > 3\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$.


129. $16^5 + 2^{15} = (2^4)^5 + 2^{15} = 2^{20} + 2^{15} = 2^{15}(2^5 + 1) = 2^{15} \cdot 33$.

130. $13\,728 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 13 = 22 \cdot 26 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 22 \cdot 24 \cdot 26$.


131. $P = a^2$, а како је $a^2 + \frac{a^2}{4} = \frac{5a^2}{4} = r^2$, то је $a^2 = \frac{4r^2}{5}$, па је $P = \frac{4r^2}{5}$ (слика).



Сл. уз задатак 127





Сл. уз задатак 131



Сл. уз задатак 132

132. Површина троугла $A_1B_1C_1$ је седам пута већа од површине троугла ABC и износи 13993 cm^2 (слика). Заиста, тежишна дуж дели троугао на два троугла једнаких површина. Зато је $P_{\Delta A_1BB_1} = 2P_{\Delta A_1BC} = 2P_{\Delta ABC}$ и слично, $P_{\Delta B_1CC_1} = 2P_{\Delta C_1AA_1} = 2P_{\Delta ABC}$.

133. Тражено одстојање је 16 см. Заиста, ако су M' и M'' нормалне пројекције тачке M редом на страну диедра и на ивицу, тада је: $\angle MM'M'' = 90^\circ$, $\angle MM''M' = 60^\circ$ (слика).




Слика уз задатак 133


134. Ако је дужина пута x , онда је $\frac{4}{9}x + \frac{9}{20} \cdot \frac{5}{9}x + 330 = x$. Дакле, $16x + 9x + 330 \cdot 36 = 36x$, па је $11x = 330 \cdot 36$, а $x = 1080$ km.

135. Решења су $x_1 = 0,35$ или $x_2 = 0,15$.

136. Нека је основна ивица призме једнака x (слика). Како је $(x+3)^2 \cdot 10 = x^2 \cdot 10 + 210$, то је $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 21$, па је $x = 2$. Површина призме је 88 cm^2 , а запремина 40 cm^3 .



Сл. уз задатак 136



Сл. уз задатак 137

30	35	32
33	38	37
36	31	34

Сл. уз задатак 141

137. Дужа висина датог троугла одговара мањој страници, дакле основици и износи 12 cm (слика). Како је висина сличног троугла 24 cm, то је коефицијент сличности 2, па је основица другог троугла 20 cm, а површина $(20 \cdot 24) : 2 = 240 \text{ cm}^2$.

138. а) 203 567 и 876 532; б) 200 022 и 888 777.


139. Ако је у другом сандуку x јабука, у првом је $x + 1999$. После преношења, у првом сандуку ће бити $x + 1999 - 1000 = x + 999$, а у другом $x + 1000$ јабука. Дакле, једна јабука је више у другом сандуку.

140. I решење. Површина просторије је $12 \cdot 27 = 324 \text{ m}^2 = 324 \cdot 10000 \text{ cm}^2 = 3240000 \text{ cm}^2$. Површина једне плочице је $15 \cdot 15 = 225 \text{ cm}^2$. Према томе, потребно је $3240000 : 225 = 14400$ плочице.

II решење. Као што је $1200 \text{ cm} : 15 \text{ cm} = 80$ и $2700 \text{ cm} : 15 \text{ cm} = 180$, то је број потребних плочица $80 \cdot 180 = 14400$.

141. Једно од могућих решења дато је на слици.


142. Дужи има $(4 \cdot 6 + 4 \cdot 5 + 8) : 2 = 26$, а троуглова $8 + 4 + 2 + 4 = 18$ (слика).



Сл. уз задатак 142



Сл. уз задатак 143



Сл. уз задатак 144

143. Као што је $B \subset A$, то мора бити $x = 3$. Тада y може бити било који од бројева 1, 5 или 9 (слика).

144. Бројева који су мањи од 1000, а делљиви су са 4 има $1000 : 4 - 1 = 250 - 1 = 249$; делљивих са 6 има $996 : 6 = 166$, а делљивих са 4 и 6, тј. делљивих са 12 има $996 : 12 = 83$. Према томе, бројева који су мањи од 1000, а нису делљиви ни са 4 ни са 6 има $999 - 249 - 166 + 83 = 667$.

145. Број x је елемент скупа $\{4, 5, 6\}$.


146. Први радник за 1 сат ископа $\frac{2}{25}$ дужине канала, а други $\frac{2}{23}$ дужине канала. Као што је $\frac{2}{23} > \frac{2}{25}$, то други радник има бољи учинак.

147. Очигледно је $(\alpha + \beta) + (\alpha - \beta) = 180^\circ$. Дакле, $2\alpha = 180^\circ$, а $\alpha = 90^\circ$. Као што је $\beta = 90^\circ : 8$, то је $\beta = 11^\circ 15'$.


148. Бициклиста је првог дана прешао 25%, а другог 30% пута, што укупно износи 55%. Дакле, преосталих 45% износи 180 km, па је 1% једнако $180 \text{ km} : 45 = 4 \text{ km}$. Шео пут је тада $4 \text{ km} \cdot 100 = 400 \text{ km}$.

$$\text{149. } x = -\frac{1}{2}, y = -\frac{3}{2}, x^2 + y^2 = \frac{1}{4} + \frac{9}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = 2.5.$$

150. Израчунавањем углова $\triangle ABD$ и $\triangle BDE$, добија се: $\angle BAD = 24^\circ$, $\angle ABD = 68^\circ$, $\angle BED = 22^\circ$, $\angle DBE = 112^\circ$ (слика). Тада је $AD = CD$ (јер је $\triangle ACD$ једнакокрак); $BD < AD$ (јер је $\angle BAD = 24^\circ < \angle ABD = 68^\circ$); $BD < DE$ (јер је $\angle BED = 22^\circ < \angle DBE = 112^\circ$); $AD < DE$ (јер је $\angle BAD = 24^\circ > \angle BED = 22^\circ$). Дакле, $BD < AD = CD < DE$.



Сл. уз задатак 150



Сл. уз задатак 151


151. Троуглови AED и BFC су подударни ($AD = BC = a$; $\angle ADE = \angle BCF = 90^\circ$ и $DE = CF = \frac{2a}{3}$). Из ове подударности је $\angle AED = \angle BFC$, па је и $\angle MEF = \angle MFE$. Дакле, троугао MEF је једнакокрак.

152. Ако би из сваког разреда било 24 или мање ученика, укупан број такмичара би био мањи или једнак $5 \cdot 24 = 120$. Како такмичара има тачно 123, то је број такмичара бар из једног разреда већи од 24.


153. Нека је тражено снижење $x\%$. Тада је $25000(1-x)(1-x) = 16000$. Тада је $(1-x)^2 = \frac{16000}{25000} = \frac{16}{25}$. То значи да је $1-x = \frac{4}{5}$, па је тражено снижење $x = \frac{1}{5} = 20\%$.

154. Очигледно је $\sqrt{6} < \sqrt{9} = 3$. Тада је $\sqrt{6 + \sqrt{6}} < \sqrt{6 + 3} = \sqrt{9} = 3 < 3,00001$.

155. Дуж MN је средња линија троугла ABC , а дуж PQ средња линија троугла ACD (слика). Одавде следи да су дужи MN , PQ и $\frac{AC}{2}$ подударне и паралелне. Према томе, четвороугао $MNPQ$ је паралелограм.



Сл. уз задатак 155



Сл. уз задатак 156

156. Из правоуглог троугла ACC' је $AC' = 4$ см (слика). Тада је $BC' = 15 - 4 = 11$ см, а висина $CC' = 4\sqrt{3}$ см. Из Питагорине теореме је $BC^2 = (BC')^2 + (CC')^2 = 121 + 48 = 169$, па је $BC = 13$ см. Површина троугла је $P = (15 \cdot 4\sqrt{3}) : 2 = 30\sqrt{3}$ см². Из површине су висине BB' и AA' редом једнаке $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ см и $\frac{60\sqrt{3}}{13}$ см.

157. Како су изрази $a^2 + b^2 + 2ab = (a+b)^2$ и $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2$ ненегативни, то су апсолутне вредности датих израза сами ти изрази, а њихов збир је $a^2 + b^2$.


158. Ако се из друге цистерне одлије x литара на сат, онда се из прве одлије $3x$ литара на сат. Дакле, $540 - 6 \cdot 3x = 360 - 6 \cdot x - 60$. Решавањем једначине добија се $x = 20$ литара, па се из прве цистерне сваког сата одлије 60 литара, а из друге 20 литара воде.

159. Дата неједначина је еквивалентна са $(x-3)^2 - x(x-3) = (x-3)(x-3-x) = (x-3)(-3) < 0$. Дакле, $x-3 > 0$, па је $x > 3$ решење дате неједначине.


160. Дијагонала основе квадра је 10 см, па је и висина 10 см. Површина квадра је 376 см², а запремина 480 см³.

161. Троуглови MAD и MCB су слични (слика), јер је $\angle AMD = \angle BMC$ и $\angle MDA = \angle MBC$, (као периферијски над тетивом AC). Из ове сличности је $AM : MD = MC : MB$, па је $MD = (MA \cdot MB) : MC = (4 \cdot 10) : 5 = 8$ см. Тада је $CD = MD - MC = 8 - 5 = 3$ см.

162. Највише троуглова има ако су тачке F , G , H неколинеарне и ако су у паровима неколинерне са тачкама A , B , C , D , E (слика). Тада је број троуглова $10 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 1 = 46$ (на правој p има 10 дужи од којих свака са 3 преостале тачке F , G и H даје 30 троуглова, три дужи FG , GH и FH са 5 тачака праве p граде 15 троуглова и додаје се троугао FGH).



Сл. уз задатак 161



Сл. уз задатак 162

Најмање троуглова има ако су тачке F , G , H колинеарне и ако су колинеарне са једном од тачака на правој p , на пример A . Тада је број троуглова $10 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 42$ (на правој p има 10 дужи од којих свака са 3 преостале тачке F , G и H даје 30 троуглова, три дужи FG , GH и FH са 4 тачке праве p граде 12 троуглова, јер овакви троуглови са тачком A не постоје, као ни троугао FGH).

163. Сваког минута први моторциклиста прелази 200 m више од другог. То значи да за $66\text{ km} = 66000\text{ m}$ треба $66000 : 200 = 330$ минута вожње до сусрета. Дакле, први моторциклиста за то време пређе $330 \cdot 1\text{ km} = 330\text{ km}$, а други 66 km мање, тј. 264 km . Према томе, растојање између места A и места B је $330 + 264 = 594\text{ km}$.

164. Површина баште је $4 \cdot 5 = 20$ пута мања од површине винограда. Површина баште је $19990\text{ m}^2 : 20 = 9995\text{ m}^2$.

165. Нека од могућих решења су: $(2+4-6) \cdot 8 \cdot 10 = 9-9 = 0$; $2+4-6+8+10 = 9+9 = 18$; $(2+4) : 6 + 8 \cdot 10 = 9 \cdot 9 = 81$.

166. Постоје четири решења: $222 \cdot 9 + 1 = 1999$; $333 \cdot 6 + 1 = 1999$; $666 \cdot 3 + 1 = 1999$ и $999 \cdot 2 + 1 = 1999$.

167. Ако је Миша 8 пута победио компјутер, он је добио $8 \cdot 5 = 40$ жетона, што са 5 које је сам купио износи 45 жетона. Дакле, Миша је могао одиграти највише 45 игара. Према томе, Горан је био у праву.

168. I решење. Како је $5,7 + 12,3 = 18$ и како је $18 : 4,5 = 4$, то следи да је Јоца замислио број 4.


II решење. Ако је замишљени број x , онда је $x \cdot 4,5 - 12,3 = 5,7$. Решење једначине је $x = 4$.

169. На преостали део канапа од $1,5\text{ m}$ најпре додамо $0,5\text{ m}$ и добијемо 2 m . Дакле, други део канапа је $2 \cdot 2\text{ m} = 4\text{ m}$. Опет додамо $0,5\text{ m}$ и добијемо $4,5\text{ m}$. Дакле, цео канап је $2 \cdot 4,5\text{ m} = 9\text{ m}$.


170. Број је дељив са 36 ако је дељив са 4 и са 9, па његов двоцифрени завршетак мора бити дељив са 4, а збир цифара је број дељив са 9. Како је $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$, то је најмањи могући збир цифара једнак 27. Ако је најмањи такав број $1023 * * *$, онда је збир преостале три различите цифре 21. Дакле, могући су само следећи случајеви: $9 + 8 + 4$; $9 + 7 + 5$; $8 + 7 + 6$. Најмањи такав број је дакле 1023 768.

171. Кружнице k_1 и k_2 имају заједнички центар O (слика). Како кружница k_1 додирује праве AB и p , то се O налази на симетралама угла који чине ове две праве. Како кружница k_2 садржи тачке A и B , то се тачка O налази на симетралама дужи AB . Према томе, тачка O је пресек симетрале угла између правих AB и p и симетрале дужи AB . Кружница k_1 има центар O и полуупречник једнак растојању тачке O од праве p , а кружница k_2 има центар O и полуупречник $OA = OB$.

Задатак има два решења, јер праве p и AB имају две симетрале угла.



Сл. уз задатак 171



Сл. уз задатак 172


172. Једно од могућих решења дато је на слици.

173. Како је $\alpha = 0.4\beta$ и $\gamma = 4\alpha$, то је $\gamma = 4 \cdot 0.4\beta = 1.6\beta$. Тада је $\alpha + \beta + \gamma = 0.4\beta + \beta + 1.6\beta = 3\beta = 180^\circ$, па је $\beta = 60^\circ$. Дакле, $\alpha = 0.4\beta = 0.4 \cdot 60^\circ = 24^\circ$ и $\gamma = 4\alpha = 4 \cdot 24^\circ = 96^\circ$.


174. Нека су и Јанко и Марко имали по x динара. Марко је купио $\frac{x}{40}$ килограма бомбона, а Јанко $\frac{x}{60}$ килограма бомбона. Када се бомбоне помешају добије се $\frac{x}{40} + \frac{x}{60} = \frac{3x}{120} + \frac{2x}{120} = \frac{5x}{120} = \frac{x}{24}$ килограма бомбона. Како је за њих плаћено $x + x = 2x$ динара, то је цена једног килограма мешавине једнака $2x : \frac{x}{24} = 48$ динара.

175. Анализа. Нека је B_1 средиште странице AC (слика). Тачка B_1 припада средњој линији C_1B_1 и од тачке B је удаљена 5 см.

Конструкција. Најпре се конструише дуж $AB = 4$ см и код темена B угао $\beta = \angle ABp = 60^\circ$. Затим се конструише тачка C_1 , која представља средиште дужи AB . Средња линија C_1B_1 је на правој q која је паралелна са краком BC угла β . Тачка B_1 добија се у пресеку праве q и кружнице k (B , $r = 5$ см). Теме C је пресек крака Bp и праве AB_1 .



Сл. уз задатак 175




Сл. уз задатак 176


176. Слика: $\triangle AFD \cong \triangle CEB$ ($\angle FAD = \angle ECB$ – као углови са паралелним крацима; $AD = BC$; $\angle ADF = \angle CBE$ – као углови са паралелним крацима, јер је $DF \parallel BE \perp AC$). Из подударности је $DF \# BE$ (символ $\#$ је ознака за паралелне и једнаке дужи). Према томе четвороугао $BEDF$ је паралелограм.

177. Од свих простих бројева само један, број 2, је паран, а сви остали су непарни. Ако су свих 1999 простих сабирака непарни њихов збир ће бити непаран. Према томе, један од датих сабирака је сигурно 2, а осталих 1998 су непарни. Према томе, производ тих 1999 бројева је паран, јер је један чинилац број 2. Ако саберемо 1998 непарних простих бројева збир је паран број. Ако саберемо 1997 непарних бројева са бројем 2, збир је непаран број.

178. Нека се краци трапеза секу у тачки M (слика). Тада је $\angle AMB$ прав. Нека су мерни бројеви основице трапеза a и b , кракова c и d , дијагонала d_1 и d_2 , а дужи DM и CM , x и y . Из Питагорине теореме је $a^2 + b^2 = (x+d)^2 + (c+y)^2 + x^2 + y^2 = (x+d)^2 + y^2 + (c+y)^2 + x^2 = d_1^2 + d_2^2$.



Сл. уз задатак 178




Сл. уз задатак 179


179. Површина правилног дванаестоугла једнака је површини 6 подударних делтоида (слика). Површина једног делтоида је $6 \cdot 6 : 2 = 18 \text{ cm}^2$, па је површина дванаестоугла $6 \cdot 18 = 108 \text{ cm}^2$.

180. Како је $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 10 = x^2 + 2x + 1 + y^2 - 6y + 9 = (x+1)^2 + (y-3)^2 = 0$ и како је збир квадрата једнак 0 ако и само ако је сваки од сабираца једнак 0, то је $x+1=0$ и $y-3=0$. Даље, $x=-1$ и $y=3$, па је $x^{1999} + 1999y = (-1)^{1998} + 3 \cdot 1999 = 1 + 5997 = 5998$.

181. Нека права MO сече страницу CD у тачки N (слика). Из услова задатка је $\angle MAD = \angle AMO$, па је трапез $AMND$ једнакоцрак. Зато су дијагонале трапеза подударне, тј. $AN = MD$. Како је $\triangle AND \cong \triangle CMB$ ($AD = BC$, $\angle ADN = \angle MBC$, $DN = MB$ - као дужи централно-симетричне у односу на тачку O), то је из подударности $AN = MC$. Због $AN = MD$, следи да је $MC = MD$.



Сл. уз задатак 181



Сл. уз задатак 183


182. Уочимо класе бројева тако да сваку класу чине два непарна броја чији је збир 100. Те класе су: $(1, 99)$; $(3, 97)$; \dots ; $(47, 53)$; $(49, 51)$. Како класа има 25, а бројева 26, то на основу Дирихлеовог принципа постоји класа у којој се налазе два од датих бројева. Та два непарна броја имају збир 100.

183. Висина троугла OMN је 4 (слика). Да би површина троугла OMN била 14, то основица ON мора бити 7. Дати услов задовољавају две тачке: $N_1(7, 0)$ и $N_2(-7, 0)$. Једначине тражених правих су:


$$OM : y = \frac{4}{3}x; MN_1 : y = -x + 7; MN_2 : y = \frac{2}{5}x + \frac{14}{5}.$$

184. Како је површина дијагоналног пресека 204 cm^2 , а висина пирамиде 17 cm , то је дијагонала основе једнака $2 \cdot 204 : 17 = 24 \text{ cm}$ (слика). Тада је основна ивица пирамиде $12\sqrt{2} \text{ cm}$. Бочна висина пирамиде је $h^2 = 289 + 72 = 361$, па је $h = 19 \text{ cm}$. Површина пирамиде је $P = B + M = 288 + 4 \cdot 12\sqrt{2} \cdot 19 : 2 = (288 + 456\sqrt{2}) \text{ cm}^2$, а запремина $V = 288 \cdot 17 : 3 = 1632 \text{ cm}^3$.

185. Број чији декадни запис садржи само цифре 2 и 6 у било ком поретку је облика $4k + 2$, јер његов двоцифрени завршетак може бити 22, 26, 62 или 66. Даље, $x^2 - y^2 = 4k + 2$, па је $(x+y)(x-y) = 2(2k+1)$, што значи да је један од бројева $x+y$ и $x-y$



Сл. уз задатак 184



Сл. уз задатак 186

паран, а други непаран. Како је то немогуће, јер су $x + y$ и $x - y$ бројеви исте парности, то једначина нема решења.

186. Очигледно да за површину конвексног четвороугла $ABCD$ важи $P = AB \cdot CC' : 2 + AD \cdot CC'' : 2 \leqslant AB \cdot BC : 2 + AD \cdot CD : 2$ (слика). Дакле, $AB \cdot BC + CD \cdot DA \geqslant 2P$.

187. Први топ се може распоредити на 64 поља, други на преосталих $64 - 15 = 49$ ненападаних поља, а трећи на преосталих $49 - 13 = 36$ ненападаних поља. Дакле, три топа се могу разместити на $64 \cdot 49 \cdot 36 = 112\,896$ начина.

188. Како је $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$, то су за једначину $x^2 - y^2 = 5^{1999}$ могући следећи случајеви:

$x+y$	5^{1999}	5^{1998}	5^{1997}	...	5^{1001}	5^{1000}
$x-y$	1	5	5^2	...	5^{998}	5^{999}

Дакле, једначина $x^2 - y^2 = 5^{1999}$ има 1000 решења у скупу природних бројева.

Како бројеви $x+y$ и $x-y$ морају бити исте парности, за једначину $x^2 - y^2 = 4^n = 2^{2n}$ су могући следећи случајеви:

$x+y$	2^{2n-1}	2^{2n-2}	2^{2n-3}	...	2^{n+2}	2^{n+1}
$x-y$	2	2^2	2^3	...	2^{n-2}	2^{n-1}

То значи да једначина $x^2 - y^2 = 4^n$ има $n-1$ решење.

Према томе, $n-1=1000$, па је $n=1001$.

189. Претпоставимо супротно, тј. да је могуће написати деветоцифрени број од кога се брисањем цифара никада не добијаја најмање двоцифрени квадрат.


У том броју, цифра 1 је иза цифре 6, јер због 16, цифра 6 не сме бити иза цифре 1. Цифра 4 мора бити испред цифре 6, јер ако би била иза, онда би се брисањем преосталих цифара добио број 64. Слично и цифра 9 мора бити испред цифре 4, јер ако би било супротно, онда би се брисањем преосталих цифара добио број 49. Дакле, поредак цифара је несумњиво ...9...4...6...1...

Ако се избрише цифра 4 и све остале цифре, остаје број $961 = 31^2$, што је контрадикција са почетном претпоставком.


190. Нека је Јелена одабрала бројеве чији је збир A , онда су Ивану остали бројеви чији је збир B . Како је $A+B = 1+3+5+7-8-12+13-14-16+21 = 0$, то је $A = -B$, па је $|A| = |B|$. Дакле, ма како Јелена бирала бројеве никада не може победити, јер је

апсолутна вредност збира њених бројева једнака је апсолутној вредности збира Иванових бројева.

191. Нека је P тачка дужи AB таква да је $CP \parallel AD$ и нека је Q тачка дужи AB таква да је $CQ \parallel MN$ (слика). Како је $AP = CD$, то је $BP = AB - CD$. Како је $MN = CQ$ и $MN = \frac{1}{2}(AB - CD) = \frac{1}{2}BP$, то је $CQ = \frac{1}{2}BP$. Троуглови ABE и BCP су слични и како је M средиште AB , то је и Q средиште BP (лако доказујемо да права MN садржи тачку E). Дакле, $PQ = QB = QC$, што значи да је троугао BCP правоугли, па је и троугао AEB правоугли, а $\angle AEB = 90^\circ$.



Сл. уз задатак 191



Сл. уз задатак 192

192. Нека су S_1, S_2, \dots, S_n центри датих кругова полупречника r (слика). Како тачка M припада свим круговима, то је $S_1M < r, S_2M < r, \dots, S_nM < r$. Како је тачка S_1 изван свих осталих кругова, то је $S_1S_2 > r, S_1S_3 > r, \dots, S_1S_n > r$. Слично је $S_iS_j > r$. Дакле, у троуглу S_iS_jM је $S_iS_j > r, S_iM < r$ и $S_jM < r$. Наспрам највеће странице је највећи угао, па је $\angle S_iMS_j > 60^\circ$. Ако би било 6 тачака, тада би за збир дисјунктних углова важило $\angle S_1MS_2 + \angle S_2MS_3 + \angle S_3MS_4 + \angle S_4MS_5 + \angle S_5MS_6 + \angle S_6MS_1 > 6 \cdot 60^\circ = 360^\circ$, што је немогуће. Према томе, тачака је највише 5.

193. Одузимањем друге од прве дате једнакости и треће од друге, редом се добија $a^3 - b^3 + (a - b)x = 0$ и $b^3 - c^3 + (b - c)x = 0$, тј. $(a - b)(a^2 + ab + b^2 + x) = 0$ и $(b - c)(b^2 + bc + c^2 + x) = 0$. Како је $a \neq b$ и $b \neq c$, то су ове једнакости могуће само ако је $a^2 + ab + b^2 + x = 0$ и $b^2 + bc + c^2 + x = 0$. Одузимањем последњих добијених једнакости добија се $a^2 + ab - bc - c^2 = 0$, тј. $(a - c)(a + c) + b(a - c) = 0$. Тада је $(a - c)(a + c + b) = 0$, а како је $a \neq c$, то је $a + b + c = 0$.

194. Како је $A_0 = 2^0 + 3^2 + 5^2 = 35$, за $n = 0$, то највећи заједнички делилац бројева A_0, A_1, \dots, A_n може бити само 35, 7, 5 или 1.

За $n = 1$ је $A_1 = 2^3 + 3^8 + 5^8 = 397194$, па бројеви 5 и 35 не могу бити заједнички делиоци, јер број 397194 није дељив са 5. Дакле, остаје да се провери дељивост бројем 7.


Како је

$$\begin{aligned} A_n &= 2^{3n} + 3^{6n+2} + 5^{6n+2} = (2^3)^n + 3^2 \cdot (3^3)^{2n} + 5^2 \cdot (5^3)^{2n} \\ &= 8^n + 9 \cdot 27^{2n} + 25 \cdot 125^{2n} \end{aligned}$$

и како је $8 \equiv 1 \pmod{7}$, $27 \equiv -1 \pmod{7}$ и $125 \equiv -1 \pmod{7}$, то је $A_n \equiv 1^n + 9 \cdot (-1)^{2n} + 25 \cdot (-1)^{2n} \pmod{7}$, тј. $A_n = 1 + 9 + 25 \equiv 35 \equiv 0 \pmod{7}$. Према томе, највећи заједнички делилац бројева A_0, A_1, \dots, A_n је број 7.


195. Докажимо да се квадрат може разделити на троуглове са теменима из скупа M , и одредимо број тих троуглова. Оба циља ћемо постићи додавањем једне по једне од 1999 тачака. Прва тачка разлаже квадрат на 4 троугла (левица слика). Свака нова тачка припада унутрашњости неког претходно одређеног троугла (слика у средини) или припада страници нека два суседна претходно одређена троугла (десна слика). У првом случају

додавање нове тачке увећава број троуглова за 2 (један стари замењује се са 3 нова), а у другом случају додавањем нове тачке се поново број троуглова увећава за 2 (два стара замењују се са 4 нова). Зато ће додавањем последње, 1999-те тачке квадрат бити раздељен на $4 + 1998 \cdot 2 = 4000$ троуглава. Како је површина квадрата једнака $20 \cdot 20 = 400$, то бар један од ових троуглава има површину мању или једнаку $\frac{400}{4000} = \frac{1}{10}$.



Сл. уз задатак 195

196. Нека су O_1 и O_2 редом центри датих кругова k_1 и k_2 . Како је $\angle CAD < \angle BAD$, то је $\angle CAD < \frac{\pi}{2}$. Зато су тачке O_2 и A са исте стране дужи CD , па су и тачке C' и A са исте стране дужи CD .



Сл. (а) уз задатак 196

Сл. (б) уз задатак 196

(а) Нека је $\angle BAD < \frac{\pi}{2}$ (слика (а)). Тада су тачке O_1 и A са исте стране дужи BD , па су и тачке B' и A са исте стране дужи BD .

(1) Како је BB' пречник круга k_1 , то је $\angle BDB' = 90^\circ$. Слично је CC' пречник круга k_2 , па је и $\angle CDC' = 90^\circ$. Одавде следи да су тачке B' и C' колинеарне, јер је $B'D \perp BC$ и $C'D \perp BC$.

(2) Нека је $\angle ABB' = \varphi$. Тада је и $\angle ADB' = \varphi$, као периферијски угао над истим луком AB' круга k_1 . Ако је $\angle ADB' = \angle ADC' = \varphi$, онда је и $\angle ACC' = \varphi$, као периферијски углови над истим луком AC' круга k_2 .

(3) Троуглови ABB' и ACC' су подударни, јер су оба правоугла ($\angle BAB' = 90^\circ = \angleCAC'$), $AB = AC$ и $\angle ABB' = \angle ACC' = \varphi$. Из подударности ових троуглава следи да је $AB' = AC'$, па је троугао $AB'C'$ једнакокрак.

(4) Како је $B'M = C'M$, то је $AM \perp B'C'$, па је $AM \parallel BC$. Тада је $P_{\Delta BMC} = \frac{BC \cdot DM}{2} = \frac{BC \cdot AA'}{2} = P_{\Delta ABC}$. Дакле, површина троугла BMC је константна и не зависи од положаја тачке D .

(б) Ако је $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, као и $\angle BAD > \frac{\pi}{2}$, распоред тачака на правој MD није исти као у случају (а), али тврђење задатка и тада вреди (слика (б)). Решење задатка у овом случају препуштамо читаоцу.

2000. година

197. Ученик је добио збир већи за $842 - 379 = 463$.



198. Нада је првог и трећег месецда заједно потрошила $2 \cdot 1350 - 856 - 800 = 2700 - 1656 = 1044$ динара.

199. Решење је: $x = 10^5 - 2000 = 100000 - 2000 = 98000$.

200. Обим једног правоугаоника је $360 \text{ cm} : 3 = 120 \text{ cm}$. Пона обима је 60 cm , па је дужина правоугаоника 35 cm , а ширина 25 cm .

201. На датој слици има 18 троуглава.

202. Очигледно је $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ и $A \cap B = \{3\}$. Тада је $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B = \{1, 2\}$ и $(A \cup B) \setminus B = A \setminus B = \{1, 2\}$.



Сл. уз задатак 203

203. Ако се кружнице додирују споља $MN = 3 \text{ cm} + 2 \text{ cm} = 5 \text{ cm}$, а ако се додирују изнутра онда је $MN = 3 \text{ cm} - 2 \text{ cm} = 1 \text{ cm}$ (слика).

204. Како је $1 + 1000 = 2 + 999 = 3 + 998 = \dots = 1001$ и како таквих парова има $1000 : 2 = 500$, то је збир свих природних бројева од 1 до 1000 једнак $500 \cdot 1001$. Како је $1001 = 11 \cdot 7 \cdot 13$, то је тражени збир дељив са 7.


205. Трећина угла α и трећина угла β износе заједно $180^\circ : 3 = 60^\circ$. Како је пет шестина угла α , за три шестине веће од трећине тог угла то значи да три шестине угла α износе $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$, па је једна шестина 10° , а цео угао $\alpha = 60^\circ$. Дакле, угао β је 120° .

206. Ради се о сабирању $18 + 180 + 1802 = 2000$.


207. Како су троуглови ABC и $A'B'C'$ подударни то су подударни и сви њихови елементи, дакле $AB = A'B'$, $\angle ABC = \angle A'B'C'$ и $BC = B'C'$. Тада су и троуглови BCM и $B'C'M'$ подударни, јер је $\angle ABC = \angle A'B'C'$, $BC = B'C'$ и $\angle BCM = \angle B'C'M'$. Из подударности је $BM = B'M'$. Тада је и $AM = AB - BM = A'B' - B'M' = A'M'$.

208. Да би број био дељив са 36 мора бити дељив са 4 и 9. Према томе двоцифрен завршетак $\overline{0b}$ може бити 00, 04 или 08, па је $b = 0$, $b = 4$ или $b = 8$. Како број мора бити дељив и са 9, то збир његових цифара мора бити дељив са 9. Дакле, $a = 9 - 2 - 0 = 7$ или $a = 9 - 2 - 4 = 3$ или $a = 18 - 2 - 8 = 8$. Тражени бројеви су: 720000, 320004, 820008.

209. Троуглови ACD и BCE су једнакокраки (слика). Због тога је $\angle DCA = \frac{\alpha}{2}$ и $\angle BCE = \frac{\beta}{2}$. Како је $\angle DCE = \angle DCA + \angle ACB + \angle BCE$, то је $\angle DCE = \frac{\alpha}{2} + 90^\circ + \frac{\beta}{2} = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$.



Сл. уз задатак 209




Сл. уз задатак 211

210. Како је $|x + 2| \geq 0$, то дату неједначину задовољавају сви природни бројеви за које је $5x - 15 > 0$, а не задовољавају они за које је $5x - 15 \leq 0$. Дакле, $5x \leq 15$, тј. $x \leq 3$. Према томе, тражени бројеви су 1, 2 и 3.


211. Нека је $\angle CAB = 40^\circ$ и нека тежишна дуж сече хипотенузу у тачки D , висина у тачки E , а симетрала правог угла у тачки F (слика). Тада је троугао DCA једнакокраки ($AD = BD = CD$), па је и $\angle DCA = 40^\circ$. Како је $\angle BCF = \angle ACF = 45^\circ$, то је $\angle ECF = \angle BCF - \angle BCE = 45^\circ - 40^\circ = 5^\circ$. Дакле, $\angle ECF = \angle DCF = 5^\circ$.

212. Очигледно је $5\sqrt{2} + 4\sqrt{3} = \sqrt{50} + \sqrt{48}$ и $3\sqrt{5} + 7 = \sqrt{45} + \sqrt{49}$. Како је $50 > 49$ и $48 > 45$, то је и $5\sqrt{2} + 4\sqrt{3} > 3\sqrt{5} + 7$.

213. Страница квадрата је $\sqrt{20} \text{ cm} = 2\sqrt{5} \text{ cm}$, па тражени квадрат треба конструисати над хипотенузом правоуглог троугла чије су катете 4 cm и 2 cm (слика). Могућа су и друга решења.



Сл. уз задатак 213



Сл. уз задатак 215

214. Број дечака је за 252 већи од броја девојчица, а то је 30% укупног броја ученика (јер дечака има 65%, а девојчица 35%). Зато је 10% броја ученика једнако 84, па је у тој школи било 840 ученика: 294 девојчица и 546 дечака.

215. Нека је дата страница $AB = 24 \text{ cm}$ и нека тежишна дуж сече AB у тачки D , а висина у тачки E (слика). Тада је, користећи Питагорину теорему, $DE = 6 \text{ cm}$, па је $BC = \sqrt{8^2 + 18^2} = \sqrt{388} \text{ cm}$. Слично је $AC = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$. Дакле, обим троугла је $O = 24 + 10 + \sqrt{388} = (34 + 2\sqrt{97}) \text{ cm}$.

216. Славина A за 1 сат напуни $\frac{1}{12}$ базена, а славина B напуни $\frac{1}{15}$ базена. Одводна цев за један сат испразни $\frac{1}{10}$ базена. Дакле, за један сат напуниће се $\frac{1}{12} + \frac{1}{15} - \frac{1}{10} = \frac{1}{20}$ базена. Џео базен ће се напунити за 20 сати.

217. Сваке две праве одредују једну раван, па је укупан број равни $2000 \cdot 1999 : 2 = 1999000$ равни.

218. Ако је Лека добио x динара, Жарко је добио $1416 - x$. Тада је $\frac{3}{7}$ Лекиног дела једнако са $\frac{5}{8}$ Жарковог дела, тј. $\frac{3}{7}x = \frac{5}{8}(1416 - x)$. Решавањем једначине се добија да је $x = 840$. Дакле, Лека је добио 840, а Жарко 576 динара.

219. Коцка ивице a има површину $6a^2$ и запремину a^3 . Како коцка ивице $1.3a$ има површину $6 \cdot 1.69a^2$ и запремину $2.197a^3$, то се површина коцке повећала за 69%, а запремина за 119.7%.

220. Углови троугла су 27° , 117° и 36° .

221. Како је $n^2 + 2n + 2000 = k^2$, то је $n^2 + 2n + 1 + 1999 = k^2$. Дакле, $(n+1)^2 + 1999 = k^2$, тј. $k^2 - (n+1)^2 = 1999$. Тада је $(k+n+1)(k-n-1) = 1999$. Број 1999 је прост, па је $k+n+1 = 1999$ и $k-n-1 = 1$. Решење је $n = 998$.

222. За један сат бродови се приближе за $22\text{ km} + 28\text{ km} = 50\text{ km}$. За 40 сати они предују $40 \cdot 50\text{ km} = 2000\text{ km}$.

223. После размене кликера Пера и Васа ће имати по x кликера, а Огњен $x + x = 2x$ кликера, што укупно износи $x+x+2x = 4x = 160$ кликера. Сада Пера и Васа имају по 40, а Огњен 80 кликера. Према томе, Пера је имао $40 + 17 = 57$ кликера, Васа $40 + 12 = 52$ кликера, а Огњен $80 - 17 - 12 = 51$ кликер.

224. Ако је дужина странице квадрата x mm, онда се обим квадрата повећао за $x + 22\text{ mm} + x + 22\text{ mm} = 2000\text{ mm}$. Одавде је $2x + 44 = 2000$, тј. $2x = 1956$ и $x = 978$. Дакле, дужина странице квадрата је 978 mm.

225. Нека је дати број \overline{xy} . Добијени број је \overline{xyxy} . Однос добијеног и датог броја дефинисан је количником $\overline{xyxy} : \overline{xy} = 101$, тј. добијени број је 101 пут већи од датог.

25	11	21
15	19	23
17	27	13

226. Једно од могућих решења дато је на слици.

227. Како је $X \subset (A \cup B)$, то је $X \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Слично је $X \cap A = A \setminus B = \{1, 2, 3\}$ и $X \cap B = B \setminus A = \{6, 7, 8\}$. Дакле, $X = \{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$.

228. Веснин, односно Иванов корак има дужину $\frac{67}{77} = \frac{67 \cdot 8}{7 \cdot 11 \cdot 8} = \frac{536}{7 \cdot 11 \cdot 8} \text{ m}$ тј. $\frac{78}{88} = \frac{78 \cdot 7}{8 \cdot 11 \cdot 7} = \frac{546}{7 \cdot 11 \cdot 8} \text{ m}$. Значи да је Иванов корак дужи од Весниног за $\frac{10}{308} = \frac{5}{154} \text{ m}$.

229. Дати збир се може представити као $7085 + 3405 + 10210 + \overline{aaaa} = 20700 + \overline{aaaa}$. Како је број 20700 дељив са 9, то мора бити и број $aaaa$, тј. $4 \cdot a$ мора бити дељиво са 9, па је $a = 0$ или $a = 9$.

230. Из услова задатка је $a + b = 180^\circ$ и $b + c = 90^\circ$, што значи да се углови a и c разликују за 90° . Како је $a + c = 142^\circ$, то је $a = 116^\circ$ и $c = 26^\circ$, па је $b = 64^\circ$.


231. Свих 60 коња поделе се у 5 група (A, B, C, D, E) по 12 коња. Како има 48 поткивача, у првом кораку за 5 минута поткивају се групе A, B, C и D ; у другом групе B, C, D и E ; у трећем C, D, E и A ; у четвртом D, E, A и B и у петом E, A, B и C . Тако ће после 25 минута сви коњи бити потковани.

232. Јасно је да је $-(-x) = x$, па је очигледно $6 < x < 10$, или $x \in \{7, 8, 9\}$. Како је $|x| < 8$, то је $x = 7$.


233. Ако је x сумма која се дели онда је Јарко добио $\frac{x}{3}$, Лека $\frac{1}{4} \cdot \frac{2x}{3} = \frac{x}{6}$, а Пеђа $x - \frac{x}{3} - \frac{x}{6} = \frac{x}{2}$ динара. Како је Пеђа добио 100 динара више од Јарка, то $\frac{x}{2} - \frac{x}{6} = \frac{x}{3}$ износи 100 динара, па је цела сумма 600 динара. Јарко је добио 200, Пеђа 300, а Лека 100 динара.

234. Нека је страница датог квадрата a и нека је $AM = BN = CP = DQ = x$ (слика). Тада је $MB = NC = PD = QA = a - x$. Троуглови MBN, NCP, PDQ и QAM су подударни, јер поред наведених једнаких страница имају и једнаке праве углове. Из

подударности троуглова следи да су једнаки и њихови углови. Ако је $\angle BMN = \alpha$, онда је $\angle AMQ = 90^\circ - \alpha$, па је $\angle QMN = 180^\circ - \alpha - (90^\circ - \alpha) = 90^\circ$. На сличан начин се доказује да су и остали углови четвороугла $MNPQ$ прави.



Сл. уз задатак 234



Сл. уз задатак 235


235. Углови троугла су 36° , 64° и 80° (слика). Нека је D подножје висине из C , а E тачка у којој симетрала $\angle ACB$ сече страницу AB . Тада је $\angle ACD = 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ$. Како је $\angle ACE = 40^\circ$, то је $\angle DCE = 40^\circ - 26^\circ = 14^\circ$.

236. Површина шуме је $2\ 100 \text{ m}^2$, а површина парчета земље 60 m^2 , што значи да се шума може поделити на $5 \cdot 7 = 35$ таквих парчића. Како има 34 стабла, то значи да на основу Дирихлеовог принципа постоји бар један део у коме нема ниједног стабла.


237. Како је $a = 2^{45} = (2^5)^9 = 32^9$, $b = 3^{36} = (3^4)^9 = 81^9$, $c = 4^{27} = (4^3)^9 = 64^9$, $d = 5^{18} = (5^2)^9 = 25^9$, то је $d < a < c < b$.

238. Вредност израза је $-\frac{13}{4} = -3\frac{1}{4}$.

239. Нека је дат трапез $ABCD$ (слика). Нека права p која је паралелна са AD и садржи теме C сече основицу AB у тачки E . У троуглу EBC странице су 13 cm, 14 cm и 15 cm, а висина CC' која одговара страници EC једнака је 12 cm (доказати). Према томе површина трапеза је $P = 276 \text{ cm}^2$.



Сл. уз задатак 239



Сл. уз задатак 240


240. Доказ да је четвороугао $PQRS$ правоугаоник се изводи применом особина средње линије троугла или подударности троуглова (слика). Коришћењем Питагорине теореме добија се да је дужина друге дијагонале ромба 6 cm. Како су странице правоугаоника средње линије троуглова чије су основице дијагонале ромба, то су њихове дужине 4 cm и 3 cm, па је површина правоугаоника 12 cm^2 .

241. Ако Аца има $6x$ динара, онда Богдан има $9x$ динара. Тада Цеца има $5x$ динара, а сви заједно имају $20x$ динара. То значи да је $x = 100$ динара, па Аца треба да добије 600 динара, Богдан 900 динара, а Цеца 500 динара.


242. Нека је x број седишта у једном аутобусу. Тада је на основу задатка $18(x + 5) = 21x - 6$. Решавањем једначине се добије да је $x = 32$. Дакле, број ученика у тој школи је $18(32 + 5) + 174 = 840$.

243. Ако је $x < 0$, онда је $|x| + x = 0$, па се једначина своди на $|x| = 2000$, што значи да је решење $x = -2000$. Ако је $x \geq 0$, онда су све „апсолутне заграде“ сувишне, па једначина постаје $5x = 2000$, а $x = 400$.


244. Нека су B' и D' пројекције тачака B и D на раван α (слика). Како је $BB' = 12$ cm, а $\angle BAB' = 30^\circ$, то је $AB = 24$ cm. Тада је $CD = 48 - 24 = 24$ cm, а како је DD' такође 12 cm, то је и $\angle DCD' = 30^\circ$.



Сл. уз задатак 244



Сл. уз задатак 245



Сл. уз задатак 246

245. Нека су α , β , γ и δ углови датог четвороугла (слика). Тада је $\angle AOB + \angle COD = 180^\circ - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2} + 180^\circ - \frac{\gamma}{2} - \frac{\delta}{2} = 360^\circ - (\alpha + \beta + \gamma + \delta) : 2 = 360^\circ - 180^\circ = 180^\circ$.

246. Како је $AB \parallel DK$, то је $AE : EK = BE : DE$ (слика). Слично је $AD \parallel BF$, па је $BE : DE = EF : AE$. Следи да је $AE : EK = EF : AE$ или $AE^2 = EF \cdot EK$.

247. Површина њиве је $750 \cdot 200 = 150\,000$ m² = 1500 a. Маса траве је тада $1500 \cdot 240 = 360\,000$ kg = 360 t. Према томе, маса сена је $360 t : 4 = 90$ t.

248. Нека је први број x . Тада је други број $3x$, а трећи $x-5$. Следи да је $x+3x+x-5 = 6\,000$, па је $5x - 5 = 6\,000$. Дакле, $5x = 6\,005$, а $x = 1\,201$. Први број је 1201, други 3603, а трећи је 1196.

249. Ако преведемо на језик сабирања добиће се $2000 + ABA = CDDC$. Очигледно је $C = 2$, јер збир броја 2000 и било ког троцифреног броја не прелази 2999. Тада је и $A = 2$, јер је само $0 + 2 = 2$ (цифра јединица). Јасно је да је тада $D = 2 + 0 = 2$, а из истих разлога је и $B = 0 + 2 = 2$.

250. Радници су на свака 3 дана уштедели по 1 дан. Како су цео посао скратили за $70 - 55 = 15$ дана, то значи да су убрзаним темпом уместо $3 \cdot 15 = 45$ дана, радили $2 \cdot 15 = 30$ дана. Дакле, $55 - 30 = 25$ дана радили су пре убрзавања.


251. Како је деце било петоро, могло је остати само 1, 2, 3 или 4 бомбоне. Ако је остало 1 бомбона, онда је било $5 \cdot 1 + 1 = 6$ бомбона. Ако су остале 2, онда је било $5 \cdot 2 + 2 = 12$ бомбона, или $5 \cdot 3 + 3 = 18$ или $5 \cdot 4 + 4 = 24$ бомбоне.

252. Првог сата аутомобилиста је прешао $(360 : 15) \cdot 4 = 96$ km. Другог сата $7/8$ пређеног пута из првог сата, а то значи $(96 : 8) \cdot 7 = 84$ km. За прва два сата је прешао укупно $96 + 84 = 180$ km, што значи да је трећег сата прешао $180 : 2 = 90$ km. Последњег сата аутомобилиста је прешао $360 - 180 - 90 = 90$ km.

253. Три пекара за 2 сата умесе 67 хлебова, што значи да за 6 сати рада један пекар умеси 67 хлебова или $\frac{67}{6}$ хлебова на сат. Четири пекара за три сата имају 12 радних сати, па ће умесити $12 \cdot \frac{67}{6} = 134$ хлеба. Да би се умесило 335 хлебова, потребно је $335 : \frac{67}{6} = 30$ радних сати. Дакле, 5 пекара треба да раде по 6 сати.

254. Ако је $q = 2$, онда је $2p + 6 = 100$, па је $2p = 94$, а $p = 47$. Ако је q прост број већи од 2, онда је q непаран, па је и $3q$ непаран број, што значи да је и $2p + 3q$ непаран број и да не може никада бити 100. Дакле, једино решење је $p = 47$, $q = 2$.

255. Нека је x број математичара који су и филозофи. Тада је $13x - x = 12x$ математичара који нису филозофи и $8x - x = 7x$ филозофа који нису математичари. Дакле, $12x + x + 7x = 20x = 2000$, па је $x = 2000 : 20 = 100$. Значи само математичара је 1200, само филозофа 700, а математичара који су и филозофи 100.




Сл. уз задатак 256


Према томе, $12x + 13x + 15x = 40x = 2000$, па је $x = 50$ kg. У првој продавници је било 600 kg, у другој 650 kg, а у трећој 750 kg јабука.

258. Нека је делилац у оба случаја био број x . Тада је $1000 = ax + 8$, а $900 = bx + 1$. Тада је $ax = 992 = 31 \cdot 32$ и $bx = 899 = 31 \cdot 29$. Како су 32 и 29 узајамно прости бројеви, очигледно је делилац $x = 31$, а тражени количници су $a = 32$ и $b = 29$.

259. Тачка C је симетрична датој тачки C' у односу на средњу линију A_1B_1 (слика). Права p садржи тачку C' , садржи и страницу AB и паралелна је са A_1B_1 . Теме A је пресек праве p и праве CB_1 , а теме B је пресек правих p и CA_1 .



Сл. уз задатак 259



Сл. уз задатак 260

260. Четвороуглови $PBRD$ и $AQCS$ су паралелограми, па је $KN \parallel LM$ и $KL \parallel MN$ (слика). Дакле, четвороугао $KLMN$ је паралелограм. Како су KP и MR средње линије треуглова ABL и CDN , то је $AK = KL = MN = MC$. Како је LQ половина дужи MC , то је $KL = \frac{2}{5}AQ$.


261. Четврти дечак је добио половину преосталих кликера и још један кликер, што значи да половина броја кликера износи 1 кликер, а он је дакле добио $1 + 1 = 2$ кликера. Пред трећим дечаком је било $2(2 + 1) = 6$ кликера. Пред другим дечаком је било $2(6 + 1) = 14$ кликера, а пред првим $2(14 + 1) = 30$ кликера. Дакле, први дечак је добио $15 + 1 = 16$ кликера, други $7 + 1 = 8$ кликера, трећи $3 + 1 = 4$ кликера, а четврти 2 кликера.

262. Ако је $x = 1.49494949\dots$, онда је $100x = 149,494949\dots$. Следи да је $100x - x = 99x = 149,494949\dots - 1,494949\dots = 148$. Дакле, $x = \frac{148}{99}$, па је x рационалан број. Како


су бројеви $7+4\sqrt{3} = (2+\sqrt{3})^2$ и $7-4\sqrt{3} = (2-\sqrt{3})^2$, то је $y = \sqrt{7+4\sqrt{3}} + \sqrt{7-4\sqrt{3}} = 2+\sqrt{3}+2-\sqrt{3}=4$. Вредност израза $x+y$ је $\frac{148}{99}+4=5\frac{49}{99}$, тј. рационалан број.

263. Ако је $(ab+cd)^2 = (a^2+c^2)(b^2+d^2)$, онда је $a^2b^2+2abcd+c^2d^2 = a^2b^2+a^2d^2+c^2b^2+c^2d^2$, па је $2adbc = a^2d^2+c^2b^2$, односно $a^2d^2-2adbc+c^2b^2 = (ad-bc)^2 = 0$. Јасно је да је тада и $ad-bc = 0$, па је $ad = bc$.

264. Како је A_1B_1 средња линија троугла ABC , то је $B_1P \parallel AB$ (слика). Тада је $\angle BAP = \angle APB_1 = \frac{\alpha}{2}$ (углови са паралелним крацима) и $\angle BAP = \angle B_1AP = \frac{\alpha}{2}$ (права AP је симетрала угла). Одавде следи да је $\angle APB_1 = \angle B_1AP = \frac{\alpha}{2}$, па је троугао APB_1 једнакокрак и $AB_1 = B_1P = B_1C$. Због тога је AC пречник круга описаног око троугла APC , па је $\angle APC = 90^\circ$.



Сл. уз задатак 264



Сл. уз задатак 265


265. Очигледно је троугао CDE заједнички за оба паралелограма (слика). Како је површина паралелограма $ABCD$ двострука површина троугла CDE , а површина паралелограма $DEFG$ такође двострука површина троугла CDE , то су површине ова два паралелограма једнаке.

266. Када се изаберу било која три темена седмоугла добије се један троугао. Преостала четири темена су темена четвороугла. То значи да сваки одабрани троугао има свој одговарајући четвороугао, тј. да троуглова и четвороуглова има једнако.


267. Нека је x број кифли, y број погачица и z број ћеврека који су купљени. Тада важи $x+y+z = 100$ и $\frac{1}{2}x+2y+5z = 100$. Ако се друга једначина помножи са 2 и од ње одузме прва, добија се $x+4y+10z-x-y-z = 200-100$, тј. $3y+9z=100$. Једначина нема решења у склупу целих бројева, јер је лева страна дељива са 3, а десна није.

268. Решавањем једначине добија се $x = \frac{2(3-2m)}{m-4}$. Из услова задатка је $x < 0$, па је $m < \frac{3}{2}$ или $m > 4$.

269. Нека је M средиште тетиве AB (слика). Како су троуглови BOM и ABC слични, то је $AB : AC = BO : MB$. Тада је $AB \cdot MB = AC \cdot BO$, па је $AB \cdot 2MB = AC \cdot 2BO$. Дакле, $AB \cdot AB = AC \cdot 8$, тј. $AB^2 : AC = 8$.



Сл. уз задатак 269



Сл. уз задатак 270


270. Из једнакости мерних бројева површине $P = \frac{3x^2\sqrt{3}}{4}$ и запремине $V = \frac{x^3\sqrt{3}}{24}$, добија се $x = 18$ (слика).

271. У први ред ученици могу да седну на $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$ начина, у други на $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$ начина, а преостала 3 ученика ће сести на $3 \cdot 2 \cdot 1$ начина. Дакле, укупан број распореда је $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3 \cdot (6!)^2$.


272. Из $\frac{2}{73} = \frac{1}{60} + \frac{1}{219} + \frac{1}{292} + \frac{1}{x}$ следи да је $\frac{1}{x} = \frac{2}{73} - \frac{1}{60} - \frac{1}{3 \cdot 73} - \frac{1}{4 \cdot 73} = \frac{12 \cdot 73}{12 \cdot 73} - \frac{1}{60} = \frac{17}{12 \cdot 73} - \frac{1}{12 \cdot 5}$ или $\frac{1}{x} = \frac{17 \cdot 5}{5 \cdot 12 \cdot 73} - \frac{1}{12 \cdot 5 \cdot 73} = \frac{1}{12 \cdot 5 \cdot 73} = \frac{1}{365}$. Дакле, $x = 365$.

273. Нека од 100% учесника такмичења $x\%$ навија за „Црвену Звезду“. Тада за „Партизан“ навија $(100 - x)\%$ такмичара, па је $x + 0,1 \cdot (100 - x) = 46$. Из добијене једнакости је $x + 10 - 0,1x = 46$ или $0,9x = 36$, па је $x = 40\%$.

274. Углови правоуглог троугла су $\angle CAB = 15^\circ$ и $\angle CBA = 75^\circ$ (слика). Нека је хипотенуза $AB = 4x$ и нека су D и E редом подножја тежишне дужи и висине из темена правог угла. Тада је $AD = BD = CD = 2x$ и $\angle CDE = 30^\circ$. Како је троугао CDE правоугли, то је наспрам угла од 30° катета једнака половини хипотенузе, па је $CE = \frac{CD}{2} = \frac{2x}{2} = x$. Дакле, $AB = 4CE$.



Сл. уз задатак 274



Сл. уз задатак 275


275. Како је $MB + BN = AB = a$, то је $MB = a - BN$. Следи да је $CN = BC - BN = a - BN = MB$ (слика). Троуглови ABD и BCD су једнакоstrанични, па је $AB = BC = CD = DA = BD = a$. Сада је јасно да су троуглови MBD и NCD подударни ($MB = NC$, $\angle MBD = \angle NCD = \varphi + 60^\circ$ и $BD = CD$). Из подударности следи да је $MD = ND$ и $\angle MDB = \angle NDC = \varphi$. Како је $\angle MDN = \angle MDB + \angle BDN = \varphi + 60^\circ - \varphi = 60^\circ$, то је троугао MND једнакоstrаничен.

276. Из услова (в) јасно је да Милан може бити 1, 2, 5 или 6. Милан није 1, јер би тада Јана била 2, што је у супротности са условом (а). Милан није ни 2, јер би тада Горан био 1, што је у супротности са условом (г). Милан није 6, јер би тада Зоран био 2, а Горан 1, што је опет у супротности са условом (г). Дакле, Милан је 5. Онда је Зоран 1, а Горан 2. Тада је Ана 3. (услов (г)), а Јана 4. (услов (б)) и Дане 6.


277. Бројеви $\underbrace{111\dots111}_{2000}$ и $\underbrace{222\dots222}_{1000}$ могу се написати као $999\dots999 : 9$, односно $2 \cdot 999\dots999 : 9$, па дати израз постаје $\frac{10^{2000} - 1}{9} - 2 \frac{10^{1000} - 1}{9} = \frac{10^{2000} - 1 - 2 \cdot 10^{1000} + 2}{9} = \left(\frac{10^{1000} - 1}{3}\right)^2$. Дакле, дати израз је квадрат броја $333\dots333$ (1 000 тројки).

278. Именилац дате једначине мора бити различит од нуле. Како је за $x \leq 0$, $x + |x| = 0$, то значи да је $x > 0$. Сада је јасно да су сва решења дате једначине $x_1 = 1$ и $x_2 = 2$.

279. Како је $AD = BD$, конструише се кружница са центром у тачки D , полупречника $AD = BD$ (слика). Како је $\angle ACB = 20^\circ$, а централни угао $\angle ADB = 40^\circ$, то и тачка C припада конструисаној кружници. Како је $\angle BDC = 80^\circ$, то је као периферијски угао над тетивом BC , $\angle CAB = 40^\circ$.



Сл. уз задатак 279



Сл. уз задатак 280


280. Ако се конструише паралелограм $ADCE$, онда је јасно да је троугао BCE правоугли, пошто су углови на основици комплементни. Тада је $EM^2 = 15^2 - 12^2 = 81 = 9^2$, па је $EM = 9\text{ cm}$. Сада је $BC^2 = (x + 9)^2 - 15^2 = x^2 + 12^2$. Решавањем једначине добија се $x = 16\text{ cm}$, а тада је крак $BC = 20\text{ cm}$. Обим трапеза је 88 cm , а површина 318 cm^2 .

281. Прво пређу отац и мајка и потроше 2 минута. Затим се за 1 минут отац врати и преда фењер сину који са баком предје мост за 10 минута. Мајка се са фењером врати (2 минута) и заједно са оцем (2 минута) коначно цела породица предје мост. Утрошено је $2 + 1 + 10 + 2 + 2 = 17$ минута.


282. Како је лева страна једнакости увек мања или једнака 2, а десна већа или једнака 2, једнакост важи само када су и лева и десна страна једнакости једнаке 2. Дакле $x = -1$ је једино решење једначине.

283. Из $\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \frac{b}{c} = \frac{a}{c} + \left(\frac{b}{c}\right)^2$ множењем са c^2 (јер је c природан број) добија се да је $a^2 + bc = ac + b^2$, тј. $a^2 - b^2 = c(a - b)$. Одавде је $(a - b)(a + b - c) = 0$. Дакле, једнакост важи увек када је $a = b$ или када је $a + b = c$.


284. Из једнакости површина квадрата и троугла добија се да је $EF = AC = 3a\sqrt{2}$ (слика). Нека је $HS = CS = GS = x$. Из сличности троуглова AEF и AGH је $3a : 2x = 3a : (3a - x)$, па је $x = a$. Странице делтоида $AHCG$ су $CH = 2a$ и $AH = a$, обим је $2a(2 + \sqrt{10})$, а површина $6a^2$.



Сл. уз задатак 284



Сл. уз задатақ 285



Сл. уз задатақ 286

285. Добијени пресек је шестоугао чије су три странице дужине $\sqrt{2}$ cm, а друге три дужине $2\sqrt{2}$ cm - шестоугао који представља једнакостранични троугао странице $4\sqrt{2}$ cm од кога су исечена три вршна једнакостранична троугла странице $\sqrt{2}$ cm (слика). Обим пресечног шестоугла је $9\sqrt{2}$ cm, а површина је $\frac{13\sqrt{3}}{2}$ cm².

286. Може, јер се једнакостранични троугао странице 30 см може поделити на 100 једнакостраничних троуглова странице 3 см, а једнакостранични троугао странице 3 см, на три трапеза чије су три странице 1 см, а једна 2 см (слика).

287. Из $x^2 + \frac{6}{y} = 10$ следи да је $\frac{6}{y} = 10 - x^2$. Као је x цео број, такав је и x^2 , па је и $10 - x^2$ цео број. Одавде следи да је и $\frac{6}{y}$ цео број, па је y делилац броја 6, односно $y \in \{1, -1, 2, -2, 3, -3, 6, -6\}$. Тада је $x^2 = 10 - \frac{6}{y} \in \{4, 16, 7, 13, 8, 12, 9, 11\}$, па у обзир долазе само бројеви 4, 16 и 9. Сва решења су дакле: $(x, y) \in \{(2, 1), (-2, 1), (4, -1), (-4, -1), (3, 6), (-3, 6)\}$.

288. Како је $0 < \frac{7m - 17n}{17 \cdot 7} < \frac{1}{100}$, тј. $0 < \frac{7m - 17n}{119} < \frac{1}{100}$, то је $7m - 17n = 1$, па је $m = 5$ и $n = 2$.

289. Анализа. Претпоставимо да је задатак решен (слика).

По услову задатка је $DF = FE$. Четвороугао $BDEC$ је трапез, па је FG његова средња линија, одакле следи да је $BG = GC$.

Конструкција. Конструишисмо праву која садржи тачку A и средиште дужи BC (тачку G). Тачкама B и C конструишисмо праве паралелне конструисаној правој.

Доказ. Следи из анализе.


Дискусија. Размотримо случајеве:

(1) A, B и C су неколинеарне тачке. Задатак има три решења.


(2) A, B и C су колинеарне тачке и

(а) $AB = BC$. Задатак је неодређен (има бесконачно много решења).

(б) $AB \neq BC$. Задатак нема решења.



Сл. уз задатак 289



Сл. уз задатак 290

290. Уочимо да је $\angle CDK = \angle AKD$ (углови са паралелним крацима), одакле следи, користећи услове задатка, да је $\angle CDK = \angle DKC$ (слика). Даље, троугао CDK је једнакокраки са основицом DK . Права p је средња линија трапеза $BCDK$, па је тачка M средиште дужи DK . Самим тим је $CM \perp DK$ (особина једнакокраког троугла). Даље је $KN \perp CD$, јер је $AB \parallel CD$. Одавде следи да је тачка N ортоцентар троугла CDK , па је DN трећа висина, која одговара страници CK , што потврђује да је $DN \perp CK$.

291. Инспектор најпре иде до краја улице OC ; ако је преступник у тој улици, он ће га ухватити, а ако није, он се враћа у O и зна да је преступник у једној од улица OA или OB . Сада он може ићи у улице OA или OB , али мора водити рачуна да преступник не умакне у OC . Он иде у улицу OA до тачке $2r$ (максималном брзином и стално се тако даље креће) и зна да ако је преступник у OA онда се налази између тачака $3r$ и $4r$ (иначе би га видео). Потом се враћа у O . За време одсуствовања инспектора из O , преступник није могао стићи у улицу OC даље од r јер се инспектор враћа у O пре него он стигне у r .


Вративши се у O , инспектор продужава, не задржавајући се, у улицу OB , и при том се може удаљити од O за $3r$. Ако је преступник у OB он ће га видети (ухватити), а ако није у OB , онда је у OA , па инспектор иде до краја OA .

292. 1) Ако је $p = 2$, онда је $4 - 2q^2 = 1$ што је немогуће, јер је лева страна ове једнакости парна, а десна непарна.


2) Ако је $p \geq 3$, онда постоји природан број k такав да је $p = 4k \pm 1$, па је $(4k \pm 1)^2 - 2q^2 = 1$, тј. $16k^2 \pm 8k + 1 - 2q^2 = 1$. Тада је $8k(2k \pm 1) = 2q^2$ тј. $4k(2k \pm 1) = q^2$, што значи да је q паран прост број, тј. $q = 2$. Одавде следи да је $p^2 - 8 = 1$, тј. $p^2 = 9$, па је $(p, q) = (3, 2)$ једино решење.

293. Из услова задатка следи да је $(1+ab)^2 < (a+b)^2$, тј. $1+2ab+a^2b^2 < a^2+2ab+b^2$, тј. $1-a^2-b^2(1-a^2) < 0$, тј. $(1-a^2)(1-b^2) < 0$. Одавде следи да је $(1-a^2) < 0$ и $(1-b^2) > 0$ или $(1-a^2) > 0$ и $(1-b^2) < 0$, тј. $a^2 > 1$ и $b^2 < 1$ или $a^2 < 1$ и $b^2 > 1$. Дакле, $|a| > 1$ и $|b| < 1$ или $|a| < 1$ и $|b| > 1$.

294. Нека је $P_{\triangle ABE} = mP_1$ (слика). Тада је $P_{\triangle BDE} = nP_1$. Ако је $P_{\triangle AEF} = mP_2$, онда је $P_{\triangle DEF} = nP_2$. Тада је $P_{\triangle BDF} = P_{\triangle BDE} + P_{\triangle DEF} = nP_1 + nP_2 = n(P_1 + P_2)$. Како је $P_{\triangle CDF} = P_{\triangle BDF} = n(P_1 + P_2)$, то је $P_{\triangle BCF} = n(P_1 + P_2) + n(P_1 + P_2) = 2n(P_1 + P_2)$. Слично је, $P_{\triangle ABF} = mP_1 + mP_2 = m(P_1 + P_2)$, па је $P_{\triangle ABF} : P_{\triangle BCF} = m : 2n$.



Сл. уз задатак 294



Сл. уз задатак 295

295. Из услова задатка следи да права p полови странице BC и AC троугла ABC , при чему су M и N средишта ових страница (слика). Троугао ANT је једнакокрак, јер је $\angle ATN = \angle BAT$ (углови са паралелним крацима) и $\angle NAT = \angle BAT$. Одавде следи да је $NT = AN = CN$, па је N је центар круга описаног око троугла ACT . Дакле, $\angle ATC = 90^\circ$, као угао над пречником. Слично се доказује да је $\angle MSO = \angle MBS$ и $\angle BSC = 90^\circ$, где је S пресек праве p и праве BO .

Због правих углова са теменима S и T , следи да кружница чији је пречник CO садржи тачке S и T . Тада је $\angle OCT = \angle OST$ (углови над истим луком), тј. $\angle OCT = \frac{1}{2}\angle ABC$, одакле следи тражени закључак.

296. Нека тачке M и N редом имају координате (X_1, Y_1) и (X_2, Y_2) . Тада се могу разликовати три случаја:

а) Дуж AB има празан пресек са унутрашњошћу правоугаоника, чија су наспрамна темена M и N . У овом случају најкраћи пут има дужину $|X_2 - X_1| + |Y_2 - Y_1|$, која се може постићи сваком комбинацијом хоризонталних и вертикалних потеза, усмерених од M ка N .

б) Претходно утврђена дужина је најмања могућа и у случају када су дужи AB и MN „супротно нагнуте“, кад једна од њих заклапа са позитивним смером X -осе угао из интервала $(0^\circ, 90^\circ)$, а друга угао из интервала $(90^\circ, 180^\circ)$. У том случају „коса пречица“ AB не може да се искористи за скраћење пута између M и N .


в) Уколико дуж AB има непразан пресек са унутрашњошћу правоугаоника, а дужи AB и MN су нагнуте на исту страну, онда се пречица AB може искористити за скраћење пута између M и N .

Нека је CDE правоугли троугао чије су катете CE и DE паралелне координатним осама, а чија је хипотенуза CD пресек дужи AB са правоугаоником. Најкраћу дужину имају само они путеви од T_1 до T_2 који, поред хоризонталних и вертикалних делова садрже дуж CD . Дужина тог пута је $|X_2 - X_1| + |Y_2 - Y_1| - CE - DE + CD$.


297. Нека су p, q и r три проста броја која тражимо. Дат је услов: $pqr = 7(p+q+r)$. Десна страна једнакости је делива са 7, па како су p, q, r прости бројеви, то један од њих мора бити број 7. Нека је $r = 7$. Дати услов постаје $pq = p+q+7$, одакле је $pq - p - q + 1 = 8$, односно $(p-1)(q-1) = 8$. Ово је могуће ако је $p-1 = 1, q-1 = 8$, или $p-1 = 2, q-1 = 4$, или $p-1 = 4, q-1 = 2$, или $p-1 = 8, q-1 = 1$. Одговарајућа решења су $p = 3, q = 5$, или $p = 5, q = 3$. Остале случајеве не узимамо у обзир јер 9 није прост број. Дакле, тражени бројеви су: 3, 5 и 7.

298. Како је $1! \cdot 2! \cdot 3! \cdots 98! \cdot 99! \cdot 100! = (1) \cdot (1 \cdot 2) \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3) \cdots (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 98) \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 98 \cdot 99) \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 98 \cdot 99 \cdot 100) = 1^{100} \cdot 2^{99} \cdot 3^{98} \cdot 4^{97} \cdots 98^3 \cdot 99^2 \cdot 100 = (2^{98} \cdot 3^{98} \cdot 4^{96} \cdots 98^2 \cdot 99^2) \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 98 \cdot 100 = (2^{49} \cdot 3^{49} \cdot 4^{48} \cdots 98 \cdot 99)^2 \cdot 2^{50} \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 49 \cdot 50) = (2^{74} \cdot 3^{49} \cdot 4^{48} \cdots 98 \cdot 99)^2 \cdot 50!$, то треба изоставити 50!.


299. Нека су M и N темена многоугла, тако да трака одређена правим m и n , које су паралелне страницима AD и BC покрива цео многоугао (слика). Нека је a_i једна страница „доње“ изломљене линије датог многоугла између тачака M и N и x_i и y_i нормалне пројекције дужи a_i на странице AB и AD . Нека је, даље, a_j једна страница „горње“ изломљене линије MN и z_j и t_j нормалне пројекције дужи a_j на странице BC и CD . Из осенчених правоуглих троуглова је $a_i^2 = x_i^2 + y_i^2$ и $a_j^2 = z_j^2 + t_j^2$. Узимајући у обзир све странице многоугла добија се једнакост $\sum a_i^2 = \sum x_i^2 + \sum y_i^2 + \sum z_j^2 + \sum t_j^2$. Будући да су све дужи x_i, y_i, z_j, t_j мање од 1, то је: $x_i^2 < x_i, y_i^2 < y_i, z_j^2 < z_j, t_j^2 < t_j$, па је: $\sum a_i^2 < \sum x_i + \sum y_i + \sum z_j + \sum t_j = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$. ($\sum x_i < AB = 1$, итд.).



Сл. уз задатак 299



Сл. уз задатак 300



Сл. уз задатак 304

300. Како је, по услову задатка, $\angle ACD = \angle ABC$ и $\angle CAD = \angle CAB$, то је троугао ACD сличан троуглу ABC , па је $\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AD}$. Како је (по услову задатака) $AC = BD$, то одавде следи да је $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{AD}$ (слика). Даље, како је AE симетрала $\angle BAC$, то је $\frac{BE}{EC} = \frac{AB}{AC}$. Користећи претходну једнакост, одавде следи да је $\frac{BE}{EC} = \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{AD}$. На крају, применом Талесове теореме, добија се да је $ED \parallel AC$, што је и требало доказати.

301. Означимо са n број камиона. Очигледно је да је $n \geq 4$, јер ако је $n \leq 3$, тада би се могло превести највише $3 \cdot 3 = 9t$. Случај $n = 4$ је немогућ. Наиме, нека је $n = 4$ и нека постоји, на пример, 13 сандука једнаке масе, тј. $m_1 = m_2 = \cdots = m_{13} = \frac{10}{13}t$. Тада се роба не може превести, јер ће по Дирихлеовом принципу у једном камиону бити 4 сандука ($13 = 3 \cdot 4 + 1$), а тај камион би онда имао масу $4 \cdot \frac{10}{13} = \frac{40}{13} > 3t$. Ако је $n = 5$,

онда се на сваки камион може натоварити маса која је већа од $2t$ а мања од $3t$, па је 5 камиона довољно.

302. Дата једнакост је еквивалентна следећим једнакостима:

$$x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 + (x+y)^3 + 30xy - 3x^2y - 3xy^2 = 2000, 2[(x+y)^3 - 1000] - 3xy(x+y-10) = 0, 2(x+y-10)[(x+y)^2 + 10(x+y) + 100] - 3xy(x+y-10) = 0, (x+y-10)(2x^2 + 2y^2 + 20x + 20y + xy + 200) = 0, (x+y-10)[(x+10)^2 + (y+10)^2 + (x+\frac{y}{2})^2 + \frac{3}{4}y^2] = 0.$$

Како је $(x+10)^2 + (y+10)^2 + (x+\frac{y}{2})^2 + \frac{3}{4}y^2 > 0$, (не могу сви сабирци истовремено бити једнаки 0), то је $x+y-10 = 0$.

303. Нека је $n^2 + 3^n = m^2$, $m \in Z$. Тада је $m^2 - n^2 = 3^n$, тј. $(m+n)(m-n) = 3^n$, па можемо разликовати следеће случајеве:

(1) $m+n = 3^n$, $m-n = 1$, одакле је $3^n = 2n+1$. За $n=1$ је то тачно, а индукцијом се показује да је $3^n > 2n+1$ за $n \geq 2$.

(2) $m+n = 3^{n-1}$, $m-n = 3$, одакле је $3^{n-1} = 2n+3$. Провера за $n \in \{1, 2, 3\}$ даје решење $n=3$, а индукцијом се показује да је $3^{n-1} > 2n+3$ за $n \geq 4$.

(3) $m+n = 3^{n-k}$, $m-n = 3^k$ и $2 \leq k < n-k$, тј. $n > 2k$, тј. $n-2k \geq 1$. Одавде је $2n = 3^{n-k} - 3^k$. Покажимо да је ово немогуће. Важи $3^{n-k} - 3^k > 3^{n-k} - 3^{n/2} = 3^{n/2}(3^{(n/2)-k} - 1)$. Како је $n \geq 4$, то је $3^{(n/2)-k} - 1 > 1$ и $3^{n/2}(3^{(n/2)-k} - 1) > 3^{n/2}$, а индукцијом се показује да је $3^{n/2} > 2n$ за $n \geq 4$, па нема више природних бројева n који задовољавају дату једнакост.

Сва решења задатка су $(m, n) \in \{(2, 1), (6, 3)\}$.

304. Нека је $EQ \cap FP = \{D\}$ и $EP \cap FQ = \{K\}$ и нека је O_1 центар датог полукруга (слика). Уведимо ознаке: $\angle PEF = x$, $\angle QFE = y$. Како је $\angle EQF = \angle EPF = 90^\circ$, као углови над пречником EF , то је четвороугао $DQKP$ тетиван. Нека је O центар круга описаног око четвороугла $DQKP$. Тада је $DO = OK$, $O \in DK$, $\angle QOP = 2\angle QDP$ (централни и периферијски), тј. $\angle QOP = 2(\angle QDK + \angle KDP)$.

Како је тачка K ортоцентар троугла EFD , то је $\angle QDK = \angle EFQ = y$, $\angle KDP = \angle PEF = x$ (углови са нормалним крацима), па је $\angle QOP = 2(x+y)$. Даље, четвороугао AQO_1P је такође тетиван, јер је $O_1P \perp AC$ и $O_1Q \perp AB$ (AC и AB су тангенте). Одавде следи да је $\angle QAP = 180^\circ - \angle QO_1P = 180^\circ - (180^\circ - \angle EO_1Q - \angle FO_1P) = \angle EO_1Q + \angle FO_1P = 2(\angle EFQ + \angle FEP) = 2(x+y)$. Како је $QA = AP$ (тангентне дужи из исте тачке A) и $\angle QAP = \angle QOP = 2(x+y)$, то се тачке O и A поклапају, па како $A \in DK$ и $DK \perp EF$, што је и требало доказати.

305. Означимо са m број дечака, са v број девојчица и са x број победа девојчица против дечака. Тада је: $m = 2v$, број победа дечака против девојчица је $2v^2 - x$ и

$$\frac{\frac{v \cdot (v-1)}{2} + x}{\frac{2v \cdot (2v-1)}{2} + 2v^2 - x} = \frac{7}{5}. \text{ Одавде следи } \left(\frac{v^2 - v}{2} + x\right) \cdot 5 = 7 \cdot \left(\frac{4v^2 - 2v}{2}\right) + 14v^2 - 7x,$$

тј. $\frac{5}{2}v^2 - \frac{5}{2}v + 5x = \frac{28v^2}{2} - 7v + 14v^2 - 7x$. Сређивањем последњег израза добија се $8x = 17v^2 - 3v$, тј. $8x = 16v^2 + v^2 - 3v$. Из $2v^2 - x \geq 0$, тј. $x \leq 2v^2$ следи $v \geq 1$, а из и $v^2 - 3v \leq 0$, тј. $v(v-3) \leq 0$ следи $v \leq 3$, па је $1 \leq v \leq 3$, одакле се провером закључује да је $v = 3$ и $m = 9$.

2001. година

306. Обим баште је $2 \cdot (46 \text{ m} + 54 \text{ m}) = 200 \text{ m}$. Потребно је 200 m жице и $200 : 2 = 100$ стубова.

307. Површина школског дворишта је већа за 1575 m^2 , јер је $3975 \text{ m}^2 - 24 \text{ a} = 3975 \text{ m}^2 - 2400 \text{ m}^2 = 1575 \text{ m}^2$.

308. (а) Други сабирац треба смањити за $222 - 150 = 72$. (б) Други сабирац треба смањити за $222 + 50 = 272$.

309. $1001 - 998 = 3$.

310. Најмањи је 1111268, а највећи 8621111.

311. Тачна су тврђења: $1 \in P$, $\{3, 2\} \in P$, $\{\{2, 3\}\} \subset P$, $3 \in P$.

312. Дужи има $4 + 3 + 2 + 1 = 10$. С обзиром да две тачке одређују дуж преостале три тачке одређују троугао, па троуглова има такође 10.

313. Већи је угао β за $\beta - \alpha = 2001' - 20^\circ 1' = 2001' - 1201' = 800' = 13^\circ 21'$.


314. С обзиром да се 3 садржи у 2001, а 4 у 2000, то је $2000 \cdot 2001$ дељиво са 12. Како 13 није дељиво са 12 то број $\overline{16x}$ мора бити дељив са 12. Дакле, са 3 и са 4, па је x цифра 0 или 4 или 8. Како $1 + 6 + 0$ и $1 + 6 + 4$ нису дељиви са 3, а $1 + 6 + 8$ јесте, то је тражена цифра $x = 8$.

315. С обзиром да је $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ то су тражени бројеви 3, 4 и 5.

316. $| -8 \cdot 3 - (-(-3)) | = | -27 | = 27$.

317. Нека топола треба да нарасте за x метара. Тада је $9\frac{3}{4} + x = 11.2 + 2\frac{1}{2}$, односно $x = 11.2 + 2.5 - 9.75 = 3.95$, па топола треба да нарасте за 3.95 m.

318. Нека је a страница једнакостраничног троугла ABC (слика). Како је $AA_1 = BB_1 = CC_1 = x$, $BA_1 = CB_1 = AC_1 = a - x$ и $\angle C_1AA_1 = \angle A_1BB_1 = \angle B_1CC_1 = 60^\circ$, то су троуглови C_1AA_1 , A_1BB_1 и B_1CC_1 подударни, одакле следи да су све странице троугла $A_1B_1C_1$ једнаке.




Сл. уз задатак 318

319. Бројеви 3 и 29 су узајамно прости, па $\overline{20ab}$ треба да буде дељив са 87. Како су $87 \cdot 23 = 2001$ и $87 \cdot 24 = 2088$ једини бројеви облика $\overline{20ab}$ дељиви са 87, како је 2088 дељив са 6, а 2001 није, то је $a = 0$, $b = 1$.

320. Нека је број планираних ученика x . Тада је број пријављених ученика $\frac{11}{9}x$, а на зимовање је отишло $\frac{8}{11} \cdot \frac{11}{9}x = \frac{8}{9}x$ ученика. Решење једначине $x - 8 = \frac{8}{9}x$ је $x = 72$. Дакле, број планираних ученика је 72, а на зимовање је отишло 64 ученика.


321. Конструише се дуж једнака $\sqrt{3} = \sqrt{2^2 - 1^2}$ као катета правоуглог троугла чија је хипотенуза 2, а друга катета 1 (слика). Затим се на бројевној правој од тачака 3 и -3 нанесе у позитивном смеру дуж једнака $\sqrt{3}$.




Сл. уз задатак 321

322. Како је $21^{12} = 3^{12} \cdot 7^{12}$, а $54^4 = 2^4 \cdot 27^4 = 2^4 \cdot 3^{12}$ и како је $7^{12} > 2^4$, то је и $21^{12} > 54^4$.


323. Нека је $ABCD$ правоугаоник, ABE једнакостранични троугао, F и G пресеци дужи BE и AE са CD и нека је H нормална пројекција тачке F на AB (слика). Тада је $FB = 2\sqrt{3}$ см као страна једнакостраничног троугла висине 3 см, а дуж $FG = (6 - 2\sqrt{3})$ см. Обим трапеза $ABFG$ је $O = (12 + 2\sqrt{3})$ см, а површина је $P = (18 - 3\sqrt{3})$ см².



Сл. уз задатак 323



Сл. уз задатак 325



Сл. уз задатак 329

324. Како је $\sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} + 3 = |1 - \sqrt{2}| + 3 = \sqrt{2} - 1 + 3 = \sqrt{2} + 2$, то је $a = 1$ и $b = 2$.

325. Нека су AB и AD редом основица и висина једнакокраког троугла ABC (слика). Троугао ACD је једнакокрако-правоугли. Користећи Питагорину теорему добија се: $AD = 3\sqrt{2}$ см, а површина троугла је $9\sqrt{2}$ см².

326. Нека у другом цаку има x килограма шећера. Тада у првом има $\frac{4}{5}x$, а у трећем $\frac{42.5}{100} \cdot \frac{4}{5}x$ килограма. Решење једначине $x + \frac{4}{5} + \frac{42.5}{100} \cdot \frac{4}{5}x = 64.2$ је $x = 30$, па у првом цаку има 24 kg шећера.

327. Распоред дечака и девојчица може бити: МЖМЖМЖ или ЖМЖМЖМ. У сваком од ова два случаја дечаци и девојчице могу сести на по $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ начина, па је број тражених начина $2 \cdot 6 \cdot 6 = 72$.

328. Троуглови CDB и ADC имају једнаке углове (углови са нормалним крацима) и зато су слични. Зато је $CD : BD = AD : CD$, одакле је $CD^2 = AD \cdot BD$.

329. Дијагонала AC основе $ABCD$ квадра је $AC = 25$ см (слика). Ивица CC_1 је висина једнакостраничног троугла странице $2AC$ и зато је $CC_1 = 2AC \frac{\sqrt{3}}{2}$, тј. $CC_1 = 25\sqrt{3}$ см. Дакле, $V = 4200\sqrt{3}$ см³ и $P = (336 + 1550\sqrt{3})$ см².


330. Нека су a и b странице правоугаоника (слика). Полукругови над њима имају полупречнике једнаке $\frac{a}{2}$ и $\frac{b}{2}$, а полупречник описаног круга око правоугаоника је

$\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$. Збир површина полумесеца је једнак збиру површина полуокруглова и површине правоугаоника умањеним за површину круга описаног око правоугаоника $P = \left(\frac{a}{2}\right)^2 \pi + \left(\frac{b}{2}\right)^2 \pi + ab - \frac{1}{4} (\sqrt{a^2 + b^2})^2 \pi = ab$.


331. Умањеник треба смањити за $4567 - 1234 = 3333$.

332. Нека је у трећем павиљону било x излетника. Тада је у првом било $x+12$, у другом $x-14$, а у четвртом x излетника. То је укупно $4x-2$ излетника, па је $4x-2=430$ или $4x=432$. Дакле, $x=108$. Према томе, у првом павиљону је било 120 излетника, у другом 94, а у трећем и четвртом 108 излетника.

333. То је 11 делова (видети слику).



Сл. уз задатак 330



Сл. уз задатак 333

18	11	16
13	15	17
14	19	12

Сл. уз задатак 335

334. $5 \cdot (4 + 26) : 2 + 1926 = 2001$.


335. Решење је дато на слици.

336. Како је $M = \{M, A, T, E, I, K\}$, $T = \{T, A, K, M, I, E, H\}$, то је $M \cap T = \{M, A, T, E, I, K\} = M$. Скуп M има $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ двочланих подскупова.


337. Како је $\frac{2}{29} = \frac{2 \cdot 69}{29 \cdot 69} = \frac{138}{2001} < \frac{5x}{2001} < \frac{3}{23} = \frac{3 \cdot 87}{23 \cdot 87} = \frac{261}{2001}$, то је $138 < 5x < 261$, па је $5x \in \{140, 145, 150, \dots, 255, 260\}$. Тада је $x \in \{28, 29, 30, \dots, 51, 52\}$. Дакле, $52 - 27 = 25$ природних бројева испуњава услове.

338. Бројеви $2p$ и 100 су делијиви са 2 , па и број $3q$ мора бити делијив са 2 . Дакле, $q = 2$, па је $2p = 94$ и $p = 47$. С обзиром да је 2 једини паран прост број, то је $p = 47$, $q = 2$ једино решење.

339. Како је $\angle BAC = 46^\circ$, то је и $\angle ACn = 46^\circ$, јер су то углови са паралелним крацима (слика). Како је $\angle BCn = 38^\circ$, то је $\angle ACB = 180^\circ - (46^\circ + 38^\circ)$, па је $\angle ACB = 96^\circ$.



Сл. уз задатак 339



Сл. уз задатак 344

340. Трећина чоколада кошта 80 динара, па све коштају 240 динара. Дакле, једна чоколада кошта $240 : 8 = 30$ динара. Марија је уложила $3 \cdot 30 = 90$ динара, а Петар

$5 \cdot 30 = 150$ динара, па је Марија узела $90 - 80 = 10$ динара, а Петар $150 - 80 = 70$ динара.

341. Претпоставимо да сваком од дечака припадне различит број кликера. Ако пођемо од могућности: $0 + 1 + \dots + 16 + 17 = 18 \cdot 17 : 2 = 9 \cdot 17 = 153$, видимо да ова варијанта захтева више од 150 кликера, што значи да би свака друга варијанта, где би најмањи број кликера био већи од нуле, тим пре била немогућа.

342. На познат начин конструишемо угао од 60° , који са датим има заједничко теме и крак, а други крак му је са исте стране где и други крак угла од 19° . Узастопном деобом угла од 60° добијамо угао од 15° . Разлику до 19° узастопно поделимо на пола и тако добијамо дужину лука који одговара углу од 2° односно 1° . На крају, овај лук наносимо на лук угла од 19° , истог полупречника. Напомена: Могуће је и друго решење: ако се угао од 19° нанесе 19 пута добија се угао од 361° који је за један степен већи од пуног угла. Потом се онда тим углом од 1° може извршити подела угла од 19° .

343. Како вредност израза треба да је већа од 0 и мања од 1, то израз $3x - 6$ треба да је већи од 0 и мањи од 9. Лако се израчунава да је $x \in \{3, 4\}$.

344. Нека је ABC троугао са угловима од 30° и 15° редом код темена B и C (слика). Како је троугао ACD правоугли, то је центар описане кружнице E на средини хипотенузе CD , дакле $CE = ED = AE$. Како је $\triangle CAE$ једнакокрак, јер је $CE = AE$, то је $\angle CAE = 15^\circ$, а $\angle AED = 30^\circ$, као спољашњи угао тог троугла. У $\triangle AEB$ је $AE = AB$, одакле следи да је $CE = ED = EA = AB$, па је $CD = 2AB$.

345. Ако се крене од краја, након сусрета са Јеленом, Ђорђе је остао без чоколаде. Јелени је дао половину свих које је имао у цепу и још пола од једне: $x - (\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}) = 0$. Следи да је $x = 1$. Из овога се јасно види да је након сусрета са Баном имао једну чоколаду. Ако број чоколада који је имао пре сусрета са Баном обележимо са y онда је $y - (\frac{1}{2}y + \frac{1}{2}) = 1$. Дакле, $y = 3$, па је након сусрета са Аном, Ђорђу преостало 3 чоколаде.

Ако је укупан број чоколада које је купио Ђорђе био n , сада је јасно $n - (\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}) = 3$. Следи да је $n = 7$.

346. Уврштавањем броја m у дати израз добија се да је вредност датог израза једнака $33/2$.

347. Нека је $a = 3$ см страница квадрата K , а a_1 страница квадрата K_1 . Како је $P = \frac{3}{4}P_1$, то је $a^2 = \frac{3}{4}a_1^2$. Одавде је $9 \text{ cm}^2 = \frac{3}{4}a_1^2$, па је $a_1 = 2\sqrt{3}$ см. Конструкцију броја $\sqrt{3}$ (видети задатак 321) лако изводимо након чега је конструкција квадрата једноставна.

348. Нека је $a = -\frac{666}{667} = -\left(\frac{667-1}{667}\right) = -1 + \frac{1}{667}$, $b = -\frac{1333}{1334} = -\left(\frac{1334-1}{1334}\right) = -1 + \frac{1}{1334}$ и $c = -\frac{1998}{2001} = -\left(\frac{2001-3}{2001}\right) = -1 + \frac{3}{2001} = -1 + \frac{1}{667}$. Следи да је $a = c > b$.

349. Први број је 40, а нека је други број x . Тада је трећи број $40 - x$; четврти број $x - 40 + x = 2x - 40$; пети број $80 - 3x$; шести број $5x - 120$; седми број $200 - 8x$; осми број $13x - 320$ и девети број $520 - 21x$. Дакле, $520 - 21x = 100$ или $21x = 420$, па је $x = 20$. Дакле, чланови низа су $40, 20, 20, 0, 20, -20, 40, -60, 100$.


350. Како је због односа углова у ромбу и из особине да су суседни углови суплементни $\alpha + 3\alpha = 180^\circ$, то је $4\alpha = 180^\circ$, па је угао $\alpha = 45^\circ$. Ако са h обележимо висину ромба, тада је страница ромба $a = h\sqrt{2}$. Како је $P = \sqrt{8} \text{ cm}^2$ и $P = ah$, то следи да је $\sqrt{8} \text{ cm}^2 = h\sqrt{2} \cdot h$, па је $h = \sqrt{2}$ см. Тада је $a = 2$ см, па је обим ромба $O = 8$ см.

351. Да би се решила дата једначина морају се претходно размотрити карактеристични интервали: $x < 0$; $0 \leq x < 1$ и $1 \leq x$. У првом интервалу једначина је $x - (x - 1) = 2 + x$, па је $x = -1$ и решење припада интервалу. У интервалу $[0, 1)$ једначина постаје $x - (x - 1) = 2 - x$ и решење $x = 1$ очгледно не припада посматраном интервалу. Коначно, у интервалу $[1, \infty)$ једначина је $x + (x - 1) = 2 - x$ и решење $x = 1$ припада интервалу. Дакле, решења дате једначине су $x_1 = -1$ и $x_2 = 1$. Коначно, производ квадрата разлике решења и збира квадрата решења је: $(-1 - 1)^2(1 + 1) = 8$.


352. Дата неједначина $\frac{\frac{2}{3} - 3x}{-x + \frac{1}{2}} > 1$ еквивалентна је са неједначином $\frac{-12x + 1}{3(-2x + 1)} > 0$.

Следи да је $(-12x + 1 > 0 \text{ и } -2x + 1 > 0)$ или $(-12x + 1 < 0 \text{ и } -2x + 1 < 0)$. Тражене вредности променљиве x су: $x < \frac{1}{12}$ или $x > \frac{1}{2}$.

353. Како је периферијски угао једнак одговарајућем углу између тангенте и тетиве истог круга, то је $\angle MAB = \angle NMB$ и $\angle NAB = \angle MNB$ (слика). Тада је $\angle MAN + \angle MBN = \angle MAB + \angle NAB + \angle MBN = \angle NMB + \angle MNB + \angle MBN = 180^\circ$, јер су то углови троугла MBN .




Сл. уз задатак 353




Сл. уз задатак 354

354. Нека је $ABCD$ дати трапез и нека је тражена дуж $PQ = x$ (слика). Нека је h_1 висина трапеза $ABQP$, а h_2 висина трапеза $PQCD$. Нека права која садржи Q и која је паралелна са AD сече праве AB и CD редом у тачкама E и F . По услову задатка је $P_{ABQP} = P_{PQCD}$. Добија се да је $\frac{a+x}{2}h_1 = \frac{b+x}{2}h_2$. Одавде је $\frac{a+x}{b+x} = \frac{h_2}{h_1}$. Како је троугао EBQ сличан са троуглом FCQ , то је $\frac{a-x}{x-b} = \frac{h_1}{h_2}$ или $\frac{h_2}{h_1} = \frac{x-b}{a-x}$. Даље је $\frac{a+x}{b+x} = \frac{x-b}{a-x}$, па је $x = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$.



Сл. уз задатак 355




355. Нека је пресек којке $ABCDA_1B_1C_1D_1$ са датом равни једнакокраки трапез BC_1NM , где су N и M редом средишта ивица A_1D_1 и A_1A (слика). Основице трапеза су $BC_1 = a\sqrt{2}$ и $MN = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, а краци су $BM = C_1N$. Како је $BM^2 = AB^2 + AM^2$, то

је $BM^2 = a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{5a^2}{4}$. За висину h трапеза BC_1NM важи $h^2 = BM^2 - BP^2$, где је $BP = \frac{BC_1 - MN}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{4}$ (слика). Како је $h^2 = \frac{5a^2}{4} - \frac{2a^2}{16} = \frac{3a^2}{8}$, то је $h = \frac{3a}{2\sqrt{2}}$. Површина траженог пресека је $P_{BC_1NM} = \frac{BC_1 + MN}{2} \cdot h$. Одавде је


$$P_{BC_1NM} = \frac{a\sqrt{2} + \frac{a\sqrt{2}}{2}}{2} \cdot \frac{3a}{2\sqrt{2}} = \frac{3a\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{3a}{2\sqrt{2}} = \frac{9a^2}{8}.$$

356. За нумерацију једноцифрених парних страница употребе се 4 цифре. За 45 парних двоцифрених страница употреби се $45 \cdot 2 = 90$ цифара. За 100, 102, 104, 106, 108 и 110 страницу употреби се $6 \cdot 3 = 18$ цифара. Дакле, укупно је потребно $4 + 90 + 18 = 112$ цифара.

357. Нека је страница добијеног квадрата x (слика). Тада су странице правоугаоника $x + 5$ и $x - 4$. Користећи услове задатка, следи да су површине правоугаоника A и B једнаке, па је $5(x - 4) = 4x$. Дакле, $5x - 20 = 4x$, па је $x = 20$, тј. страница квадрата је 20 cm, а странице правоугаоника су 25 cm и 16 cm. Обим правоугаоника је 82 cm и за 2 cm је већи од обима квадрата.



Сл. уз задатак 357



Сл. уз задатак 363

358. Најмањи је онај број који има најмање цифара, па је тражени број седмоцифрен (ако би био шестоцифрен, збир његових цифара био би највише $6 \cdot 9 = 54$). Дакле, тражени број је 7999998.

359. Ако у једној тони морске воде има 35 kg соли, онда у 1 kg морске воде има $35000 \text{ g} : 1000 = 35 \text{ g}$. Тада у $1000 \text{ g} : 5 = 200 \text{ g}$ морске воде има $35 \text{ g} : 5 = 7 \text{ g}$ соли. Ако 1000 kg обичне воде садржи 40 g соли, онда $1000 \text{ kg} : 40 = 25 \text{ kg}$ воде садржи 1 g соли. Дакле, за 7 g соли потребно је $7 \cdot 25 \text{ kg} = 175 \text{ kg}$ обичне воде.

360. Како је $2001 = 3 \cdot 667 = 3 \cdot 23 \cdot 29$ то су могућа следећа решења: $61 \cdot 1 \cdot 69 = 23 \cdot 3 \cdot 29 = 2001$.

361. Тражени број је дељив са 15, дакле мора бити дељив и са 3 и са 5. Најмањи је онај природан број који има најмање цифара, при чему је последња цифра тог броја 0 или 5 (због дељивости са 5). Ако је последња цифра 0, онда је најмањи могући такав број 690. Ако је последња цифра 5, онда је најмањи такав број 195. Дакле, тражени број је 195.

362. Ако се преосталом делу од 1,5 m „врати“ 0,5 m добија се 2 m што је половина мањег дела. Дакле, мањи део је 4 m. Ако вратимо још 0,5 m, онда је половина канапа 4,5 m, па је цео канап дужине 9 m.

363. Тачка D_1 припада дужи AB и $AD = AD_1 = 4 \text{ cm}$ (слика). Како је $AB = AD_1 + D_1B = 4 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$, тражени обим правоугаоника је $2 \cdot (11 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) = 30 \text{ cm}$.


364. Како је $14 = 2 \cdot 7$, то постоје само две могућности: офорбане су две стране коцке и то оне две које имају заједничку ивицу или су офорбане три стране коцке које немају

заједничко теме. У првом случају свих 14 коцкица су наређане једна на другу, а у другом случају је два пута по 7 коцкица наређано једна на другу. Дакле, у првом случају је $a = 14\text{ cm}$, а у другом је $a = 7\text{ cm}$. Ако је $a = 14\text{ cm}$, онда је број неофарбаних коцкица $14 \cdot 14 \cdot 14 - 14 \cdot 14 - 14 \cdot 13 = 2366$ коцкица. Ако је $a = 7\text{ cm}$, онда је број неофарбаних коцкица $7 \cdot 7 \cdot 7 - 2 \cdot 7 \cdot 7 - 5 \cdot 7 = 210$.


365. Нека је број девојчица x . Прва од њих познаје 7, друга $7 + 1 = 8$, трећа $7 + 2 = 9$, последња $7 + (x - 1)$ дечака. Дакле, укупан број девојчица и дечака је $x + 7 + (x - 1) = 20$. Значи да је $2x + 6 = 20$, па је $x = 7$. Дакле, девојчица је 7, а дечака 13.

366. Следи да је $||x| - 1| = 2000$. Према томе, или је $|x| - 1 = 2000$, или је $|x| - 1 = -2000$. Дакле, или је $|x| = 2001$ или је $|x| = -1999$ (ово је немогуће). Тражена решења су 2001 или -2001.

367. Троуглови ABD и ACE су подударни ($AD = AC$, $\angle DAB = 90^\circ + \alpha = \angle EAC$ и $AB = AE$) (слика). Из подударности следи да је $BD = CE$.



Сл. уз задатак 367



Сл. уз задатак 369

368. Како је број $\overline{63b1}$ непаран, то он не може бити дељив ни са 2 ни са 4. Према томе, производ $\overline{54a} \cdot \overline{63b1}$ је дељив са $12 = 3 \cdot 4$ ако је број $\overline{54a}$ дељив са 12 или ако је дељив са 4, а број $\overline{63b1}$ дељив са 3. Број $\overline{54a}$ је дељив са 12, ако је $a = 0$. Број $\overline{54a}$ је дељив са 4 ако је $a \in \{0, 4, 8\}$, а број $\overline{63b1}$ је дељив са 3, ако је $b \in \{2, 5, 8\}$. Према томе, задатак има 16 решења: $(a, b) \in \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), \dots, (0, 9), (4, 2), (4, 5), (4, 8), (8, 2), (8, 5), (8, 8)\}$.

369. Како је $AM = MB$ и $BN = NC$, то је MN средња линија троугла ABC (слика). Слично је и PQ средња линија троугла ADC . Следи да је MN једнако и паралелно са PQ . Такође је NP средња линија троугла BCD , а QM средња линија троугла ABD , па је NP једнако и паралелно са MQ . Из добијене једнакости и паралелности јасно је да је четвороугао $MNPQ$ паралелограм.


370. Нека је човек рођен $\overline{19xy}$ године. Он сада има $2001 - \overline{19xy}$ година, па је $2001 - \overline{19xy} = 1 + 9 + x + y$. Дакле, $2001 - 1000 - 900 - 10x - y = 10 + x + y$. Следи да је $91 = 11x + 2y$, па је x непаран број. Како је $2y \leqslant 18$, то је $73 \leqslant 11x \leqslant 91$. Следи да је $x \in \{7, 8\}$, дакле $x = 7$, па је и $y = 7$. Човек је рођен 1977 године.

371. Како је $9 - 4\sqrt{5} = (2 - \sqrt{5})^2$ то је $A = \sqrt{(\sqrt{5} - 3)^2} + \sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = |\sqrt{5} - 3| + \sqrt{(\sqrt{5} - 2)^2} = 3 - \sqrt{5} + \sqrt{5} - 2 = 1$, па је алгебарска вредност датог израза рационалан број.


372. Збир цифара 10 имају следеће четвороцифрене комбинације са различитим цифрама: $0 + 1 + 2 + 7 = 0 + 1 + 3 + 6 = 0 + 1 + 4 + 5 = 0 + 2 + 3 + 5 = 1 + 2 + 3 + 4$. Прва, друга, трећа и четврта комбинација имају по $3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 18$ четвороцифрених бројева, јер нула не може бити прва цифра, а последња комбинација садржи $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ броја. Укупан број таквих четвороцифрених бројева је $18 + 18 + 18 + 18 + 24 = 96$.

373. Ако први многоугао има m , а други n страница, онда је очигледно $\frac{(m-2)180^\circ}{m}$:
 $\frac{(n-2)180^\circ}{n} = 3 : 2$ или $3(n-2) = 2n(m-2)$, па је $3mn - 6m = 2nm - 4n$. Тада је $mn - 6m + 4n = 0$. Следи да је $mn - 6m + 4n - 24 = -24$, па је $(m+4)(6-n) = 24$. Дакле, $m+4 \in \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$. Условима задатка очигледно одговарају само вредности $m=4$, $m=8$, $m=20$ и одговарајуће вредности $n=3$, $n=4$, $n=5$.

374. Тражена површина је једнака збиру површина правоугаоника $ABEF$ и трапеза $BCDE$ (слика). Дакле, површина је $P = 6(1 + \sqrt{2}) \text{ cm}^2$.



Сл. уз задатак 374



Сл. уз задатак 375


375. Како је MN средња линија троугла ASD то је MN половина крака AD , па према томе и крака BC (слика). Троугао BCN је правоугли, па је тежишна дуж PN једнака половини хипотенузе BC . Слично је и троугао BMC правоугли, па је тежишна дуж MP једнака половини хипотенузе BC . Дакле, $MN = NP = MP = \frac{1}{2}BC$.

376. Нека је x број тачних задатака, y број нетачних задатака и z број задатака које ученик није решавао. Тада је $x+y+z=20$ и $8x-5y=13$. Решавањем друге једначине добија се да је $x=6$, или $x=11$ или $x=16$. Одговарајуће вредности су 7, 15 и 23. Очигледно је да последње две могућности нису могуће, јер је $x+y>20$. Дакле, једино решење је $x=6$, $y=7$ и $z=7$.


377. (а) Да би праве биле паралелне мора $2m-0,5=7m+2$, одакле је $m=0,5$.

(б) Из услова $2m-0,5 < 0$ и $7m+2 > 0$ добија се да је $-\frac{2}{7} < m < \frac{1}{4}$.

378. Троуглови ABC и BCD су слични (оба су правоугла са оштрим углом α) (слика). Из сличности је $AB : BC = BC : BD$ или $120 : x = x : 30$ или $x^2 = 3600$, па је $x = 60 \text{ m}$.



Сл. уз задатак 378



Сл. уз задатак 379

379. Ако је ивица пирамиде x , онда је $AS' = \frac{x\sqrt{3}}{3}$ и $SS' = x\sqrt{\frac{2}{3}}$ (слика). Тада је $SM = MS'$ половина те дужи па је, користећи Питагорину теорему, $MA^2 = MB^2 = \frac{x^2}{2}$.


Тада је $AM^2 + BM^2 = \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} = x^2 = AB^2$, што на основу обратне Питагорине теореме значи да је троугао ABM правоугли.

380. Ученика шестог разреда бирајмо на три начина. Остале три члана екипе бирајмо по принципу: 1 седмак и 2 осмака; 2 седмака и 1 осмак или сва 3 седмака. То је редом $(4 \cdot 5 \cdot 4) : 2 = 40$, $(4 \cdot 3 : 2) \cdot 5 = 30$ или 4 начина. Према томе, екипу је могуће изабрати на укупно $3 \cdot (40 + 30 + 4) = 3 \cdot 74 = 222$ начина.


381. У маси пшенице од 4250 kg , воде је 20% , дакле 850 kg . После сушења пшенице, маса пшенице је смањена за 250 kg , дакле остало је још само 600 kg воде. Влажност пшенице после сушења је, дакле, $600 : 4000$, тј. 15% .

382. Нека је $70 \cdot a + 21 \cdot b + 15 \cdot c - n = X$. Природан број n при дељењу са 3 даје остатак a , па је $n = 3p + a$, што значи да је $X = 70 \cdot a + 21 \cdot b + 15 \cdot c - n = 69 \cdot a + a + 21 \cdot b + 15 \cdot c - 3p - a = 69a + 21b + 15c + 3p$ дељив са 3. На сличан начин се, користећи чињеницу да је $n = 5q + b$, односно $n = 7r + c$, доказује да је X дељиво са 5 и 7. Према томе, X је дељив са $3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$.

383. Нека је у троуглу ABC угао $\alpha > \beta$, тј. $\alpha > 60^\circ$ и $\beta < 60^\circ$ (слика). Тада је $\angle AA_1B = \frac{\alpha}{2} + 60^\circ > 90^\circ$ и $\angle BB_1A = \frac{\beta}{2} + 60^\circ < 90^\circ$. Нека су M и K , редом, подножја нормала из S на BC , односно AC . Како је S центар уписане кружнице у троугао ABC , то је $SM = SK$. Троуглови SMA_1 и CKB_1 имају једнаке углове, јер је $\angle SMA_1 = \angle AKB_1 = 90^\circ$ и $\angle SA_1M = \angle AA_1C = \frac{\alpha}{2} + \beta = \frac{\beta}{2} + 60^\circ = \angle BB_1A = \angle SB_1K$. Тада је и $\angle MS_1A = \angle KSB_1$. Коначно, троуглови SMA_1 и SKB_1 су подударни, па је и $SA_1 = SB_1$.



Сл. уз задатак 383



Сл. уз задатак 384

384. Нека је E тачка на основици AB , таква да је $AE = CD$ (слика). Како је $CE \parallel AD$, то је могуће конструисати троугао BCE , јер су познати елементи: $\angle CEB = \alpha$, $\angle CBE = \beta$ и висина $C'C' = h_\alpha$. У добијеном троуглу BCE дуж BE једнака је $a - b$ и како је дата дуж $a + b$, то је могуће конструисати дужи a и b , чиме даља конструкција постаје једноставна.

385. Пера ће из корпе на којој пише Рајко извучи само једну воћку. Та корпа је или Ђорђева (у њој су тада 2 крушке и 3 јабуке) или Перина (у њој су тада 3 брескве). Разликују се три случаја:

1) Ако је Пера извукao крушку, јасно је да је та корпа Ђорђева. Тада корпа на којој пише Пера, припада Рајку, а корпа на којој пише Ђорђе припада Пери.

2) Ако је Пера извукao јабуку, опет је јасно је да је та корпа Ђорђева. Тада корпа на којој пише Пера, припада Рајку, а корпа на којој пише Ђорђе припада Пери.

3) Ако је Пера извукao брескву, та корпа је његова, па је корпа на којој пише Пера у ствари Ђорђева, а корпа на којој пише Ђорђе припада Рајку.

386. Нека је најмањи заједнички садржалац бројева a и b једнак s , а највећи заједнички делилац једнак d и, на пример, $a > b$. Тада је $s = kd$, па је $s = kd = d + 20$. Одавде је $(k - 1)d = 20$, па су могући следећи случајеви:

- 1) $d = 1, k - 1 = 20, k = 21$. Тада је $s = 21$, па је $a = 21, b = 1$ или $a = 7, b = 3$.
- 2) $d = 2, k - 1 = 10, k = 11$. Тада је $s = 22$, па је $a = 22, b = 2$.
- 3) $d = 4, k - 1 = 5, k = 6$. Тада је $s = 24$, па је $a = 24, b = 4$.
- 4) $d = 5, k - 1 = 4, k = 5$. Тада је $s = 25$, па је $a = 25, b = 5$.
- 5) $d = 10, k - 1 = 2, k = 3$. Тада је $s = 30$, па је $a = 30, b = 10$.
- 6) $d = 20, k - 1 = 1, k = 2$. Тада је $s = 40$, па је $a = 40, b = 20$.


Укупно има 14 решења.

387. Ако се $\frac{2^{17} + 2^{16} + \dots + 2^2 + 2^1 + 1}{2^8 + 2^7 + \dots + 2^2 + 2^1 + 1}$ прошири са $2 - 1$ добија се израз


$$\frac{(2 - 1)(2^{17} + 2^{16} + \dots + 2^2 + 2^1 + 1)}{(2 - 1)(2^8 + 2^7 + \dots + 2^2 + 2^1 + 1)} : 3^3, \text{ тј.}$$

$$\frac{2^{18} - 1}{2^9 - 1} : 3^3 = \frac{(2^9 - 1)(2^9 + 1)}{2^9 - 1} : 3^3 = (2^9 + 1) : 27 = 513 : 27 = 19.$$

388. Како је $\angle MBC = \angle MNC = 60^\circ$, то постоји кружница која садржи тачке M, B, N и C (слика). Како је $\angle CMN = 60^\circ$, то је и $\angle CBN = 60^\circ$ (као периферијски углови над истом тетивом CN). Како је $\angle ACB = \angle NBC = 60^\circ$, то су праве AC и BN паралелне.



Сл. уз задатак 388



Сл. уз задатак 389

389. Нека је S ознака за површине шрафираних, а T за површине белих фигура. Нека L је ознака за фигуре лево од дијагонале AC , а D ознака за фигуре десно од дијагонале AC и нека је k дужина датог правоугаоника. Тада је очигледно $S_L + T_L = S_D + T_D$, јер обе стране једнакости представљају половину површине целог правоугаоника. Слично је $T_L + S_D = ak + ck = (a + c)k = (b + d)k = bk + dk = S_L + T_D$. Сабирањем добијених релација следи $S_L + T_L + T_L + S_D = S_D + T_D + S_L + T_D$. Одавде је јасно да је $T_L = T_D$, па је и $S_L = S_D$.


390. Бројеви које је Лека написао су из скупа $\{10, 11, \dots, 99\}$. Четрдесет парова $(10, 90)$; $(11, 89)$; $(49, 51)$ у збиру дају 100, бројеви 50, 91, 92, 93, ..., 98, 99 (укупно 10) немају својих одговарајућих парова. Очигледно је да ма како Лека бирао 55 бројева увек постоји 45 ($45 > 40$) који припадају првом скупу, тј. увек постоје два чији је збир 100. Дакле, Јарко је био у праву.

391. Нека је количник који је израчунао сваки ученик дефинисан изразом $\frac{x_k}{x_k + 2k - 1}$ где је x_k број бомбона које је добио k -ти ученик, а k редни број његовог места у врсти.


Како је по условима задатка $\frac{x_k}{x_k + 2k - 1}$ константно, то је $\frac{x_k}{x_k + 2k - 1} = M$. Дакле, $x_k = \frac{M}{1-M}(2k-1)$, па је $x_1 + x_2 + \dots + x_{20} = 800$, али је и $x_1 + x_2 + \dots + x_{20} = \frac{M}{1-M}(1+3+\dots+39) = \frac{M}{1-M}400 = 800$. Значи да је $\frac{M}{1-M} = 2$, па је $x_{12} = 2(24-1) = 46$ бомбона.

392. Нека је на турниру учествовало m мајстора и v велемајстора. Између њих је одиграно mv партија. Укупан број одиграних партија на турниру је $\frac{(m+v)(m+v-1)}{2}$. Из услова задатка је $2mv = (m+v)(m+v-1) : 2$, па је $4mv = (m+v)^2 - (m+v)$. Одавде је број учесника турнира $m+v = (m+v)^2 - 4mv = m^2 + 2mv + v^2 - 4mv = m^2 - 2mv + v^2 = (m-v)^2$.


393. Нека је s дужина бочне ивице дате пирамиде (слика). Пресек је правоугаоник чије су странице $\frac{a}{2}$ и $\frac{s}{2}$. Обим пресека је дакле $a+s$, а површина $\frac{as}{4}$. Како је $s = \sqrt{H^2 + \frac{a^2}{3}}$, то је обим пресека $O = a + \sqrt{H^2 + \frac{a^2}{3}}$, а површина $P = \frac{a}{4}\sqrt{H^2 + \frac{a^2}{3}}$.



Сл. уз задатак 393



Сл. уз задатак 394



Сл. уз задатак 395

394. Нека су D и E подножја нормала из тачке C редом на OA и OB и нека је $OA = OB = OC = r$ (слика). Тада је $\angle OAB = \angle OBA = 45^\circ$, па је због паралелности дужи AB и PQ и $\angle OPQ = \angle OQP = 45^\circ$. Зато је $PC^2 = 2CD^2$ и $CQ^2 = 2CE^2$. Тада је $PC^2 + QC^2 = 2CD^2 + 2CE^2 = 2(CD^2 + CE^2) = 2OC^2 = 2r^2 = AB^2$.

395. Нека је могуће направити распоред тако да збир свака три узастопна броја није већи од k . Нека су у том случају дате цифре распоређене на следећи начин: a_1, a_2, \dots, a_{10} . Тада је очигледно $(a_1 + a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6) + (a_7 + a_8 + a_9) \leq 3k$, а одавде је $(a_1 + a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6) + (a_7 + a_8 + a_9) + a_{10} \leq 3k + a_{10}$. Како је лева страна претходне неједнакости једнака 45 то је $45 \leq 3k + a_{10}$. Добијени услов мора да важи за сваку цифру па и за $a_{10} = 0$, па је $k \geq 15$. Према томе, услов (а) није могућ, а услов (б) је могућ и један такав пример дат је на слици.


396. Очигледно је $a = 3b$, па је a број који је дељив са 3. Како је број a дељив са 3, то је и збир његових цифара дељив са 3. Дакле и збир цифара броја b (који је једнак са збијом цифара броја a) је дељив са 3. Дакле и број b је дељив са 3, па је $b = 3k$, што значи да је $a = 3 \cdot 3k = 9k$. Одавде следи да је збир цифара броја a дељив са 9, што значи и да је збир цифара броја b дељив са 9, односно и број b је дељив са 9. Како је $b = 9l$, то је $a = 3 \cdot 9l = 27l$, што је и требало доказати.

397. Од поноћи па до подне велика казаљка пређе 12 пуних кругова. У сваком кругу, сем у првом, ће се поклопити мала и велика казаљка, што значи да ће бити 11 поклапања.


Та поклапања ће се реализовати на сваких $\frac{12}{11}$ сати. Дакле у $1\frac{1}{11} h, 2\frac{2}{11} h, 3\frac{3}{11} h, 4\frac{4}{11} h, 5\frac{5}{11} h, 6\frac{6}{11} h, 7\frac{7}{11} h, 8\frac{8}{11} h, 9\frac{9}{11} h, 10\frac{10}{11} h$ и $11\frac{11}{11} h = 12 h$.

398. Троугао $AA'B$ је правоугли, па је C_1A' као хипотенуза тежишна дуж једнака $\frac{1}{2}AB$ (слика). Слично је и $C_1B' = \frac{1}{2}AB$.

Како су троуглови AC_1B' и BC_1A' једнакокраки, то је $\angle AC_1B' = 180^\circ - 2\alpha$, а $\angle BC_1A' = 180^\circ - 2\beta$. Тада је $\angle A'C_1B' = 180^\circ - (180^\circ - 2\alpha + 180^\circ - 2\beta) = 2\alpha + 2\beta - 180^\circ$. Како је $\alpha + \beta = 120^\circ$, то је $\angle A'C_1B' = 240^\circ - 180^\circ = 60^\circ$, па је $\triangle A'C_1B'$ једнакостранични.



Сл. уз задатак 398



Сл. уз задатак 399

399. Како је $APMS$ паралелограм, то је $SM \parallel AB$ и $PM \parallel AD$ (слика). Како су P и S средишта страница AB и AD , то су дужи SM и PM средње линије, па је тачка M средиште дијагонале BD . Тада су MQ и MR средње линије троугла BCD , па је $MQ \parallel CD$ и $MR \parallel BC$, што значи да је $CQMR$ такође паралелограм.

400. Свако се могао руковати највише 6 пута (са три брачна пара). Како је дато седам различитих одговора, следи да су одговори: 0,1,2,3,4,5,6. Пођимо од особе, рецимо Милеве, која је имала 6 руковања. Она се руковала са свима, осим са својим брачним другом. Одавде следи да су сви остали, осим Милевиног мужа, имали бар по једно руковање. Дакле, Милевин муж је имао 0 руковања. Остале су особе са 1,2,3,4 и 5 руковања. Особа, која је имала 5 руковања, руковала се са Милевом и са свима од преостале четири особе. Следи да се њен брачни друг руковоа само са Милевом, тј. руковоа се само једном. Слично се може закључити да су се трећи брачни пар руковали 4 пута и 2 пута, што значи да се Љубица руковала 3 пута.

401. Број $340 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 17$. Сва три чиниоца $a+b$, $b+c$ и $c+a$ су већи или једнаки 2, јер су a , b и c природни бројеви.

Сва три чиниоца нису истовремено парни, јер би тада њихов производ био делјив са 8, а број 340 то није.

Ако би два чиниоца, на пример $a+b$ и $b+c$, били парни, онда би и њихов збир $a+2b+c$ био паран, што значи да би и трећи чинилац $a+c$ био паран, а то је немогуће.

Дакле, једина могућност је да је један чинилац паран, а остали непарни, на пример $a+b=4$, $b+c=5$ и $c+a=17$, што није могуће, јер је $a+b+b+c=a+2b+c=9 < a+c=17$. Према томе, такви природни бројеви a , b и c не постоје.


402. Нека је $m \geq n$, тада је $m^2 < m^2 + n \leq m^2 + m < (m+1)^2$. Дакле, број $m^2 + n$ је између квадрата два узастопна природна броја, па не може бити квадрат природног броја.

Ако је $n \geq m$, онда је $n^2 < n^2 + m \leq n^2 + n < (n+1)^2$, па број $n^2 + m$ није квадрат природног броја.


403. Како су углови $\angle ADB$ и $\angle ACB$ прави, то је четвороугао $ABCD$ тетивни, а центар круга описаног око четвороугла је тачка O која је средиште странице AB (слика). Како је

$CD = \frac{1}{2}AB$, то је CD једнако полупречнику круга $k(O, AO = OB = CD)$, па је $\triangle OCD$ једнакостраничан. Како је периферијски угао CAD над тетивом CD једнак половини централног угла, то је $\angle CAD = \frac{1}{2}\angle COD = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$.

Тада је оштар угао између дијагонала једнак 60° , а туп угао 120° .



Сл. уз задатак 403



Сл. уз задатак 404

404. Нека тачка D дели хипотенузу AB на дужи $BD = x$ и $AD = y$ (слика). Познато је да је у сваком правоуглом троуглу $r = \frac{a+b-c}{2}$. Ако ову чињеницу применимо на $\triangle ABC$, $\triangle ACD$ и $\triangle BCD$ добија се $r + r_1 + r_2 = \frac{a+b-c}{2} + \frac{h+y-b}{2} + \frac{h+x-a}{2} = \frac{a+b-x-y+h+y-b+h+x-a}{2} = h = CD$.

405. Грађанин који се јавио, није из града A јер би тада порука гласила: „Код нас је пожар“, а одговор „У граду A “.

Ако је грађанин који се јавио из града C његови одговори би били: „Код нас је пожар“ и „У граду A или граду B “.

Према томе јавио се грађанин града B . Како пожар није у B јер му први исказ није тачан и како пожар није у C јер му и други исказ није тачан, ватрогасац ће екипу послати у град A .


406. Нека су дати бројеви $a_1, a_2, \dots, a_{2001}$ и нека је њихов збир S . Ако је $b_1 = a_2 + a_3 + \dots + a_{2001}$, $b_2 = a_1 + a_3 + \dots + a_{2001}$, ..., $b_{2001} = a_1 + a_2 + \dots + a_{2000}$, тада је $b_1 + b_2 + \dots + b_{2001} = 2000(a_1 + a_2 + \dots + a_{2001}) = 2000S$. Како су скupovi $\{a_1, a_2, \dots, a_{2001}\}$ и $\{b_1, b_2, \dots, b_{2001}\}$ једнаки, то је и $b_1 + b_2 + \dots + b_{2001} = S$. Дакле, $S = 2000S$, одакле је јасно да је $S = 0$. Како је $b_1 = S - a_1 = -a_1$, $b_2 = S - a_2 = -a_2$, ..., $b_{2001} = S - a_{2001} = -a_{2001}$ очигледно је да сваки члан низа има свој супротни члан (исти по апсолутној вредности, а различит по знаку). С обзиром да је број чланова низа 2001 дакле непаран један члан низа је сам себи супротан, дакле једнак 0. Тада је $a_1 \cdot a_2 \cdots a_{2001} = 0$.

407. Будући да су a, b, c различити бројеви, можемо узети да је $a < b < c$. Користећи услове задатка, следи да је $ab + bc + ca = abc - (1 + 2 + \dots + n - a - b - c)$, тј. $abc - ab - bc - ca + a + b + c - 1 = 2 + \dots + n$, одакле је: $(a-1)(b-1)(c-1) = 2 + \dots + n$.


(а) За $n = 12$ је $2+3+\dots+12 = 77$. Тада је: $(a-1)(b-1)(c-1) = 7 \cdot 11$, па је $a-1 = 1$, $b-1 = 7$ и $c-1 = 11$, тј. $a = 2$, $b = 8$, $c = 12$.

(б) За $n = 17$ је $2+3+\dots+17 = 152 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 19$, па је: $(a-1)(b-1)(c-1) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 19$. Одавде следи да је $c-1 \geq 19$, тј. $c \geq 20$, што није могуће, јер мора бити $c \leq 17$. Дакле, случај $n = 17$ нема решења.

408. Нека је $P_{\triangle PBQ} = P_1$ (слика). Тада је $P_{\triangle APQ} = 2P_1$. Нека је $P_{\triangle AQS} = P_2$ и $P_{\triangle QRS} = x$. Тада је $P_{\triangle CMR} = P_{\triangle ANS} = P_1$ и $P_{\triangle BMR} = P_{\triangle CNS} = 2P_1$, а $P_{\triangle BQR} = P_{\triangle CRS} = P_2$.



Сл. уз задатак 408



Сл. уз задатак 409

Како је $P_{\triangle APR} = 2P_{\triangle BPR}$, то је $2P_1 + P_2 + x = 2(P_1 + P_2)$, па је $x = P_2$. Слично је $P_{\triangle APC} = 2P_{\triangle BPC}$, тј. $5P_1 + 2P_2 + x = 2(4P_1 + P_2)$, што значи да је $x = 3P_1$.

Како је $7 \text{ cm}^2 = 9P_1 + 3P_2 + x = 3x + 3x + x$, то је $x = 1 \text{ cm}^2 = P_{\triangle QRS}$.

409. Како је $DP = DN$ и $EP = EM$ (тангентне дужи), то је $\mathcal{O}_{\triangle CDE} = CD + DP + PE + CE = CD + DN + EM + CE = CN + CM$ (слика). Тада је $\mathcal{O}_{\triangle ABC} = CN + AN + AB + BM + CM = \mathcal{O}_{\triangle CDE} + AN + AB + BM = \mathcal{O}_{\triangle CDE} + AR + AB + BR = 2AB + \mathcal{O}_{\triangle CDE}$.

Ако означимо $AB = c$, онда је $\mathcal{O}_{\triangle CDE} = 2s - 2c$. Троуглови ABC и CDE су слични па је $\frac{x}{c} = \frac{\mathcal{O}_{\triangle CDE}}{\mathcal{O}_{\triangle ABC}}$, односно, $\frac{x}{c} = \frac{2s - 2c}{2s}$, одакле је $x = \frac{1}{s}(cs - c^2) = \frac{1}{s}\left[\frac{s^2}{4} - \left(c - \frac{s}{2}\right)^2\right]$.

Максимална вредност x је $\frac{s}{4}$, за $c = \frac{s}{2}$.

410. Нека је a број који не учествује у нумерацији и s збир бројева којима су нумерисана темена једне стране коцке. Свако теме је заједничко за три стране па је $6s = 3(1 + 2 + \dots + 9) - 3a$, одакле је $2s = 45 - a$. Одавде следи да је број a непаран, па како број s није делјив са a , то и број 45 није делјив са a . Дакле, $a = 7$.

411. Претпоставимо, за почетак, да је $a \leq b \leq c$. Уочимо, затим, да је $x^3 \equiv 1 \pmod{9}$ или $x^3 \equiv -1 \pmod{9}$ или $x^3 \equiv 0 \pmod{9}$, за свако $x \in \{0, 1, 2, \dots, 8\}$. Такође је $2001 \equiv 3 \pmod{9}$. Користећи услов задатка, следи да је $a^3 + b^3 + c^3 \equiv 3 \pmod{9}$, па мора бити $a^3 \equiv 1 \pmod{9}$, $b^3 \equiv 1 \pmod{9}$ и $c^3 \equiv 1 \pmod{9}$. С обзиром да је $13^3 > 2001$, то је $a \leq b \leq c \leq 12$, па бројеви a , b и c припадају скупу $\{1, 4, 7, 10\}$. После краће дискусије, добија се да је једина могућност $a = 1$, $b = 10$, $c = 10$.


Одавде следи да су решења дате једначине: $a = 1$, $b = 10$, $c = 10$; $a = 10$, $b = 1$, $c = 10$ и $a = 10$, $b = 10$, $c = 1$.

412. (а) Претпоставимо да постоји тачка $M \in CL$ таква да је $\angle MAC = \angle MBC$. Како је $\angle ACL = \angle LCB$, то је $\angle AMC = \angle BMC$, па је $\triangle AMC$ сличан $\triangle BMC$. Како ови троуглови имају и заједничку страницу MC , то је $\triangle AMC \cong \triangle BMC$, па је $AC = BC$, што је супротно претпоставци задатка $AC \neq BC$, па је тврђење под (а) тачно.


(б) Претпоставимо да постоји тачка $M \in CH$ таква да је $\angle MAC = \angle MBC$ (слика). Нека су M_1 и M_2 редом подножја нормала из M на AC и BC . Како су троуглови AMM_1 и MBM_2 правоугли и $\angle M_1 AM = \angle MBM_2$, то важи $\triangle AMM_1 \sim \triangle MBM_2$, па је $\frac{MM_1}{MM_2} = \frac{AM}{BM}$ (1). Такође, како су троуглови CMM_2 и ABC правоугли и $\angle MCM_2 = \angle CAB$ (као углови са нормалним крацима), то важи $\triangle CMM_2 \sim \triangle ABC$, па је $\frac{MM_2}{M_2C} = \frac{BC}{AC}$ (2).

Како је $M_2C = MM_1$, то користећи једнакости (1) и (2) следи $\frac{AM}{BM} = \frac{AC}{BC}$, односно $\frac{AM}{AC} = \frac{BM}{BC}$. Како је и $\angle CAM = \angle MBC$, то је $\triangle AMC \sim \triangle BMC$.


Одавде следи $\angle BCM = \angle ACM$, па је $AC = BC$, а то је супротно претпоставци $AC \neq BC$. Значи, $\angle MAC \neq \angle MBC$.



Сл. уз задатак 412



Сл. уз задатак 413



Сл. уз задатак 414

413. Нека се DF и EG секу у тачки M (слика). Користећи услове задатка следи да је $\angle DME = \angle GMF = 120^\circ$, па је четвороугао $AGMF$ тетиван. Одавде следи да је $\angle GFM = \angle GAM$ и $\angle FGM = \angle FAM$, као периферијски углови над истом тетивом. Како су DF и EG симетрале углова, то је и AM симетрала угла, тј. $\angle FAM = \angle GAM$, па је $\angle GFM = \angle FGM$ и $\triangle FGM$ је једнакокрак, па је $FM = MG$.

Даље, нека је тачка $N \in ED$ таква да је $\angle NME = 60^\circ$. Тада је и $\angle DMN = 60^\circ$. Како је и $\angle GMF = 120^\circ$, то је $\angle FME = \angle DMG = 60^\circ$. Као троуглови FME и MNE имају заједничку страницу EM и једнака два налеглаугла, то су они и подударни. Слично је и $\triangle DMG \cong \triangle DNM$. Одавде следи да је $P_{\triangle MDE} = P_{\triangle NME} + P_{\triangle DNM} = P_{\triangle FME} + P_{\triangle DGM}$, $P_{\triangle DEF} = P_{\triangle MDE} + P_{\triangle MEF}$ и $P_{\triangle DEG} = P_{\triangle MDE} + P_{\triangle MGD}$. Сабирањем ових једнакости добијамо $P_{\triangle DEF} + P_{\triangle DEG} = 3P_{\triangle MDE}$.

На крају, како један од углова $\angle DEA$ и \angleEDA троугла ADE мора бити не мањи од 60° , нека је то $\angle DEA$. Тада је и $AD \geq DE$ (наспрам већег угла троугла ADE налази се већа страница). Како је $AD \leq AB$, то је и $DE \leq AB$ (1). Даље, како је тачка M центар круга уписаног у троугао ADE полуупречника r' , то је $P_{\triangle MDE} = \frac{1}{2}DE \cdot r'$. Нека је r полуупречник круга уписаног у троугао ABC . Тада је $r' \leq r$ (2). Користећи релације (1) и (2), следи $3P_{\triangle MDE} = \frac{3}{2}DE \cdot r' \leq \frac{3}{2}AB \cdot r = s \cdot r = P_{\triangle ABC}$, при чему је s полуобим датог једнакостстраничног троугла ABC .

Користећи релације (1) и (2), јасно је да једнакост важи уколико је $DE = AB = BC$ и $r = r'$, тј. у случају $D \equiv B$ и $E \equiv C$.

414. Можемо посматрати троуглове на следећи начин: $A_1A_2A_3$, $A_2A_3A_4$, ..., $A_{1414}A_{1415}A_1$, $A_{1415}A_1A_2$ (слика). Претпоставимо да је површина сваког од ових троуглова не мања од 1. За било који троугао са страницама a и b важи $2P = a \cdot h_a \leq a \cdot b$ ($h_a \leq b$). Примењујући ову особину на сваки уочени троугао имамо: $A_1A_2 \cdot A_2A_3 \geq 2$ (зато што је $P \geq 1$), $A_2A_3 \cdot A_3A_4 \geq 2$, ..., $A_{1415}A_1 \cdot A_1A_2 \geq 2$. Ако применимо неједнакост $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ добијамо $A_1A_2 + A_2A_3 \geq 2\sqrt{A_1A_2 \cdot A_2A_3} \geq 2\sqrt{2}$, $A_2A_3 + A_3A_4 \geq 2\sqrt{2}$, ..., $A_{1415}A_1 + A_1A_2 \geq 2\sqrt{2}$. Сабирајући претходне неједнакости добијамо: $2(A_1A_2 + A_2A_3 + \dots + A_{1415}A_1) \geq 1415 \cdot 2\sqrt{2}$, одакле је $\mathcal{O} \geq 1415 \cdot \sqrt{2} = 1415 \cdot 1,4142\dots$, па је $\mathcal{O} \geq 2001,93$, тј. $\mathcal{O} > 2001$, што је супротно претпоставци у задатку.

2002. година

415. Из прве кутије Бранко је у албум ставио $256 : 4 = 64$ маркице, а из друге $252 : 3 = 84$ маркице. Укупно је у албум ставио $84 + 64 = 148$ маркица. У првој кутији му је остало $256 - 64 = 192$ маркице, а у другој $252 - 84 = 168$ маркица.

416. Број 658 је мањи од 1024 за $1024 - 658 = 366$. Дакле, тражени број је $25432 - 366 = 25066$.


417. Обим једног правоугаоника је $540 : 3 = 180$ см. (а) Половина обима једног правоугаоника је $180 : 2 = 90$ см. (б) Дужина је $90 - 40 = 50$ см.

418. За једноцифрене природне бројеве (има их 9) потребно је 9 цифара, за двоцифрене (има их 90) потребно је 180 цифара, а за троцифрене (има их 900) потребно је 2700 цифара. За исписана 1003 четвороцифрене броја потребно је 4012 цифара. Укупно је записала $9 + 180 + 2700 + 4012 = 6901$ цифру.


419. Новац треба поделити на седам једнаких делова, од којих Петар добија шест, а Павле један део. $2002 : 7 = 286$, па Петар добија $286 \cdot 6 = 1716$, а Павле 286 динара.

420. Цифра јединица мора бити 5, а збир цифара делив са 3, па су решења 525, 555, 585.

421. Тачно један задатак решило је $45 + 30 = 75$ ученика (слика).



Сл. уз задатак 421



Сл. уз задатак 423

422. Пут је дугачак $1\ 000\ 000\ 000$ mm = 1000 km, па би га возило прешло за $1000 : 50 = 20$ h.


423. Одређено је 4 полуравни (слика). То су полуравни одређене „деловима“ 1,2; 2,4; 3,4 и 1,3.

424. Како је $3\alpha - \beta + 63^\circ 45' 36'' = 3\alpha + 2\beta$, то је $3\beta = 63^\circ 45' 36''$, одакле је $\beta = 21^\circ 15' 12''$. Како је даље $3\alpha - \beta = 74^\circ 37' 16'' + \alpha - \beta$, то је $2\alpha = 74^\circ 37' 16''$, одакле је $\alpha = 37^\circ 18' 38''$.


425. Висина тополе треба да буде $12,75 + 3,9 = 16,65$ m, што значи да топола треба да порасте за $16,65 - 8,7 = 7,95$ m.

426. $|8 \cdot (-4) - (-(-(-4)))| = |-32 + 4| = |-28| = 28$.

427. Како је $\angle CAB > \angle ABC$, то ће тачка D бити између B и C (слика). Пошто је s симетрала странице AB , то је $AD = BD$, тј. троугао ABD је једнакокрак, па је $\angle DAB = \angle ABD = 43^\circ 33' 20''$, $\angle CAD = 73^\circ 28' 40'' - 43^\circ 33' 20'' = 29^\circ 55' 20''$.



Сл. уз задатак 427



Сл. уз задатак 432

428. Најпре треба конструисати праву t' симетричну правој t у односу на праву s . Тада је $R = r \cap t'$. Тачку T добијамо симетрично тачки R у односу на s .

429. Приметимо најпре да n не може бити два, јер је збир два узастопна цела броја непаран, а 2002 је паран број. Такође не може бити ни три, јер је збир три узастопна цела броја делив са три, а 2002 то није. Проверимо да ли n може бити 4. Нека су $x - 1$, x , $x + 1$, $x + 2$ четири узастопна цела броја таква да им је збир једнак 2002. Тада је $4x + 2 = 2002$, тј. $x = 500$. Дакле, тражено најмање n је четири.

430. $\frac{1}{x} = \sqrt{0,04} = 0,2 = \frac{1}{5}$, одакле је $x = 5$, па је


$$\sqrt{\left(\frac{1}{x} - x\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{5} - 5\right)^2} = \left|\frac{1}{5} - 5\right| = 5 - \frac{1}{5} = 4\frac{1}{5}.$$

431. $\frac{2^{3x} \cdot 3^{2x}}{6^x} : 12^x = \frac{2^{3x} \cdot 3^{2x}}{2^x \cdot 3^x} \cdot \frac{1}{12^x} = \frac{2^{3x} \cdot 3^{2x}}{2^x \cdot 3^x \cdot 2^{2x} \cdot 3^x} = 1$.


432. Конструише се квадрат K_1 странице 3 см. Страница квадрата K је $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ см, а то је половина дијагонале квадрата K_1 . Према томе, тражени квадрат K је $ABCD$ (слика).

433. Како је $a^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 4$, то је $a = 2$ см, а како је $c^2 = a^2 + b^2 = 13$, то је $c = \sqrt{13}$ см. Површина је $P = \frac{1}{2}ab = 3$ см², а обим $O = a + b + c = (5 + \sqrt{13})$ см.

434. (a) $x^2 = 8^2 - 2^2 = 60$, па је $x = \sqrt{60} = 2\sqrt{15}$ см (слика (a)). Обим је $O = 2(4 + 2\sqrt{15}) = (8 + 4\sqrt{15})$ см.



(a)



(b)

Сл. уз задатак 434

(b) $x^2 = 8^2 - 4^2 = 48$, па је $x = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ см (слика (b)). Обим је $O = 2(4 + 8\sqrt{3}) = (8 + 16\sqrt{3})$ см.

435. Разлика ће имати најмању вредност када умањилац има највећу могућу вредност. Као је у овом случају умањилац разломак са константним бројоцем, он ће имати највећу вредност када му именилац има најмању могућу вредност, а то ће бити када је $0,3 + x = 0$, тј. када је $x = -0,3$.

436. Како је периферијски угао над основицом AB 30° , то је централни угао 60° , па је дужина кружног лука који одговара основици шестина обима описаног круга, чији је полу пречник једнак дужини основице. Како су краци једнаки, то су и лукови који одговарају крацима једнаки, па је дужина лука који одговара краку једнака $\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{6}\right) = \frac{5}{12}$ обима описаног круга. Тада је $2 \cdot 4 \cdot \pi = 8\pi$ см, па је тражена дужина лука једнака $\frac{5}{12} \cdot 8\pi = \frac{10}{3}\pi$ см.


437. Нека је a дужина, b ширина и c висина квадра. Димензије новог квадра биће $1,25a$, $\frac{4}{3}b$ и $0,9c$, па ће његова запремина бити $V_1 = \frac{5}{4}a \cdot \frac{4}{3}b \cdot \frac{9}{10}c = \frac{3}{2}abc$. Значи, запремина ће се повећати $\frac{3}{2}$ пута.

438. Нека је O центар кружнице. Површина четвороугла $ABCD$ једнака је збиру површина правоуглих троуглова ABO , AOD и BCD . Прва два су једнакокрако-правоугли са крацима једнаким 4 см, па је површина сваког од њих $\frac{4 \cdot 4}{2} = 8$ см 2 . У троуглу BCD хипотенуза је 8 см, а један крак 4 см, па је други крак $\sqrt{8^2 - 4^2} = 4\sqrt{3}$ см, а његова површина је једнака $\frac{4 \cdot 4\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$ см 2 . Површина четвороугла $ABCD$ једнака је $2 \cdot 8 + 8\sqrt{3} = (16 + 8\sqrt{3})$ см 2 .

439. Из $x^2 - y^2 = 2002$ следи $(x-y)(x+y) = 2002$. Како су $x+y$ и $x-y$ исте парности, то је њихов производ или непаран или делјив са 4 . Оба случаја су немогућа. Према томе, разлика квадрата два природна броја не може бити 2002 .

440. Други аутомобил се креће 88 km/h. После сусрета они се удаљавају један од другог, а за три часа ће бити удаљени $3 \cdot 76 + 3 \cdot 88 = 492$ km.

441. У другој смени ради 168 рудара, а у трећој $(126 + 168) : 2 = 147$ рудара.



Сл. уз задатак 442

443. Број 2002 можемо записати на следећи начин:

$$1 \cdot 9 + 2 \cdot 90 + 3 \cdot 604 = 2002,$$

па значи да нам је за записивање свих једноцифрених, свих двоцифрених и прва 604 троцифрена броја потребна 2001 цифра, а онда је 2002 . цифра 7 .

444. Ако са M обележимо мањи број, тада је већи број $8M + 15$. Према томе, $825 = M + (8 \cdot M + 15)$, па је онда мањи број $M = 90$, а већи 735 .

445. Како је $A \cap B \cap C = \{1, 2\}$, то је, пре свега, $1 \in C$ и $2 \in C$. С друге стране, како из $B \setminus C = \{4, 5\}$ следи $4 \notin C$ и $5 \notin C$, то из $C \setminus A \neq \emptyset$ следи да $3 \in C$. према томе $C = \{1, 2, 3\}$

446. Како је $n \cdot p = 2002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ и p је прост број, то су могућа следећа четири решења: $p_1 = 2$, $n_1 = 1001$; $p_2 = 7$, $n_2 = 286$; $p_3 = 11$, $n_3 = 182$ и $p_4 = 13$, $n_4 = 154$.

447. Како је збир запремина датог квадра и коцке (ивице 10 см) 1910 см 3 , то је укупна запремина остале три коцке 92 см 3 . Једна од тих коцки мора имати ивицу 4 см (јер је $3 \cdot 3^3 = 81 < 92$), а онда остале две коцке имају укупну запремину $92 - 64 = 28$ см 3 . На исти начин закључујемо да су ивице те две коцке 3 см и 1 см.

442. Ако је обим квадрата 1000 см, његова страница је $1000 : 4 = 250$ см. Са слике се види да је обим мањег правоугаоника мањи од обима већег за полуобим квадрата, тј. обим мањег правоугаоника је $2002 - 500 = 1502$ см.

448. Уочених шест тачака одређују укупно $(6 \cdot 5) : 2 = 15$ правих, а како три од њих пролазе кроз темена троугла, тражени број правих је 12.

449. Како је $180 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ и како су два од бројева $n, n+1, 2n+1$ непарна, то је јасно да је једнини могућност $n = 4$.


450. $\frac{20}{-5x+10} > 1$ ако и само ако $0 < -5x+10 < 20$. Одавде је $-2 < x < 2$, тј. $x \in \{-1, 0, 1\}$.

451. (а) Ако је један од спољашњих углова 121° , могућа су два случаја:


- (i) да је унутрашњи угао од 59° угао при врху, па су тада углови на основици по $60^\circ 30'$;
- (ii) да је унутрашњи угао од 59° угао на основици, па је тада угао при врху 62° .

(б) Ако је један од спољашњих углова 65° , то мора бити спољашњи угао угла при врху (треугао не може имати два оштра спољашња угла), па је тада одговарајући унутрашњи угао 115° , а углови на основици од по $32^\circ 30'$.

452. Ако су дужи CM и DM подударне, то значи да је $\triangle MCD$ једнакокрак, па је $\angle MDC = \angle MCD$. Сада је $\angle MDA = 90^\circ - \angle MDC = 90^\circ - \angle MCD = \angle MCB$, $AD = BC$ и $DM = MC$, па су треуглови AMD и MBC подударни. Одавде закључујемо да је $\angle DAM = \angle MBC$.



Сл. уз задатак 452



Сл. уз задатак 458

453. Да би у трећем одсеку лоптица достигла 32 см, она мора да пада са висине x која задовољава услов $\frac{2}{5}x = 32$ см. Одавде је $x = 80$ см. Слично, за други одсек од 80 см потребно је да падне са 200 см, а за први одсек од 200 см лоптица је морала да падне са висине од 500 см. Пут који је лоптица прешла док није четврти пут додирнула земљу је $s = 500 + 2 \cdot 200 + 2 \cdot 80 + 2 \cdot 32 = 1124$ см.

454. Како је $2002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$, то за једноцифрен број морамо узети 1, а онда су сва могућа решења:

$$2002 = 1 \cdot 14 \cdot 143 = 1 \cdot 11 \cdot 182 = 1 \cdot 13 \cdot 154.$$

455. Како је $13 : 101 = 0,12871287 \dots$, а број 2002 је паран и није делјив са четири, цифра на 2002 . децималном месту је 2.

456. $(\sqrt{625} + 3 \cdot \sqrt{(12)^2}) : \left(\frac{2}{5} \cdot \sqrt{0,25} + 0,58 \cdot \sqrt{100} \right) = (25 + 36) : \left(\frac{2}{5} \cdot 0,5 + 5,8 \right) = 61 \cdot \frac{1}{6} = \frac{61}{6}$.

457. Ако је један угао правоуглог троугла 60° , а хипотенуза c , тада су његове катете $\frac{c}{2}$ и $\frac{c\sqrt{3}}{2}$. Сада је површина тог троугла с једне стране $\frac{1}{2} \cdot c \cdot 2\sqrt{3}$, а с друге стране $\frac{1}{2} \cdot \frac{c}{2} \cdot \frac{c\sqrt{3}}{2}$. Одавде закључујемо да је $c = 8$ см. Сада се лако израчунава $P = 8\sqrt{3}$ см 2 и $O = (12 + 4\sqrt{3})$ см.

458. Површина овог троугла је $P = 6 \text{ cm}^2$. Ако са h_1, h_2, h_3 (слика) означимо растојања неке тачке M од странница тог троугла и ако је $h_1 < 1, h_2 < 1$ и $h_3 < 1$, тада је $P = \frac{1}{2}ah_1 + \frac{1}{2}bh_2 + \frac{1}{2}ch_3 < \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c = 6$, што је немогуће, па закључујемо да у унутрашњости троугла не постоји тачка M за траженим особинама.


459. Не постоје. Како су p, q и r прости и међусобно различити, то су они или сва три непарна или један од њих једнак 2, а остала два непарна. У оба случаја је $pq + qr + rp$ непаран број.

460. Дата неједначина се своди на два система неједначина:


- (i) $3a - 2 < 0$ и $a + 1 > 0$, односно $a \in \left(-1, \frac{2}{3}\right)$;
- (ii) $3a - 2 > 0$ и $a + 1 < 0$, односно $a > \frac{2}{3}$ и $a < -1$ када нема решења,

па је коначно решење $-1 < a < \frac{2}{3}$, тј. то су сви рационални бројеви између -1 и $\frac{2}{3}$.

461. Сваку од катета поделимо на три једнака дела па кроз подеоне тачке на једној катети повучемо праве паралелне са другом катетом (слика). На тај начин добијамо тражену поделу.



Сл. уз задатак 461



Сл. уз задатак 463

462. Нека је ивица коцке 1. Тада је површина коцке 6, а површина добијених делова је $2002 \cdot 6$. С друге стране, ако је n број пресека, онда је површина добијених делова једнака $6 + 2n$. Решавањем једначине $6 \cdot 2002 = 2n + 6$ добијамо $n = 6003$.

463. Очигледно је да је $ABCD$ једнакокраки трапез са угловима на већој основици од 60° (слика). Како су површине троуглова ACD и OCD једнаке (једнаке основице и висине), то је тражена површина једнака површини фигуре ограничене дужима OC, OD и луком CD , а то је шести део површине круга, тј. $P = \frac{8}{3}\pi \text{ cm}^2$.

464. Треба исечи пет штапова на делове 4,4,5; четири штапа на делове 5,5,3 и три штапа на делове 3,3,3,4. Тако добијамо по 13 делова дужина 3,4 и 5.

465. Ако са x означимо дужину баште у метрима, а са y њену ширину, тада ће површина баште бити $P = xy \text{ m}^2$. Како је онда дужина винограда $5x$, а ширина $6y$, то ћегова површина бити $P_1 = 30xy \text{ m}^2$, тј. $P_1 = 30 \cdot P = 67200 \text{ m}^2$. Значи, површина баште је $P = 2240 \text{ m}^2$.

466. У првом кругу у једној групи одиграно је $(4 \cdot 3) : 2 = 6$ утакмица. На турниру је укупно одиграно $2 \cdot 6 + 1 = 13$ утакмица.

467. Једноцифреним бројевима нумерисане су 4 парне странице (4 листа), двоцифреним 45 парних страница (45 листова) и троцифреним још 380 парних страница (380 листова) и за то смо искористили $4 \cdot 1 + 45 \cdot 2 + 380 \cdot 3 = 1234$ цифре. Значи, та књига има $4 + 45 + 380 = 429$ листова.

468. Највећи леп број је 5544, а најмањи 4455, па је највећа разлика $5544 - 4455 = 1089$. Најмања разлика се добија када су цифре хиљада и стотина једнаке и она износи $9 = 5454 - 5445 = 4554 - 4545$.


469. A мора бити 1, B мора бити 8, а тада је $C = 0$ и $D = 3$.

470. $x - \left(3\frac{1}{5} + \frac{7}{8}\right) > \left(3\frac{1}{5} - \frac{7}{8}\right)$, односно $x - \frac{163}{40} > \frac{93}{40}$. Према томе, $x > \frac{32}{5}$, tj. $x > 6\frac{2}{5}$.


471. Ако са a обележимо тај природни број, а са q његов остатак при дељењу са 7, тада је $a = 7q + q$, $0 \leq q \leq 6$. Тада је тражени збир једнак $8 \cdot 1 + 8 \cdot 2 + 8 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 8 \cdot 5 + 8 \cdot 6 = 168$.

472. Фигуру делимо као на слици. Површина једног дела је $P = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$, а обим је $O = 4 \cdot 4 = 16$.


473. Ако дечака има $3x$, тада девојчица има $2x$. После доласка 6 дечака стање је: $3x + 6 = 2 \cdot 2x$. Одавде је $x = 6$, па пре доласка 6 дечака у одељењу је било 18 дечака и 12 девојчица.



Сл. уз задатак 472



Сл. уз задатак 474



Сл. уз задатак 478

474. Идеја је да се конструише тачка M' симетрична тачки M у односу на s , јер ће тада права MM' бити тражена нормала. Нека је C пресек праве BM и симетрале s . Тада ће права CA бити симетрична са CB и садржиће тачку M' . Нека је D пресек праве AM и симетрале s . Права BD ће бити симетрична са AD , па ће садржати тачку M' симетричну тачки M . Дакле, M' је у пресеку правих AC и BD , а права MM' је нормална на s .

475. Ако је C_1 средиште хипотенузе, а D подножје висине из C на хипотенузу AB , тада је $\angle C_1CD = 24^\circ$. Како је C_1 центар описане кружнице око троугла ABC , то је $\triangle CAC_1$ једнакокрак, па је $\alpha = \angle CAC_1 = \angle C_1CA = \frac{1}{2}\angle CC_1B$. Сада у правоуглом троуглу CC_1D важи $2\alpha + 24^\circ = 90^\circ$, одакле добијамо $\alpha = 33^\circ$, па је тражени угао једнак $45^\circ - 33^\circ = 12^\circ$.

476. Тражени збир ће бити највећи ако за један од сабирaka, рецимо a , важи $|a| = 2002$. Онда су два друга сабирка $|b| = |c| = 1$, па је највећи могући збир 2004, а добија се на пример за $a = -2002$, $b = 1$, $c = -1$.

477. Како је $140 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7$, именоци тражена три разломка морају да буду 4, 5, 7 (у осталим случајевима нема решења). Сада је $\frac{x}{4} + \frac{y}{5} + \frac{z}{7} = \frac{179}{140}$, односно $35x + 28y + 20z = 179$. Одавде видимо да x мора бити непаран, па се $35x$ завршава цифром 5, а онда $28y$ мора да се завршава цифром 4, па је $y = 3$. Сада се горња једначина своди на $35x + 20z = 95$, а одавде је лако видети да је $x = 1$ и $z = 3$.


478. Нека је у троуглу ABC подножје висине h_a тачка D , B_1 средиште странице AC и E подножје нормале из B_1 на BC (слика). Тада је $B_1E = 2$ cm као средња линија

треугла ADC . Троугао BEB_1 је лако конструисати, затим се продужи BE , преко E , тако да буде $BC = 6$ см, па се повуче права CB_1 и на њој са друге стране од B_1 у односу на C нађе тачка A тако да је $AB_1 = B_1C$. $\triangle ABC$ је тражени троугао.


479. Како је $66 = 11 \cdot 3 \cdot 2$, а број 2002 је делив са 11 и са 2, то је довољно три пута исписати број 2002 један за другим да би се добио број делив са 66.

480. $(x+7)(x+12) - x(x+5) = 364$, а одавде је $x = 20$.

481. Ако посматрамо две дванаестине тог дванаестоугла, није тешко приметити да је то један делтоид са дијагоналама од 1 см (слика). Његова површина је $P_1 = \frac{1}{2}$ см², а површина дванаестоугла је $P = 3$ см².



Сл. уз задатак 481



Сл. уз задатак 482

482. Како је $6^2 + 8^2 = 10^2$, то је дати троугао правоугли. Ако поделимо дати троугао дужима A_1B_1 и A_1C_1 на три дела (на слици су A_1 , B_1 и C_1 редом средишта страница BC , CA и AB), онда ће бар две од четири тачке да буду у једном од та три дела. Растројање између те две тачке које се налазе у једном делу је мање од 5 см.


483. Како је $1 : 14 = 0,0(714285)$, на 2003. месту се налази цифра 2, а на 2102. месту се налази цифра 7, па ће после брисања 99 децимала тај нови број бити већи од почетног, тј. од $1/14$.

484. Дата једнакост се трансформише у $(a^{1001} - 1)^2 + (b^4 - 1)^2 + (c^3 + 1)^2 = 0$, одакле се добијају решења $(a, b, c) = (1, 1, -1)$ и $(a, b, c) = (1, -1, -1)$.


485. Шестоугао $EFIGHJ$ чије су странице EF , FG , GH , HI , IJ и JE све једнаке $\frac{d}{2}$, где је $d = a\sqrt{2}$ дихагонала стране коцке, правилан је јер су му све велике дијагонале FI , EH и GJ међусобно једнаке и једнаке d . Површина омотача је $6 \cdot \frac{3a^2}{8}$, а површина основе је $6 \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 \sqrt{3}$, па је тражена површина пирамиде $\frac{3a^2}{4}(3 + \sqrt{3})$.

486. Четвороцифрених бројева са различитим цифрама чија је прва цифра 3 а последња 1 има укупно $8 \cdot 7 = 56$. Како за избор прве и последње цуфре имамо 15 могућности: $(2, 0)$, $(3, 1)$, $(1, 3)$, $(4, 2)$, $(2, 4)$, $(5, 3)$, $(3, 5)$, $(6, 4)$, $(4, 6)$, $(7, 5)$, $(5, 7)$, $(8, 6)$, $(6, 8)$, $(9, 7)$, $(7, 9)$, то ће тражених четвороцифрених бројева бити 840.

487. Дата једначина одређује дужи које чине ромб површине $P = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} = \frac{154 \cdot 26}{2} = 2002$ (слика).



Сл. уз задатак 487



Сл. уз задатак 489

488. Ако ставимо да је $2002 = n$, тада је

$$\begin{aligned} & 1999 \cdot 2000 \cdot 2001 \cdot 2003 \cdot 2004 \cdot 2005 + 36 \\ &= (n-3)(n-2)(n-1)(n+1)(n+2)(n+3) + 36 \\ &= (n^2-1)(n^2-4)(n^2-9) + 36 = n^2(n^4-14n^2+49) \\ &= [n(n^2-7)]^2. \end{aligned}$$

489. Тачке D и E су на кругу пречника AF са центром у средишту те дужи (слика). Углови FDE и FAE су једнаки као периферијски углови над истим луком EF . С друге стране $\triangle ABE \cong \triangle DCE$ (СУС), па су углови CDE и EAB једнаки. Према томе, $\angle EAB = \angle CDE = \angle FAE$.

490. Нека су a и b тражени бројеви такви да је $10 \leq a < 100$ и $100 \leq b < 1000$. Тада је $1000 \leq ab < 100000$. Према томе $ab = 2222 = 2 \cdot 11 \cdot 101$ или $ab = 22222 = 2 \cdot 41 \cdot 271$, па су могућа четири решења: $a = 11$, $b = 202$; $a = 22$, $b = 101$; $a = 41$, $b = 542$ и $a = 82$, $b = 271$.

491. Троугао MNC је једнакокрак (дато у задатку) и правоугли, тј. $\angle MCN = 90^\circ$ (јер су MC и NC симетрале унутрашњег и спољашњег угла код темена C троугла ABC) па је $\angle CMN = \angle CNM = 45^\circ$. Сада је $\frac{1}{2}\angle ACB + \angle ABC = \angle NMC = 45^\circ$, јер су у троуглу MBC углови MBC и BCM унутрашњи и несуседни углу NMC . Значи, $\frac{7}{2}\angle ABC + \angle ACB = 45^\circ$, тј. $\angle ABC = 10^\circ$, па је $\angle BCA = 70^\circ$ и $\angle BAC = 100^\circ$.


492.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 6} + \cdots + \frac{1}{2000 \cdot 2002} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{2 \cdot 4} + \frac{2}{4 \cdot 6} + \cdots + \frac{2}{2000 \cdot 2002} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{4-2}{2 \cdot 4} + \frac{6-4}{4 \cdot 6} + \cdots + \frac{2002-2000}{2000 \cdot 2002} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2000} - \frac{1}{2002} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2002} \right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4004} < \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

493. У задатку је дато $\angle MAN = \angle BAN = \alpha$. Продужимо страницу BC преко B до тачке M' тако да је $BM' = DM$. Тада је $\triangle ABM' \cong \triangle ADM$ (СУС), па је $\angle MAD = \angle BAM' = 90^\circ - 2\alpha$ и $AM = AM'$. Према томе, $\angle M'AN = 90^\circ - \alpha = \angle M'NA$, па је $\triangle M'AN$ једнакокрак. Значи, $AM = AM' = M'N = M'B + BN = DM + BN$.

494. Од тих 30 узастопних природних бројева 15 је парних, 5 оних који су деливи са 3, а нису деливи са 2, и још 2 који су деливи са 5, а нису деливи ни са 2 ни са 3. Према томе, бар $15 + 5 + 2 = 22$ броја су сложена, па простих не може бити више од 8.

495. $m^n < 1000^{999} = 10^{3 \cdot 999} < 10^{2999}$, што је најмањи природан број са 3000 цифара.



Сл. уз задатак 496

496. Унутрашњи угао правилног деветоугла је 140° , па је (слика) $\angle A_2A_1A_9 = 140^\circ$, $\angle A_1A_2A_9 = \angle A_1A_9A_2 = 20^\circ$ и $\angle A_3A_2A_9 = \angle A_2A_9A_8 = 120^\circ$. Како је четвороугао $A_3A_8A_9A_2$ тетиван, то је $\angle A_2A_3A_8 = \angle A_9A_8A_3 = 60^\circ$, а троуглови AA_3A_8 и AA_2A_9 су једнакостранични. Према томе, $A_2A_3 = AA_3 - AA_2 = A_3A_8 - A_2A_9$, што је и требало доказати (A_3A_8 је најдужа, а A_2A_9 најкраћа дијагонала).

497. Из $a^2 + b^2 = (a + b - c)^2$ следи $a^2 = (a + b - c)^2 - b^2 = (a - c)(a + 2b - c)$. Према томе, $a^2 + (a - c)^2 = (a - c)(a + 2b - c + a - c) = 2(a - c)(a + b - c)$. Слично добијамо и да је $b^2 + (b - c)^2 = 2(b - c)(a + b - c)$. Сада је

$$\frac{a^2 + (a - c)^2}{b^2 + (b - c)^2} = \frac{2(a - c)(a + b - c)}{2(b - c)(a + b - c)} = \frac{a - c}{b - c}.$$

498. Очигледно је $AC = \sqrt{3}$ и $DM = \frac{\sqrt{6}}{2}$. Како је за троугао ABD тачка E тежиште, то је $DE = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, а $AE = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Према обрнутој Питагориној теореми (јер је $AD^2 = AE^2 + DE^2$), $\angle AED$ је прав.


499. Нека је a_1, a_2, \dots, a_{10} тај низ бројева. Ако би се сви бројеви $a_1 + 1, a_2 + 2, \dots, a_{10} + 10$ завршавали различитим цифрама, онда би цифра јединица броја $(a_1 + 1) + (a_2 + 2) + \dots + (a_{10} + 10)$ била 5 (јер је $0 + 1 + 2 + \dots + 9 = 45$). Међутим, $(a_1 + 1) + (a_2 + 2) + \dots + (a_{10} + 10) = 2 \cdot (1 + 2 + \dots + 10) = 110$, па ће се бар два од бројева $a_1 + 1, a_2 + 2, \dots, a_{10} + 10$ завршавати истом цифром.

500. Како је $2^x = y^2 - 1 = (y - 1)(y + 1)$, то постоје две могућности:


(1) $y + 1 = 2^a$ и $y - 1 = 2^b$ ($a > b$), па је $2 = 2^a - 2^b = 2^b(2^{a-b} - 1)$. Одавде следи да је $2^b = 2$ (јер је $2^{a-b} - 1$ непаран број) и $2^{a-b} - 1 = 1$, тј. $b = 1$ и $a = 2$. Значи, $y + 1 = 2^2$, па је $y = 3$ и $2^x + 1 = 9$, односно $x = 3$.

(2) $y + 1 = -2^a$ и $y - 1 = -2^b$ ($b > a$), па је $2 = 2^b - 2^a = 2^a(2^{b-a} - 1)$. Одавде следи да је $2^a = 2$ (јер је $2^{b-a} - 1$ непаран број) и $2^{b-a} - 1 = 1$, тј. $b = 2$ и $a = 1$. Значи, $y + 1 = -2$, па је $y = -3$ и $2^x + 1 = 9$, односно $x = 3$.

501. Површина правоугаоника је (слика) $P = x\sqrt{2}(5-x)\sqrt{2} = 2x(5-x) = 2(5x-x^2) = \frac{25}{2} - 2\left(\frac{5}{2}-x\right)^2$, а она ће бити максимална када је умањилац минималан, тј. када је $x = \frac{5}{2}$, а тражена највећа могућа површина је $\frac{25}{2} \text{ cm}^2$.



Сл. уз задатак 501



Сл. уз задатак 503

502. Ако жути робот прави x , а зелени y аутомобила за један дан, онда је $20x + 30y = \frac{80}{4}$ и $50x + 40y = \frac{230}{6}$. Одавде је $x = \frac{1}{2}$ и $y = \frac{1}{3}$, па ће 160 жутих и 180 зелених робота за

један дан произвести $160 \cdot \frac{1}{2} + 180 \cdot \frac{1}{3} = 140$ аутомобила, односно 1120 аутомобила за 8 дана.

503. Нека је $D \in AB$ и $CD \perp AB$. Означимо OA, OB, OC, CD и OD редом са a, b, c, h и x (слика). Онда је

$$(P_{\triangle AOB})^2 + (P_{\triangle AOC})^2 + (P_{\triangle BOC})^2 = \left(\frac{ab}{2}\right)^2 + \left(\frac{ac}{2}\right)^2 + \left(\frac{bc}{2}\right)^2 = \frac{a^2b^2 + b^2c^2 + a^2c^2}{4}.$$

С друге стране,

$$(P_{\triangle ABC})^2 = \left(\frac{h \cdot \sqrt{a^2 + b^2}}{2}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{c^2 + x^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}}{2}\right)^2 = \frac{a^2b^2 + b^2c^2 + a^2c^2}{4},$$

јер је $\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2} \cdot x = \frac{ab}{2}$, односно $x^2(a^2 + b^2) = a^2b^2$.

504. Ако се нека два квадрата налазе у истој врсти или колони, онда су они подударни. Претпоставимо зато да се свих девет квадрата налазе у различитим врстама и различитим колонама. Означимо са S збир дужина страница тех девет квадрата. Ако је дужина странице полазног квадрата a , тада је „ширина“ преостале колоне, као и „ширина“ преостале врсте $a - S$. У њиховом „пресеку“ добијамо десети квадрат странице дужине $a - S$, што је супротно претпоставци. Према томе, бар два квадрата ће бити у истој врсти или колони.

505. Не умањујући општост, претпоставимо да је $\angle BAC$ већи ос $\angle ABC$. Нека је B'_1 подножје висине из B_1 на AB и E тачка пресека дужи CD и B_1A_1 . Тада је $DC_1 \parallel B_1A_1$, $\triangle AB'_1B_1 \cong \triangle B_1EC$ ($\angle B'_1AB_1 = \angle E B_1 C$, $AB_1 = B_1C$ и $\angle AB'_1B_1 = \angle B_1EC = 90^\circ$), па је $B'_1B_1 = EC$. Како је четвороугао B'_1DEB_1 правоугаоник, то је $B'_1B_1 = DE$, па је $DE = EC$. Онда је $\triangle DEB_1 \cong \triangle B_1EC$ ($DE = EC$, $EB_1 = EB_1$, $\angle DEB_1 = \angle B_1EC = 90^\circ$), па је $B_1C = B_1D$. Како је $C_1A_1 = B_1C$, то је $B_1D = C_1A_1$, па је четвороугао $A_1B_1DC_1$ једнакокраки трапез (очигледно је $\angle A_1B_1D = \angle B_1A_1C$).

506. (а) Како је $\angle FAD = \angle FBC = 150^\circ$ и $AF = AD$, $BF = BC$, троуглови FAD и FBC су једнакокраки и подударни, са угловима при основици од 15° . Следи да је $\angle FDC = \angle FCD = 75^\circ$ и даље $\triangle DCF \cong \triangle BCE$, одакле је $FC = CE$, па је $\triangle FCE$ једнакокрак. Из $\angle BCF = 15^\circ$, $\angle BCE = 75^\circ$ следи $\angle FCE = 90^\circ$.

(б) $\angle FBE = 360^\circ - 225^\circ = 135^\circ$. Даље, $\angle BFE = \angle CFE - \angle CFB = 45^\circ - 15^\circ = 30^\circ$, $\angle FEB = 15^\circ$.

507. За $n = 2$, $n + 2$ је сложен број. За $n = 3$ или $n = 5$ сви елементи датог скупа су прости бројеви (у првом случају то је скуп $\{5, 13, 19, 29\}$, а у другом $\{7, 29, 31, 127\}$). Докажимо да ако је n прост број већи од 5, бар један од елемената датог скупа мора бити сложен. Како је n у том случају непаран и није дељив са 5, он се завршава са 1, 3, 7 или 9. У првом случају се $n^2 + 4$ завршава са 5, у другом се $n + 2$ завршава са 5, у трећем се $n^3 + 2$ завршава са 5, а у четвртом се $n^2 + 4$ завршава са 5, те је у сваком случају бар један од чланова датог скупа делив са 5 (и није једнак 5). Дакле, тражени бројеви су 3 и 5.

508. Од свих природних бројева са траженим својствима најмањи је онај број који има најмање цифара, а међу њима онај чија је прва цифра најмања. Како је $2002 = 9 \cdot 222 + 4$, то тражени број има најмање 223 цифре. Пошто он мора бити делив са 4, његов двоцифрен завршетак је један од бројева 00, 04, 08, ..., 88, 92, 96. Највећи збир цифара има двоцифрен завршетак 88 (тај збир је 16). Збир преосталих цифара је, дакле, $2002 - 16 = 1986$, а како је $1986 = 9 \cdot 220 + 6$, то је тражени број $\underbrace{699\dots99}_{220} 88$.

509. У првом минуту вирус уништи једну бактерију и подели се на два, а преостале бактерије поделе се на по две (398 бактерија). У почетку другог минута сваки од два вируса има наспрам себе по 199 бактерија. У трећем минуту сваки од четири вируса има наспрам себе 198 бактерија. Тај процес се наставља даље, па се на крају 199-ог минута наспрам сваког вируса налази по једна бактерија, а по истеку 200-тог минута бактерије нестају.

510. Из услова задатка добијамо $\alpha = \frac{(m-2) \cdot 180^\circ}{m}$, $\beta = \frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n}$ и $\frac{m-2}{m} : \frac{n-2}{n} = 2 : 3$.

Одавде је $\frac{3(m-2)}{m} = \frac{2(n-2)}{n}$, односно $3n(m-2) = 2m(n-2)$, што се може написати као $6n - mn = 4m$, односно $n(6-m) = 4m$. Дакле, $n = \frac{4m}{6-m}$. Закључујемо да је $3 \leq m < 6$, па је $m \in \{3, 4, 5\}$. Провером се добија да услове задатка задовољавају парови $(m, n) \in \{(3, 4), (4, 8), (5, 20)\}$.

511. Прелијемо сву течност из прве посуде у друге две. Затим прелијмо из друге и треће по 31 течности у прву. Сада већ у првој посуди имамо исту количину од све три боје. Прелијмо сада сву течност из треће посуде у другу. Тиме смо постигли да су и у другој посуди боје изједначене. Даљи поступак је јасан.

512. (а) Јасно је да је $n \leq 2002$ и $S(n) \leq S(1999) = 28$. Према томе је $n \geq 2002 - 28 = 1974$. Бројеви n и $S(n)$ дају исти остатак при дељењу са 9. Како је $2002 \equiv 4 \pmod{9}$, следи да је $n \equiv S(n) \equiv 2 \pmod{9}$. Зато су кандидати за n само 1982, 1991 и 2000. Провером добијамо два решења: $n = 1982$ и $n = 2000$.

(б) Бројеви n , $S(n)$ и $S(S(n))$ дају исти остатак при дељењу са 3. Зато је $n + S(n) + S(S(n)) \equiv 0 \pmod{3}$. Међутим, $2002 \equiv 1 \pmod{3}$. Следи да не постоји природан број n за који важи наведена једнакост.

513. Централни угао $A_1 O A_2$ је 40° , па је $\angle A_1 O N = 60^\circ$, а $\triangle A_1 N O$ је једнакостраничан. Тада је $\angle A_1 S O = 90^\circ$, па тачке M и S припадају кружници k_1 чији пречник је $A_1 O$. Тражени $\angle O M S = \angle O A_1 S$ као периферијски над $O S$. Дакле, $\angle O M S = 30^\circ$.

514. Нека су P и Q редом подножја нормала из B и D на дијагоналу AC и нека је распоред тачака на тој дијагонали, на пример, $A-Q-P-C$. Ако је $AQ = x$, $QP = y$, $PC = z$, $BP = a$ и $DQ = b$, тада је $185 = 4^2 + 13^2 = (x+y)^2 + a^2 + (z+y)^2 + b^2$ и $185 = 8^2 + 11^2 = z^2 + a^2 + x^2 + b^2$. Дакле, $(x+y)^2 + a^2 + (z+y)^2 + b^2 = z^2 + a^2 + x^2 + b^2$, одакле следи $2xy + 2zy + 2y^2 = 0$, тј. $2y(x+y+z) = 0$, што даље због $x+y+z \neq 0$ даје $y = 0$. Значи да се P поклапа са Q , па су дијагонале AC и BD међусобно нормалне. Аналогно се поступа у случају распореда $A-P-Q-C$.

515. Ако је

$$x^2 + 2yz = x, \quad y^2 + 2zx = y, \quad z^2 + 2xy = z,$$

онда је $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx = x + y + z$, па је

$$(x+y+z)^2 - (x+y+z) = 0.$$

Дакле, $(x+y+z)(x+y+z-1) = 0$, па је $x+y+z \in \{0, 1\}$. Тада је $|x+y+z| - \frac{1}{2} \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$, а $\left|x+y+z| - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$.

516. Размотримо разлике $\frac{m}{77} - \frac{n}{13} = \frac{13m - 77n}{1001}$, $\frac{n}{13} - \frac{m}{77} = \frac{77n - 13m}{1001}$. Како је услов да су m и n природни бројеви, уочени разломци ће достићи најмању позитивну вредност


(једнаку 1) под условом да је $13m - 77n = 1$ или $77n - 13m = 1$. Решења једначине $13m - 77n = 1$ су сви парови (m, n) облика $(6 - 77t, 1 - 13t)$, ус услов $t \in \mathbf{Z}$ и $t \leq 0$ (да би m и n били природни). Слично, сва решења једначине $77n - 13m = 1$ су сви парови (m, n) облика $(71 + 77t, 12 + 13t)$, $t \in \mathbf{Z}$, $t \geq 0$.

517. Продужимо BL до пресека са DC у тачки N . Тражену површину можемо изразити помоћу једнакости $P_{LMCD} = P_{\Delta MCN} - P_{\Delta NLD}$, јер су уочени троуглови LBN и ABL подударни. Очигледно је да важи $P_{\Delta LDN} = P_{\Delta ABL}$. Како је $AB = DN = 7$ см и висина LE троугла ABL једнака је висини LF троугла LDN , тј. то су половине висине трапеза, то је $P_{\Delta LDN} = \frac{1}{2}DN \cdot LF = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 2 = 7$ см². Како је AB паралелно са CD , то су троуглови KBM и MCN слични, при чему је $NC : KB = 12 : 4 = 3$. Ако са h_1 означимо висину троугла KBM , а са h_2 висину троугла MCN , добијамо $h_1 + h_2 = 4$, $h_1 : h_2 = 3 : 1$, одакле је $h_2 = 3$ см. Коначно је трајена површина $P_{LMCD} = \frac{12 \cdot 3}{2} - \frac{7 \cdot 2}{2} = 11$ см².


518. Нека су T_1 и T_2 тетраедри ACB_1D_1 и BDA_1C_1 . На свакој страни коцке тачно једна дијагонала квадрата припада тетраедру T_1 , а она друга тетраедру T_2 . Значи, средишта страна коцке M, N, P, Q, R и S су темена две једнакоивичне пирамиде које имају заједничку квадратну основу, која је очигледно двапут мања од стране коцке. Према томе, заједнички део та два тетраедра су те две пирамиде. Једноставним рачунањем се добија да је запремина те две пирамиде једнака шестини запремине коцке, што значи да је запремина коцке шест пута већа од запремине заједничког дела тетраедара T_1 и T_2 .

519. Разлика броја и збира његових цифара увек је дељива са 9. Зато су сви бројеви у низу, осим можда првог, дељиви са 9. Дакле, $a_{12} = 9$. Идући уназад закључујемо да њему претходе редом бројеви 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Број 81 се може добити и из 90 и из 99. Међутим, број 90 се не може добити као разлика неког природног броја и збира његових цифара. Зато броју 81 у низу претходе, редом, бројеви 99 и $a_2 = 108$, а овоме тражени број a_1 . Како a_1 није обавезно дељив са 9, имамо десет решења, и то су природни бројеви од 110 до 119.

520. Продужимо дуж PB за дуж $BZ = AP$ (слика). Троуглови BCZ и APC су подударни, па је $CP = CZ$, односно троугао CPZ је једнакокрак. Како је $CD \perp PZ$, то је тачка D средиште дужи PZ , па је $2PD = PZ = PB + BZ = PA + PB$.



Сл. уз задатак 520



Сл. уз задатак 521

521. Очигледно су тачке B_1, A, B_2 колинеарне (слика). Имамо да је $MO_1 = \frac{1}{2}BB_2 = AO_2$ и $MO_2 = \frac{1}{2}BB_1 = AO_1$, па су троуглови MO_1A и MO_2A подударни, одакле следи да је $\angle MO_1A = \angle MO_2A$. Даље закључујемо да су троуглови MO_1M_1 и MO_2M_2 такође подударни, одакле је $MM_1 = MM_2$.

Из претпоставке $\alpha = \angle AO_1M_1 = \angle AO_2M_2 < 180^\circ$ добијамо $\angle ABM_1 = \alpha/2$ и $\angle ABM_2 = 180^\circ - \alpha/2$, одакле је $\angle ABM_2 + \angle ABM_1 = 180^\circ$, што значи да су тачке M_1 , B и M_2 колинеарне. Према томе, троугао MM_1M_2 је једнакокрак и $\angle MM_1B = \angle MM_2B$.

522. Приметимо најпре да N не може имати више од четири проста делиоца и да је $d_2 = 2$. На основу датих претпоставки мора бити $2 + d_3 \geq d_5 \geq 7$, одакле је $d_4 \geq 5$. Како је $d_4 < d_5 \leq 2 + d_4$, то је $d_5 = 1 + d_4$ (1) или је $d_5 = 2 + d_4$ (2).

У случају (1) имаћемо $d_6 = 2 + d_4$, одакле закључујемо да $3 | N$, па је $d_3 = 3$. Тада и $6 | N$, па је $d_4 = 6$, а онда је $d_5 = 7$, $d_6 = 8$, па $4 | N$ и $d_4 = 4$. Контрадикција.

Остаје случај (2): $d_5 = 2 + d_4$. Размотрићемо следеће могућности:

(а) Ако $4 | N$, због $d_4 \geq 5$ следи $d_3 = 4$, па $8 | N$. Како је $d_6 \geq 8$, мора бити $8 \in \{d_4, d_5, d_6\}$. Сви ови случајеви доводе до контрадикције. За $d_4 = 8$ мора бити $d_5 = 10$, па $5 | N$ и $d_4 = 5$, што је немогуће. За $d_5 = 8$ имаћемо $d_4 = 6$, па $3 | N$, одакле следи $d_3 = 3$, што је немогуће. За $d_6 = 8$ мора бити $d_5 = 7$, односно $d_4 = 5$ и $10 | N$. Међутим, $d_7 = (2 + 5) \cdot 8 = 56 > 10$. Контрадикција.

(б) Пошто N није дељиво са 4, закључујемо да је d_3 прост број. Ако $3 | N$, тада је $d_3 = 3$. Тада $6 | N$, па због $d_4 \geq 6$ мора бити $d_4 = 6$. Онда је $d_5 = 8$, па $4 | N$. Контрадикција. Према томе, 3 не дели N и закључујемо да је $d_3 \geq 5$ и $d_4 \geq 7$.

Како 4 не дели N и $2 + d_4$, закључујемо да је d_4 непаран. Како $2 + d_4$ и d_4 нису дељиви са 3, то је $d_4 = 3k + 2$ за неки цео број k , а како је непаран, то је $d_4 = 6l + 5$ за неко $l \in \mathbf{Z}$. Како је $d_5 \leq 16$, то је $7 \leq d_4 \leq 14$. Једина могућност је $d_4 = 11$ и $d_5 = 13$. Како $2d_3 | N$ и $2d_3 \geq d_4$, то је $d_3 \geq 6$. Пошто је d_3 прост и $d_3 < 11$, мора бити $d_3 = 7$.

Дакле, једино решење задатка је $N = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$.

523. Применом неједнакости између аритметичке и геометријске средине добијамо

$$(1) \quad \left(\frac{1}{b(a+b)} + \frac{1}{c(b+c)} + \frac{1}{a(c+a)} \right)^3 \geq \frac{27}{abc(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

С друге стране, применом исте неједнакости добијамо $\left(\frac{a+b+c}{3} \right)^3 \geq abc$ и

$$\left(\frac{2(a+b+c)}{3} \right)^3 = \left(\frac{(a+b)+(b+c)+(c+a)}{3} \right)^3 \geq (a+b)(b+c)(c+a).$$

Множењем последње две неједнакости добија се

$$\frac{1}{abc(a+b)(b+c)(c+a)} \geq \frac{3^3 \cdot 3^3}{2^3(a+b+c)^6},$$

што заједно са (1) даје тражену неједнакост.

2003. година

524. Ако са A, B, C, D и E означимо количине млека у судовима, тада је $x = A - 12 = B - 19 = C = D = E$. Значи $x = (256 - 31) : 5$, односно $x = 45$. Дакле, $A = 57$, $B = 64$, $C = 45$, $D = 45$, $E = 45$.

525. Обим већег правоугаоника је $O = 2 \cdot 8 + 2 \cdot 6 = 28$ см. Странице мањег правоугаоника су $8 - 2 = 6$ см и $6 - 2 = 4$ см, па је његов обим $O_1 = 2 \cdot 6 + 2 \cdot 4 = 20$ см. Значи разлика је $O - O_1 = 8$ см.

526. Ако са A, B и C означимо дужине првог, другог и трећег тунела редом, тада добијамо $A + B = 1440$, $A + C = 1350$ и $B + C = 1520$. Одавде закључујемо да је $2(A + B + C) = 4310$, односно $A + B + C = 2155$. Према томе $A = 635$, $B = 805$ и $C = 715$.


527. У трећој стотини имамо 50 непарних бројева: 201, 203, ..., 299 и 50 парних: 202, 204, ..., 300. Како је сваки паран број већи од одговарајућег непарног за један ($202 - 201 = 204 - 203 = \dots = 300 - 299 = 1$) то је збир свих парних бројева треће стотине већи за 50 од збира свих непарних бројева треће стотине.

528. Највећи „четвртаст“ број је 4000, а најмањи 1003, па је највећа могућа разлика два „четвртаста“ броја 2997.


529. Постоје четири неподударна правоугаоника чије су странице $a_1 = 1$ см, $b_1 = 24$ см; $a_2 = 2$ см, $b_2 = 12$ см; $a_3 = 3$ см, $b_3 = 8$ см и $a_4 = 4$ см, $b_4 = 6$ см.

530. Очигледно је $\gamma - \beta = 90^\circ$, па је $\alpha = \frac{\gamma - \beta}{3} = 30^\circ$. Како је онда $\beta = 60^\circ$ и $\gamma = 150^\circ$ то је $\alpha + \beta + \gamma = 240^\circ$.

531. Како при дељењу 73 са k добијамо остатак 1, то $k \mid 72$ и слично $k \mid 90$ и $k \mid 108$. Највећи такав број k је највећи зајаднички делилац бројева 72, 90 и 108, тј. $k = 18$.



Сл. уз задатак 532



Сл. уз задатак 534

532. Ако уочимо праву c која је паралелна са правим a и b и садржи теме угла α , она дели угао α на два дела тако да је $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, слика. Како је $\alpha_1 = 40^\circ$ и $\alpha_2 = 50^\circ$ то је $\alpha = 90^\circ$.

533. Ако Петар погреши или не уради један задатак, он губи четири бода. Како он није освојио 24 бода, значи да није урадио тачно 6 задатака. Дакле, тачно је решио 14 задатака.


534. Очигледно је $\angle B_1 DC = \angle BDE = 60^\circ$, $\angle CAB = \angle CBA = 75^\circ$, $\angle CBE = 105^\circ$ и $\angle BED = 15^\circ$, слика.

535. $5\frac{1}{4} - 6,2 - x < 5\frac{1}{4} + 6,2$, одакле је $x > -12,4$. Даље, то је било који број већи од $-12,4$.


536. Као што је $3|x| + 6 \neq 0$ за било које x , то мора бити $2|x| - 6 = 0$. Сада је $|x| = 3$, односно $x = 3$ или $x = -3$.

537. Ако је $q = 2$, тада је $p = 3$. То је једино решење јер ако је q прост и $q \geq 3$, тада би p био паран број и $p \geq 8$, а такав прост број не постоји.

538. Као што је права одређена тачкама A и O симетрала угла BAC , то је $\angle BAO = \angle OAK$, слика. С друге стране, због $AB \parallel KL$ је $\angle BAO = \angle AOK$ па је $\triangle AOK$ једнакокрак и $AK = KO$. На исти начин се може показати да је $\triangle OLB$ једнакокрак и да је $OL = BL$. Према томе, важи $KL = KO + OL = AK + LB$.



Сл. уз задатак 538



Сл. уз задатак 540

539.

$$\frac{(-0,2)^8 \cdot (-0,2)^7}{((-0,2)^6 : (-0,2)^4) \cdot (-0,2)^{10}} = \frac{-(0,2)^{15}}{(0,2)^2 \cdot (0,2)^{10}} = -(0,2)^3 = -0,008.$$


540. Нека је BB_1 тежишна линија троугла ABC , слика. Као што је $BT = 10$ cm, то је $BB_1 = 15$ cm. $\triangle CB_1B$ је правоугли и $BC^2 = BB_1^2 - CB_1^2 = 15^2 - 12^2$, па је $BC = 9$ cm. Сада је $AB = 3\sqrt{73}$ cm, $O = (33 + 3\sqrt{73})$ cm и $P = 108$ cm².

541. Ако би $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ био рационалан број тада би било $\sqrt{5} - \sqrt{3} = \frac{p}{q}$, где су p и q неки природни бројеви. Сада је $\sqrt{5} = \sqrt{3} + \frac{p}{q}$, односно $5 = 3 + 2 \cdot \frac{p}{q}\sqrt{3} + \frac{p^2}{q^2}$. Одавде закључујемо да је $\sqrt{3} = \frac{q}{2p} \left(2 - \frac{p^2}{q^2}\right)$ рационалан број, што знамо да није тачно. Према томе $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ је ирационалан број.


542. Видимо да је $P_{\triangle ABC} = \frac{21 \cdot 28}{2}$ cm², слика. С друге стране,

$$P_{\triangle ABC} = a^2 + \frac{a(21-a)}{2} + \frac{a(28-a)}{2}.$$

Значи, $21 \cdot 28 = 2a^2 + a(21-a) + a(28-a)$, тј. $21 \cdot 28 = 49a$, одакле је $a = 12$ cm. Сада је $x^2 = 9^2 + 12^2$, тј. $x = 15$ cm и $(c-x)^2 = 16^2 + 12^2$, тј. $c-x = 20$ cm.



Сл. уз задатак 542



Сл. уз задатак 544

543. Како је

$$2002^{2002} + 2002^{2001} = 2002^{2001}(2002 + 1) = 2003 \cdot 2002^{2001},$$

и како је


$$2003^{2002} > 2003 \cdot 2002^{2001} \quad (\text{јер је } 2003^{2001} > 2002^{2001}),$$

то је $2003^{2002} > 2002^{2002} + 2002^{2001}$.


544. Ако уочимо квадрат $CBB'A'$ (видети слику), тада је $AB^2 = AC^2 + CB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$, тј. $AB = 5$ см.

545. Како је $\frac{1}{3} \cdot \frac{110}{100} + \frac{1}{4} \cdot \frac{115}{100} + \frac{5}{12} \cdot \frac{95}{100} = \frac{105}{100}$, то значи да добит од 2400 динара представља 5% од набавне цене робе. Дакле, набавна цена робе је 48000 динара.

546. Посматрајмо дијагонални пресек ACC_1A_1 дате коцке, слика. Лако је доказати да је P тежиште троугла ACA_1 , па је онда $A_1O = 3 \cdot OP = 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$. Ако са a означимо дужину ивице коцке и уочимо правоугли троугао AOA_1 , видимо да је $a^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2$, односно $a^2 = 3$ и коначно $P = 6a^2 = 18$.



Сл. уз задатак 546



Сл. уз задатак 550

547. Дати израз је једнак:

$$\begin{aligned} 2^{20} - \sqrt{(1+2^{10})^2(1-2^{10})^2} &= 2^{20} - (1+2^{10})(2^{10}-1) \\ &= 2^{20} - ((2^{10})^2 - 1) = 2^{20} - 2^{20} + 1 = 1. \end{aligned}$$

548. Одмах видимо да је $|x+3| - 3 = x+8$ или $|x+3| - 3 = -x-8$. Прва једначина се своди на $|x+3| = x+11$ из које је $x+3 = x+11$ што нема решења, или $x+3 = -x-11$, тј. $x = -7$. Друга једначина се своди на $|x+3| = -x-5$ из које је $x+3 = -x-5$, тј. $x = -4$, што није решење, или $x+3 = x+5$, што нема решења. Једино решење једначине је $x = -7$.

549. Површина ходника је 6 пута мања (због ширине) и 4 пута већа (због дужине), тј. $(60 \text{ m}^2 54 \text{ dm}^2) : 6 = 10 \text{ m}^2 9 \text{ dm}^2$; $(10 \text{ m}^2 9 \text{ dm}^2) \cdot 4 = 40 \text{ m}^2 36 \text{ dm}^2$.

550. Очигледно је да важи $96 = 6a + 6a + 36$, тј. $a = 5$ см, слика. Обим мањег квадрата је $O = 4a = 20$ см.

551. Ако са x означимо број година Милоша Вујанића, тада Владе Дивац има $x+12$ година, а како је пре 16 година Владе Дивац био три пута старији од Милоша Вујанића, то је $3(x-16) = x+12-16$, односно $3x-3 \cdot 16 = x+12-16$, тј. $3x-2 \cdot 16 = x+12$, одакле је $x = 22$. Према томе, Владе Дивац сада има 34, а Милош Вујанић 22 године.

552. Најмањи непаран четвороцифрен број чији је збир цифара 4 је 1003, а највећи паран троцифрен број чији је производ цифара 16 је 812, па је тражена разлика $1003 - 812 = 191$.

553. Ако са x означимо број поморанџи које је добило свако од троје деце, тада када свако дете поједе по 4 поморанџе добијамо $3(x - 4) = x$, тј. $2x = 12$. Значи, свако дете је добило по 6 поморанџи.

554. (а) То ће бити најмањи троцифрени квадрат простог броја, тј. 121, а скуп његових делилаца је $\{1, 11, 121\}$.

(б) То ће бити најмањи троцифрени број који је производ два различита прости броја и то је 106, а скуп његових делилаца је $\{1, 2, 53, 106\}$.

555. Како је $\alpha + \beta = 90^\circ$, $\alpha + \gamma = 180^\circ$ и $\gamma = 6\beta$, то је $5\beta = 90^\circ$, тј. $\beta = 18^\circ$, а онда је $\alpha = 72^\circ$ и $\gamma = 108^\circ$, па је $\alpha + \beta + \gamma = 198^\circ$.


556. Означимо те две паралелне праве са a и b и нека се на правој a налазе три тачке, а на правој b пет тачака. Ако на правој a уочимо две тачке, а на правој b једну, на тај начин је одређено $3 \cdot 5 = 15$ различитих троуглова. Ако пак на правој a уочимо једну тачку, а на правој b две, на тај начин је одређено $3 \cdot 10 = 30$ троуглова. Значи, укупно је одређено 45 различитих троуглова.

557. Ако са x означимо број динара које је Аца понео, тада је $\frac{x}{2} + 20 + 30 + \frac{x}{3} = x$. Одавде је $x = 300$.


558. $X = \{\text{M,A,T,E,I,K}\}$ и $Y = \{\text{П,О,З,Р,И,Ш,Т,Е}\}$, па је $X \cap Y = \{\text{E,T,I}\}$ и $Y \setminus X = \{\text{П,О,З,Р,Ш}\}$. Како је $S \subset Y$ и $(X \cap Y) \setminus S = \emptyset$, то је $\{\text{E,T,I}\} \subset S$. С друге стране, из $(Y \setminus X) \cap S = \{\text{П}\}$ закључујемо да S садржи П и не садржи слова О,З,Р и Ш. Значи, $S = \{\text{П,Е,Т,I}\}$.

559. Дата једначина је еквивалентна са $\frac{2}{5} \left(\frac{2}{3}x - 1 \right) + \frac{3}{5} = -\frac{9}{4} \cdot \frac{10}{9}$, тј. са $\frac{4}{15}x + \frac{1}{5} = -\frac{5}{2}$, одакле се добија $x = -\frac{81}{8}$.

560. Обележимо половину крака са a , слика. Ако је крак дужи од основице, тада је $15 - a = 2a$, тј. $a = 5$ см, па је основица дужине 7 см, а крак 10 см. Ако је крак краћи од основице, тада је $12 - a = 2a$, тј. $a = 4$ см, па је дужина основице 11 см, а крака 8 см.



Сл. уз задатак 560



Сл. уз задатак 567

561. Ако је $x \geq 3$, тада се дата неједначина своди на неједначину $x - 3 \leq 3 - x$, тј. $x \leq 3$, па је у том случају једино решење $x = 3$. Ако је $x < 3$, неједначина се своди на $3 - x \leq 3 - x$, која је тачна за свако посматрано x . Према томе, решења неједначине су сви цели бројеви $x \leq 3$.

562. Лако се закључује да је угао на основици тог једнакокраког троугла 58° (углови са нормалним крацима). Онда је угао при врху 64° , па је основица највећа страница тог једнакокраког троугла. Као највећа страница она је већа од трећине обима троугла $\frac{2003}{3}$, а то значи и од 667 см.

563. Како је $\frac{4}{3} < \frac{3}{2}$, то се та два кликера премештају са „мање“ на „већу“ гомилу. Ако са x означимо укупан број кликера, онда се на већој гомили налази $\frac{4}{7}x = \frac{20}{35}x$ кликера. Премештањем два кликера на већој гомили ће бити $\frac{3}{5}x = \frac{21}{35}x$ кликера. Дакле, два кликера представљају $\frac{1}{35}x$, одакле добијамо $x = 70$. Значи, на гомилама је било 40 и 30 кликера.

564. Како је $111 = 3 \cdot 37$, то је

$$333^{2003} + 555^{2003} = 111 \cdot (3 \cdot 333^{2002} + 5 \cdot 555^{2002})$$

деливо са 37.

565. Ако је a_1 страница квадрата K_1 , тада је $a_1^2 : a_2^2 = 4 : 3$, тј. $a_2 = \frac{a_1\sqrt{3}}{2}$. Конструкција може да се изведе на следећи начин: над страницом a_1 квадрата K_1 конструишећмо једнакостранични троугао, па над једном његовом висином конструишећмо квадрат. То је тражени квадрат K_2 .

566. Очигледно је $5 \cdot 89 \cdot x^2 = 2002 + 2003$, одакле је $x^2 = 9$, односно $x = 3$ или $x = -3$.

567. Нека је EG средња линија трапеза $ABCD$ и $F = AC \cap EG$, слика. Из $\triangle ACD$ закључујемо да је $CD = 6$ см, а из $\triangle ABC$ да је $AB = 8$ см. Према томе, висина трапеза је $h^2 = 5 - 1 = 4$, тј. $h = 2$ см, а површина $P = 14$ см².

568. (a) Како за $n \geq 2$ важи $n^2 > n(n-1)$, то је и $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)}$.

(6)

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2003}\right)^{2003} &< \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2003}\right)^2 \\ &< \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{2002 \cdot 2003} < \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2002} - \frac{1}{2003} \\ &= 1 - \frac{1}{2003} < 1. \end{aligned}$$

569. Дата једначина је еквивалентна са $0,64x^2 - 0,8x + 0,25 + 0,36x^2 - 1,56x + 1,69 = 4(0,25x^2 - 0,49) - 0,9x - 0,48$, тј. са $-1,46x = -4,38$, одакле се добија $x = 3$.

570. Запремина коцке је $20^3 = 8000$ см³. Ако са d означимо дебљину плоче, тада је $8000 = d \cdot 80 \cdot 50$, односно $d = 2$ см.

571. Тражени број m има што је могуће мање цифара, а то се постиже тако што ће се он завршавати са што је могуће више деветки. Дакле, $m = 5\underbrace{99\dots99}_{222}$. Сада је очигледно

$$m < 6\underbrace{00\dots00}_{222} = 6 \cdot 10^{222}.$$


572. Ако никоје три од тих шест тачака нису колинеарне, тада оне одређују $\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$ правих. Ако су неке три тачке колинеарне, то због услова задатка могу бити само три краја различитих дужи, а тада су и друга три краја такође колинеарна. У том случају број различитих правих је $15 - 2 \cdot 2 = 11$.

573.

$$\begin{aligned} 1 + 5 + 5^2 + 5^3 + \cdots + 5^{2003} &= (1 + 5 + 5^2) + 5^3(1 + 5 + 5^2) + \cdots + 5^{2001}(1 + 5 + 5^2) \\ &= (1 + 5 + 5^2)(1 + 5^3 + 5^6 + \cdots + 5^{2001}) = 31 \cdot (1 + 5^3 + 5^6 + \cdots + 5^{2001}). \end{aligned}$$

574.

$$\begin{array}{r}
 4\ 8\ 3\ +\ 2\ 1 \\
 \hline
 4\ 8\ 3 \\
 9\ 6\ 6 \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 4\ 3
 \end{array}$$



Сл. уз задатак 575

575. Очигледно је $AD = EF = 4\text{ cm}$, па је $AE = DF = 2\text{ cm}$. Онда је $EB = 8\text{ cm}$ па је површина правоугаоника $EBCF = 8 \cdot 4 = 32\text{ cm}^2$.

576. Како је Павле за трећину посла добио 300 динара и улазницу, то значи да би за цео посао добио 900 динара и три улазнице. Значи две улазнице вреде 400 динара, а једна 200 динара.

577. Ако три пута напуни суд од 3ℓ и то сваки пут сипа у суд од 7ℓ , тада ће му у суду од 3ℓ остати 2ℓ воде. То ће одлити у празан суд од 20ℓ . После тога ће још једном напунити суд од 3ℓ и то одлити у суд у коме се већ налазе 2ℓ воде.

578. Како се $8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8$ завршава цифром 6, то ће се и производ 2000 осмица завршавати цифром 6. Сада је лако израчунати да се производ 2003 осмице завршава цифром 2.

579. Прави разломци су $\frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{8}, \frac{3}{5}, \frac{3}{8}$ и $\frac{5}{8}$. Како је највећи од њих $\frac{2}{3}$, а најмањи $\frac{2}{8}$, то је тражена разлика $\frac{2}{3} - \frac{2}{8} = \frac{5}{12}$.

580. Очигледно је

$$\begin{array}{r}
 1\ 5\ * 4\ 4 : * 6 = 4\ * *
 \\ * * 4
 \\ \hline
 1\ 0\ 4
 \\ * 2
 \\ \hline
 3\ 2\ 4
 \\ 3\ 2\ 4
 \\ \hline
 0
 \end{array}$$

Сада је јасно да је последња цифра количника 9 (јер је могуће само 4 или 9, а 4 није јер је $*6 \cdot 4$ мање од 15*). Сада се лако добија

$$\begin{array}{r}
 1\ 5\ 4\ 4\ 4 : 3\ 6 = 4\ 2\ 9
 \\ 1\ 4\ 4
 \\ \hline
 1\ 0\ 4
 \\ 7\ 2
 \\ \hline
 3\ 2\ 4
 \\ 3\ 2\ 4
 \\ \hline
 0
 \end{array}$$

581. Како α и β имају паралелне краке, то су могућа два случаја:

(I) $\alpha = \beta$, па је тада $2\beta - \alpha = \alpha = 2003' = 33^\circ 23'$ и

(II) $\alpha + \beta = 180^\circ$, па је тада $2\beta - \alpha = 360^\circ - 3\alpha = 259^\circ 51'$.


582. Површина тог папира је $27 \cdot 72 \text{ cm}^2$. Како су сва сечења дозвољена, то је површина највеће коцке једнака $6 \cdot 18 \cdot 18 = 27 \cdot 72 \text{ cm}^2$, а ивица те коцке је 18 cm.

583. Дати скуп можемо поделити на 50 подскупова са једнаким збиром и то су $\{99\}, \{1, 98\}, \{2, 97\}, \dots, \{49, 50\}$. Сада ако направимо унију било којих 25 подскупова, на пример $A = \{1, 2, 3, \dots, 24, 75, 76, \dots, 98, 99\}$ тада ће бити $B = \{25, 26, \dots, 73, 74\}$.


584. Како је $-\frac{33}{4} < 3x < \frac{27}{5}$, то је $-\frac{11}{4} < x < \frac{9}{5}$, па је скуп A целих бројева који задовољава ове услове дат са $A = \{-2, -1, 0, 1\}$. Слично, други услов се своди на $-\frac{9}{5} < x < \frac{11}{4}$, па је скуп B целих бројева који задовољавају овај услов дат са $B = \{-1, 0, 1, 2\}$. Према томе, $A \cup B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ и $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$.

585. Збир бројева $-n, -n+1, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n-1, n$ (има их непаран број) је нула, па се задатак своди на то да ли могу да се одреде 2 узастопна броја (који следе после n) чији је збир 2003. То су очигледно бројеви 1001 и 1002. Према томе, тражени бројеви су $-1000, -999, \dots, -1, 0, 1, \dots, 999, 1000, 1001, 1002$.

586. $\triangle ASB$ је једнакокрак, па је $\angle SAB = \angle ABS = \angle SBC$, слика. Из $\triangle ABD$ закључујемо да је $\angle SAB + \angle ABS + \angle SBC = 90^\circ$, па је $\angle ABC = 60^\circ$.



Сл. уз задатак 586



Сл. уз задатак 588

587. Не може јер му је за то потребно 8 различитих збирива, а има их само 7 и то:
 $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 3 \cdot \frac{1}{3}, \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{1}{2}, \frac{1}{2} = 3 \cdot \frac{1}{6}, \frac{7}{6} = 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2}, \frac{4}{3} = 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3},$
 $\frac{5}{6} = 2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 2 \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2}$ и $\frac{2}{3} = 2 \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$.

588. Ако страницу AB продужимо преко A тако да је $AD = AC$, а преко B тако да је $BE = BC$, добијамо $\triangle DEC$ чија је страница $DE = 10 \text{ cm}$, $\angle CDE = \frac{\alpha}{2} = 30^\circ$ и $\angle DEC = \frac{\beta}{2} = 22^\circ 30'$, слика. Тада конструисати, а тражени троугао добијамо када конструишемо симетралу странице DC , па у пресеку са DE добијамо A . Слично налазимо и теме B .

589. Како је број дијагонала правилног n -тоугла $\frac{n(n-3)}{2}$, то је $n(n-3) = 504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7 = 21 \cdot 24$. Према томе, $n = 24$.

590. Хипотенуза овог троугла је 10 cm , а полупречник уписаног круга $r = \frac{8+6-10}{2} = 2 \text{ cm}$. Површина квадрата уписаног у овај круг је $P = 8 \text{ cm}^2$.

591. Како је $\frac{a-b\sqrt{2003}}{b-c\sqrt{2003}} = r$, $r \in \mathbb{Q}$ то је $a-b\sqrt{2003} = r(b-c\sqrt{2003})$. Сада је $a-rb = (b-rc)\sqrt{2003}$. Како је $\sqrt{2003}$ ирационалан, ово је могуће једино за $a-rb = b-rc = 0$, односно $r = \frac{a}{b} = \frac{b}{c}$. Одавде је $b^2 = ac$.

592. Петоцифрених бројева има $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$. Производ њихових цифара је или паран или непаран број. Производ ће бити непаран ако су му све цифре непарне. Таквих бројева има $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$, па петоцифрених бројева чији је производ цифара паран има $9 \cdot 10^4 - 5^5$.

593. Број 2^k је најмање четвороцифрен ако је $k \geq 10$. Ако би тај број имао последње четири цифре једнаке, онда га можемо записати у облику $2^k = 10000 \cdot A + \overline{aaaa}$. Међутим $16 \mid 10000$, а број $\overline{aaaa} = a \cdot 1111$ није дељив са $16 = 2^4$, па онда 2^k ($k \geq 10$) не би било дељиво са 16. Дакле, 2^k ($k \geq 10$) не може имати једнаке последње четири цифре.

594. Ако је већи дијагонални пресек квадрат, тада је $H = 2a$, где је a странница основе, а H висина. Како је дужина мање дијагонале једнака двоструком висини једнакостраничног троугла странице a , то је $a = \frac{10\sqrt{3}}{3}$ см. Сада је $V = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot 2a = 1000$ см³.

595. Пре свега је

$$2003^{2003} - 2003 = 2003 \cdot (2003^{2002} - 1) = 2003(2003^{1001} - 1)(2003^{1001} + 1).$$

Како 2003^{1001} није дељиво са 3, то ће један од његових суседа бити дељив са 3, па је и $2003^{2003} - 2003$ дељиво са 3.

596. I начин. Како је $CA \parallel GE$ то је $P_{\triangle CGE} = P_{\triangle AGE} = 50$ см² (треуглови са једнаким висинама и основицама).

II начин. Ако је $AB = x$, тада је

$$P_{ABCE} = \frac{(x+10) \cdot x}{2}, \quad P_{\triangle ABG} = \frac{(x+10) \cdot x}{2}, \quad \text{и} \quad P_{\triangle CGE} = 50 \text{ см}^2.$$

Сада је $P_{\triangle AGE} = P_{ABCE} + P_{\triangle CGE} - P_{\triangle ABG} = 50$ см².

597. Јединица може да буде уписана или у трећи квадратић (тада имамо 6 могућности: 32154, 43152, 42153, 54132, 53142 и 52143) или у пети квадратић (тада имамо 3 могућности: 54231, 53241 и 43251). Дакле, имамо укупно 9 могућности.

598. Девет двоцифрених бројева који се могу јавити у том низу су 17, 34, 51, 68, 85, 23, 46, 69, 92 и они се сви завршавају различитим цифрама, тако да су, на пример, последњих 14 цифара тог низа

$$\dots \underbrace{6 \ 92346 \ 92346}_{220} 851.$$


Видимо да су последње три цифре 851 и да се блокови од по 5 цифара понављају, па како низ има укупно 2003 цифре, то ће прва цифра бити 9.

599. Како је $1 + 2 + \dots + n = 1001 \overline{abc}$, односно $\frac{1}{2}n(n+1) = 1001 \overline{abc}$, то је $n(n+1) = 1001 \cdot (2 \cdot \overline{abc})$, па је једна могућност да је $2\overline{abc} = 1002$, тј. $\overline{abc} = 501$ и $n = 1001$.


600. Уочимо $M \in BB'$ тако да је $CM \perp BB'$, слика. Тада је четвороугао $CC'B'M$ правоугаоник и $CC' = B'M$. С друге стране, троуглови BMC и $AA'D$ су подударни ($\angle A' = \angle M = 90^\circ$, $BC = AD$ и $\angle ADA' = \angle BCM$ као углови са паралелним крацима) па је $BM = AA'$. Сада је $AA' + CC' = BM + MB' = BB'$.

601. (a) Најмањи број је онај који има најмање цифара, па ће тражени број имати 223 цифре (јер је $2003 : 9 = 222(5)$). Како је потребно да број буде дељив са 4, то ће најповољније бити да му двоцифрени завршетак буде 88, јер је међу свим повољним двоцифреним завршечима тада највећи збир ($8 + 8 = 16$). Значи, тражени број је $\underbrace{799 \dots 99}_{220} 88$.

(б) Број би требало да има што је могуће више цифара (различитих од нуле), јер је сваки n -тоцифрени број већи од сваког k -тоцифреног броја за $k < n$. Како број мора бити дељив са 4, то је тражено решење $\underbrace{11 \dots 11}_{2001} 2$.



Сл. уз задатак 600



Сл. уз задатак 602

602. Троугао ABD је једнакокрак, па висина BE полови страницу AD . Како се дијагонале паралелограма међусобно полове, то је пресек T дужи BE и OA тежиште треугла ABD . Даље, хипотенуза AT већа је од катете AE , па је

$$\frac{1}{2}AD = AE < AT = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}AC\right),$$

односно $3AD < 2AC$.


603. Како је A први, то A мора имати више од 97 поена, тј. A има 98, 99 или 100 поена. Ако A има 98 поена, тада B и C заједно имају 187 поена, а D има 95 поена и он је четврти. B (или C) тада мора имати 97 поена, а тада C (или B) има 90 поена, што по претпоставци није могуће.

Ако A има 99 поена, тада B и C имају заједно 186 поена, а D 96 поена колико има и E , што је такође немогуће.


И коначно, ако A има 100 поена, B и C имају заједно 185, па тада D има 97 поена и друго место, а B и C могу имати 92 и 93 поена (или обратно) па су могућа два поретка: A, D, E, B, C и A, D, E, C, B .

604. Како је $n = 2^{2003} \cdot (2^5 - 2^3 + 1) = 2^{2001} \cdot 100$, то је због $(2^4)^{500} = \dots 6$, тј. $2^{2001} = \dots 2$, очигледно да је 200 троцифрен завршетак броја n .

605. Очигледно је $\triangle EDC$ једнакокрак, па за $\angle ECD = \angle EDC = \varphi$ је $\angle AED = 2\varphi$, слика. С друге стране, $\angle ACD = \varphi$ је периферијски угао над тетивом AD , па је одговарајући централни угао $\angle AOD = 2\varphi$. Према томе, $\angle AED = 2\varphi = \angle AOD$.



Сл. уз задатак 605



Сл. уз задатак 607

606. Нека је $k \in \mathbf{Z}$ тако да је $r + \sqrt{3} = k$. Тада је $r = k - \sqrt{3}$ и $\frac{1}{r} = \frac{1}{k - \sqrt{3}} = \frac{k + \sqrt{3}}{k^2 - 3}$.
Како је

$$\frac{1}{r} - \sqrt{3} = \frac{k + \sqrt{3}}{k^2 - 3} - \frac{k^2 - 3}{k^2 - 3}\sqrt{3} = \frac{k + (4 - k^2)\sqrt{3}}{k^2 - 3}$$

што број, то је, пре свега, $4 - k^2 = 0$, па је $k = 2$ или $k = -2$, а то значи $r = 2 - \sqrt{3}$ или $r = -2 - \sqrt{3}$.

607. Ако спојимо тачке A и N , односно M и C добијамо да је $P_1 = P_{\triangle ASN} = P_{\triangle AMS}$ ($NS = SM$ и једнаке висине) и слично $P_2 = P_{\triangle NSC} = P_{\triangle MSC}$. На сличан начин $P_{\triangle MBC} = P_{\triangle AMC} = P_1 + P_2$ односно $P_{\triangle AND} = P_{\triangle ANC} = P_1 + P_2$, па је коначно

$$P_{\triangle ABC} = 2(P_1 + P_2) = P_{\triangle ACD}.$$

608. (а) Нека је збир бројева у једном од троуглова једнак m . Ако са $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ означимо те бројеве од 1 до 9 тада ће важити


$$2(a+b+c+d+e+f) + 3(g+h+i) = 7m,$$

Tj.

$$\underbrace{(g+h+i)}_m + 2(a+b+c+d+e+f+g+h+i) = 7m,$$

одакле је $2 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} = 6m$, односно $m = 15$.

(б) Једно могуће решење је




Сл. уз задатак 608

609. Како је $2003 \equiv 2 \pmod{3}$, то је $2003^2 \equiv 1 \pmod{3}$. С друге стране, $2^{2003} = 4^{1001} \cdot 2$ и како је $4 \equiv 1 \pmod{3}$, то је $4^{1001} \equiv 1 \pmod{3}$, па је коначно $2^{2003} \equiv 2 \pmod{3}$. Сада је $2003^2 + 2^{2003} \equiv 0 \pmod{3}$, тј. $2003^2 + 2^{2003}$ је дељиво са 3.


610. Како је $2\alpha + 2\beta = 180^\circ - \alpha$, то је

$$\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 180^\circ - \left(90^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = 90^\circ + \frac{\alpha}{2},$$

слика. Нека је тачка $D \in AB$ таква да је $\angle BCD = \alpha$. Тада је $\angle ACD = 90^\circ - \frac{\alpha}{2} = \angle ADC$, па је $\triangle ADC$ једнакокрак и $AD = AC = b$. Очигледно је $\triangle ABC \sim \triangle BCD$, па је $BC : BD = AB : CB$, тј. $a : (c - b) = c : a$, одакле се добија да је $a^2 + bc = c^2$.



Сл. уз задатак 610



Сл. уз задатак 612

611. Kako je $\frac{x^2 + 2003}{x + 2003} = \frac{x^2 - 2003^2 + 2003^2 + 2003}{x + 2003}$, to je

$$\frac{x^2 + 2003}{x + 2003} = x - 2003 + \frac{2003 \cdot 2004}{x + 2003} = x - 2003 + \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 167 \cdot 2003}{x + 2003}.$$

Значи, $\frac{x^2 + 2003}{x + 2003} \in \mathbf{Z}$ за $\frac{2^2 \cdot 3 \cdot 167 \cdot 2003}{x + 2003} \in \mathbf{Z}$, тј. када је $x + 2003$ делилац броја $2^2 \cdot 3 \cdot 167 \cdot 2003$. Према томе, у скупу \mathbf{Z} , x може узети $2 \cdot (3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 48$ различитих вредности.

612. Нека су E и F средишта ивица AB и CD , респективно, слика. Очигледно је да је $EF \perp CD$ и $VF \perp CD$. Даље, $\triangle EFV$ је једнакокрак и $\angle EFV = 60^\circ$ (угао на основици), па је онда он једнакостраничан. Нека раван α садржи ивицу AB и нека је нормална на бочну страну CDV . У том случају раван α садржи нормалу из тачке E на бочну страну CDV , тј. садржи висину једнакостраничног троугла EFV . Према томе, раван α ће садржати и средњу линију троугла DCV , па је пресек равни α и пирамиде трапез чије су основице 10 cm и 5 cm , а висина $5\sqrt{3}\text{ cm}$. Дакле, тражена површина је $\frac{75\sqrt{3}}{2}\text{ cm}^2$.

613. Означимо производ бројева у првој групи са A_1 , другој са A_2 итд. Ако претпоставимо супротно, тј. да је

$$A_i \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{1000} \quad \text{3a} \quad i = 1, 2, 3, 4, 5,$$

тада би важило да је $A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{5000}$, што је немогуће јер је

$$A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+2+\dots+100} = \left(\frac{1}{2}\right)^{5050} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{5000}.$$

614. Очигледно је да се 1^{2003} , 5^{2003} и 6^{2003} завршавају редом цифрама 1, 5 и 6. Непаран степен броја 4 односно броја 9 увек се завршава цифром 4 односно 9. На крају, бројеви 2 и 3 степеновани бројем облика $4k + 3$ увек се завршавају цифром 8 односно 7. Према томе, тражени број се завршава нулом јер је $1 + 8 + 7 + 4 + 5 + 6 + 9 = 40$.

615. Нека су a, b и c странице троугла ABC и $t_a = AD$ тежишна линија. Из $\triangle ABD$ је $t_a > c - \frac{a}{2}$, а из $\triangle ADC$ је $t_a > b - \frac{a}{2}$. Сабирањем ових неједнакости добијамо $2t_a > b + c - a$, тј.

$$(*) \quad t_a > \frac{b+c-a}{2}.$$

Продужимо AD преко тачке D до тачке E тако да је $AD = ED$. Из $\triangle AEC$ је $2t_a < b+c$, тј.

$$(**) \quad t_a < \frac{b+c}{2}.$$

Из $(*)$ и $(**)$ добијамо

$$(1) \quad \frac{b+c-a}{2} < t_a < \frac{b+c}{2}.$$

Аналогно је

$$(2) \quad \frac{a+c-b}{2} < t_b < \frac{a+c}{2} \quad \text{и} \quad \frac{a+b-c}{2} < t_c < \frac{a+b}{2}.$$

Сабирањем релација (1) и (2) добијамо

$$\frac{a+b+c}{2} < t_a + t_b + t_c < a+b+c.$$

616. С обзиром да је $\triangle ABC$ једнакокрак, тачке O и S припадају симетралама углова ACB , $\angle ACB = \gamma$. Дакле, $\angle ACO = \frac{\gamma}{2}$, а како O припада симетралама дужи AC то је $\angle CAO = \angle CAO = \frac{\gamma}{2}$. Из троугла ACD , где је D средиште основице AB следи

$$\angle OAB = 90^\circ - \frac{\gamma}{2} - \frac{\gamma}{2} = 90^\circ - \gamma.$$

Нека је P додирна тачка кружнице $k(S, r)$ са продужетком крака AC . Тада је $\angle OAB = \angle BAS = \angle SAP$ и

$$\angle CAO + \angle OAB + \angle BAS + \angle SAP = 180^\circ,$$

одакле је $\frac{\gamma}{2} + (90^\circ - \gamma) \cdot 3 = 180^\circ$, односно $\frac{5}{2}\gamma = 90^\circ$ и коначно $\gamma = 36^\circ$.

Дакле, $\alpha = \beta = 72^\circ$, $\gamma = 36^\circ$.

617. Означимо са 1 пут који пређе мала казаљка приликом њене ротације за 360° , тј. за чун круг, а пут који је прешла мала казаљка од подеока 12h до траженог времена означимо са x . Тада пут који ће прећи мала казаљка од траженог тренутка до подеока 13h је $\frac{1}{12} - x$, а пут који ће за то време прећи велика казаљка је 12 пута дужи, тј. $1 - 12x$.

Сада је јасно да мора бити $1 - 12x = x$, односно $x = \frac{1}{13}$ пуног круга, односно $\frac{1}{13}$ од 12h , па је резултат задатка 12h и $\frac{12}{13}\text{h}$, тј. $12\text{h } 55\text{ min } 23\frac{1}{13}\text{s}$.

618. Нека је p број парова дечак-девојчица који седе заједно. Значи, број ученика у паровима је $2p$, јер је p број дечака у пару и p број девојчица у пару. Нека су m и n бројеви дечака, односно девојчица. Тада је $p = \frac{2}{3}m$ и $p = \frac{3}{5}n$, одакле је $m = \frac{3}{2}p$ и $n = \frac{5}{3}p$. Укупан број ученика у одељењу је $m+n = \frac{19}{6}p$. Сада је $\frac{2p}{19} = \frac{12}{19}$. Дакле, $\frac{12}{6}p$ од укупног броја ученика седи у мешовитим паровима.

619. Нека је $a = \frac{m}{n}$, при чему су m и n узајамно прости природни бројеви. Претпоставимо да је $a + \frac{1}{a} \in \mathbf{Z}$, тј. $a + \frac{1}{a} = k$ ($k \in \mathbf{N}$). Тада је $\frac{m}{n} + \frac{n}{m} = k$, одакле је $m^2 + n^2 = kmn$. Десна страна претходне једнакости је дељива са m , па $m | n$, што је у супротности са претпоставком да су m и n узајамно прости.

620. Означимо са P површину $\triangle ABC$, са P_1 површину $\triangle BCG$, са P_2 површину петоугла $CDEFG$ и са P_3 површину $\triangle AED$. Дата је катета једнакокрако-правоуглог $\triangle ABC$: $a = 1$. Тада је $P = \frac{a^2}{2} = \frac{1}{2}$. Из услова задатка је $P = P_1 + P_2 + P_3 = 5P_3$. Троуглови BGF и AED су једнакокрако-правоугли, па је $FG = FB$ и $ED = EA$, одакле је

$$(1) \quad FG + FE + ED = c = \sqrt{2}.$$

Нека је $BF = a_1$ и $BG = c_1$. Тада је $P_1 = \frac{a_1^2}{2}$, а како је $P_1 = \frac{2}{5}P$ то је $\frac{a_1^2}{2} = \frac{2}{5}\frac{a^2}{2}$, односно $a_1^2 = \frac{2}{5}$, тј. $a_1 = \frac{\sqrt{10}}{5}$ и $c_1 = BG = a_1\sqrt{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. Сада је

$$(2) \quad GC = BC - BG = 1 - \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{5 - 2\sqrt{5}}{5}.$$

Слично, из $\triangle ADE$ је $P_3 = \frac{a_2^2}{2}$ и $P_3 = \frac{1}{5}P$ (при чему $a_2 = ED$), па је $a_2^2 = \frac{1}{5}$, односно $a_2 = \frac{\sqrt{5}}{5}$, а $c_2 = AD = a_2\sqrt{2} = \frac{\sqrt{10}}{5}$, одакле је

$$(3) \quad CD = AC - AD = 1 - \frac{\sqrt{10}}{5} = \frac{5 - \sqrt{10}}{5}.$$

Конечно, сабирањем (1), (2) и (3) добијамо обим петоугла $CDEFG$:

$$\begin{aligned} O &= FG + FE + ED + GC + CD = \sqrt{2} + \frac{5 - 2\sqrt{5}}{5} + \frac{5 - \sqrt{10}}{5} \\ &= \frac{10 + 5\sqrt{2} - 2\sqrt{5} - \sqrt{10}}{5}. \end{aligned}$$

621. Из једнакости $m^2 + n^2 = 2004(a+b)$ следи да је број $m^2 + n^2$ делив са 3, што је могуће једино ако су m и n деливи са 3 (с обзиром да квадрат целог броја при дељењу са 3 може дати само остатке 0 или 1). Међутим, тада су бројеви m^2 и n^2 деливи са 9, па из претходне једнакости закључујемо да је број $a+b$ делив са 3. Како је и број $a-b$ делив са 3, што следи из једнакости $n^2 - m^2 = 2002(a-b)$, то су бројеви a и b деливи са 3.

622. У почетку играч B брише бројеве деливе са 3 све док их има. Кад на табли остану само бројеви који нису деливи са 3 (што ће се десити најкасније после 333. потеза играча B), он наставља да брише бројеве произвољно. Кад на табли остану три броја, на потезу је играч B . Међу та три броја постоје бар два која дају исти остатак при дељењу са 3. Та два броја ће играч B и оставити, а избрисати онај трећи. Тиме постиже победу.

623. Са S_{XYZ} означавамо површину троугла XYZ . Треба доказати да је

$$S_{PAB} + S_{PCD} + S_{PEF} = S_{PBC} + S_{PDE} + S_{PFA}.$$

Сваки од шест троуглова има по једну страницу једнаку страници шестоугла. Означимо дужину те странице са a .

Нека су $h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6$ редом висине из темена P троуглова $PAB, PBC, PCD, PDE, PEF, PFA$. Тада је

$$\begin{aligned} S_{PAB} + S_{PCD} + S_{PEF} &= \frac{ah_1}{2} + \frac{ah_3}{2} + \frac{ah_5}{2} = \frac{a}{2}(h_1 + h_3 + h_5), \\ S_{PBC} + S_{PDE} + S_{PFA} &= \frac{ah_2}{2} + \frac{ah_4}{2} + \frac{ah_6}{2} = \frac{a}{2}(h_2 + h_4 + h_6). \end{aligned}$$

Посматрајмо троугао T_1 чија су темена пресеци правих: $AB \cap CD$, $CD \cap EF$, $EF \cap AB$ и троугао T_2 чија су темена у пресецима правих: $BC \cap DE$, $DE \cap FA$, $FA \cap BC$. Троуглови T_1 и T_2 су једнакостранични и подударни. Нека је њихова висина h . Како је $h_1 + h_3 + h_5 = h$ и $h_2 + h_4 + h_6 = h$, следи тврђење.

624. a, b, c су дужине страница неког троугла ако и само ако постоје реални бројеви $x, y, z > 0$ такви да је $a = y + z$, $b = z + x$, $c = x + y$. Тада је

$$x = \frac{b + c - a}{2} > 0, \quad y = \frac{c + a - b}{2} > 0, \quad z = \frac{a + b - c}{2} > 0,$$

па је дата неједнакост еквивалентна неједнакости:

$$2y \cdot 2x \cdot 2z \leq (y + z)(z + x)(x + y),$$

која је тачна јер је на основу неједнакости између аритметичке и геометријске средине два позитивна броја

$$\frac{y+z}{2} \geq \sqrt{yz}, \quad \frac{z+x}{2} \geq \sqrt{zx}, \quad \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy},$$

односно

$$(y + z)(z + x)(x + y) \geq 2\sqrt{yz} \cdot 2\sqrt{zx} \cdot 2\sqrt{xy} = 8xyz.$$

Напомена. Дата неједнакост важи за произвољне ненегативне бројеве a, b и c (не морају бити мерни бројеви страница троугла), али је доказ нешто тежи.

625. Нека тачке B и M припадају једном, а тачке N и C другом краку датог угла. Како су углови MBP и MAP прави, тачке B, P, A и M припадају истој кружници, па су углови ABP и PMA једнаки као периферијски углови над тетивом AP . Слично, тачке P, C, N и A припадају истој кружници, а углови PAC и PNC су једнаки као углови над тетивом PC . Међутим, угао PMN је једнак угулу PNC (први је периферијски угао над тетивом PN уписане кружнице, а други је угао између те тетиве и тангенте NC), па је $\angle ABP = \angle CAP$.

На исти начин се доказује да је $\angle PCA = \angle BAP$. Према томе, троуглови BPA и APC су слични. Из једнакости $PA : PC = PB : PA$ следи да је $PA^2 = PC \cdot PB$.

626. Како је дијагонала коцке DB_1 пресечна права равни γ и β између којих се тражи угао, то треба уочити неку раван α која је нормална на DB_1 и пресек те равни α са равнинама γ и β одредиће тражени угао. Нека је раван α одређена тачкама A, C, D_1 јер је тада очевидно DB_1 нормално на α . Ако су S и T редом средишта дужи AC и CD_1 , тада је очевидно да су AT и D_1S пресеци равни α са равнинама γ и β . Међутим, AT и D_1S су висине једнакостраничног троугла ACD_1 , па је тражени угао 60° .

627. Из $x + 7y = (x + y) + 6y$ закључујемо да једно од тврђења (c) или (d) лажно. Даље, тврђења (a) и (b) су истинита. Из (b) добијамо $x + y = 3y + 5$. Десна страна ове једнакости није дељива са 3 па 3 није делилац од $x + y$, тј. тврђење (c) је лажно.

Из (a) добијамо $x + 1 = ky$ ($k \in \mathbf{N}$). Уколико ову једнакост уврстимо у (b), добијамо $ky = 2y + 6$, одакле је $y = \frac{6}{k-2}$.

Будући да је $y \in \mathbf{N}$, $k-2 \in \{1, 2, 3, 6\}$. Тада је $y \in \{6, 3, 2, 1\}$. Из $x = 2y + 5$ и $y \in \{6, 3, 2, 1\}$ добијамо $x \in \{17, 11, 9, 7\}$. Даље је

$$(x, y) \in \{(17, 6), (11, 3), (9, 2), (7, 1)\}.$$

Од наведених парова тврђење (d) задовољавају $(17, 6)$ и $(9, 2)$.

628. Дужина траке може бити највише 2003. Поделимо правоугаоник на траке 1×2003 . Прву оставимо целу, другу поделимо на два дела дужина 1 и 2002, трећу на два дела

дужина 2 и 2001 итд. Тако можемо да идемо до 1002. траке коју делимо на делове дужине 1001 и 1002. Дакле, правоугаоник $1002 \cdot 2003$ можемо поделити на траке различитих дужина, при чиму су заступљене све дужине од 1 до 2003. Очигледно је да се за $n < 1002$ правоугаоник може поделити на тражени начин, изостављањем неких трака.

Како је $1 + 2 + \dots + 2003 = 1002 \cdot 2003$, максимална површина правоугаоника који се може покрити тракама неједнаке дужине не може бити већа од $1002 \cdot 2003$. Како је дужина правоугаоника једнака 2003, максимална ширина n не може бити већа од 1002, јер би неке траке биле употребљене више пута. Одговор: $n \leq 1002$.

629. Изаберимо било којих 5 од 11 датих бројева. Међу њима можемо изабрати три броја тако да је њихов збир дељив са три (или имамо три броја са истим остатком или три броја са различitim остатцима). Настављајући овај поступак, од датих 11 бројева можемо изабрати три групе по три броја тако да је у свакој групи збир бројева дељив са три. Сада од те три групе постоје две у којима је збир бројева исте парности, па је збир тих 6 бројева дељив са 6.

630. Очигледно је да је пресек дате равни и коцке $ABCDA_1B_1C_1D_1$ петоугаоним симетричан у односу на праву која садржи теме D_1 и нормална је на NP . Нека су $A' \in AA_1$ и $C' \in CC_1$ тачке пресека те равни и одговарајућих ивица коцке, тј. A' и C' су два преостала темена петоугла $D_1A'NPC'$. Јасно је да је $AA' = CC' = A'C' = AC = a\sqrt{2}$, а није тешко доказати да је $AA' = \frac{a}{3}$. Ако подножје нормале из D_1 на NP означимо са M , а пресек D_1M и $A'C'$ са Q , тада је $D_1M = \frac{a\sqrt{34}}{4}$ и $D_1Q = a\sqrt{\frac{17}{18}}$. Коначно,

$$P_{D_1A'NPC'} = P_{D_1A'C'} + P_{A'NPC'} = a\sqrt{\frac{17}{18}} \cdot a\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3a\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{a\sqrt{17}}{6} = \frac{7a^2\sqrt{17}}{24}.$$

631. Како површина тог дванаестоугла не зависи од распореда његових страница (она се састоји од 6 троуглова типа $R, R, \sqrt{3}$ и 6 троуглова типа $R, R, 4$, где је R полупречник описаног круга), претпоставимо да је он такав да су две суседне странице нису једнаке. Очигледно је да су тада сви троуглови $A_1A_2A_3, A_2A_3A_4, \dots, A_{11}A_{12}A_1$ међусобно подударни и да су сви углови тог дванаестоугла међусобно једнаки (по 150°). Ако продужимо страницу A_2A_3 троугла $A_1A_2A_3$ преко темена A_2 и на њу спустимо нормалу из A_1 , добијамо правоугли троугаоник са оштрим угловима од 60° и 30° . Сада лако налазимо $A_1A_3 = R = \sqrt{31}$, $P_{A_1A_2A_3} = \sqrt{3}$ и

$$P_{A_1A_2\dots A_{12}} = 6\left(\sqrt{3} + \frac{31\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{105\sqrt{3}}{2}.$$

632. Множењем конгруенција $2 \equiv 2 \pmod{2003}$, $4 \equiv 4 \pmod{2003}, \dots, 1000 \equiv 1000 \pmod{2003}$, $1002 \equiv -1001 \pmod{2003}, \dots, 2000 \equiv -3 \pmod{2003}$, $2002 \equiv -1 \pmod{2003}$ добија се

$$A \equiv (-1)^{501} 1001! \equiv -1001! \pmod{2003}.$$

Слично, множењем конгруенција $1 \equiv 1 \pmod{2003}$, $3 \equiv 3 \pmod{2003}, \dots, 1001 \equiv 1001 \pmod{2003}$, $1003 \equiv -1000 \pmod{2003}, \dots, 1999 \equiv -4 \pmod{2003}$, $2001 \equiv -2 \pmod{2003}$ добија се

$$B \equiv (-1)^{500} 1001! \equiv 1001! \pmod{2003}.$$

Сабирањем следи $A + B \equiv 0 \pmod{2003}$, што је и требало доказати.

633.

$$\begin{aligned}
 A + 2B + 4 &= \underbrace{444\dots44}_{2n} + 2 \cdot \underbrace{888\dots88}_n + 4 = 4 \cdot \underbrace{111\dots11}_{2n} + 2 \cdot 8 \cdot \underbrace{111\dots11}_n + 4 \\
 &= 4 \cdot \frac{1}{9} \cdot \underbrace{999\dots99}_{2n} + 2 \cdot 8 \cdot \frac{1}{9} \cdot \underbrace{999\dots99}_n + 4 \\
 &= 4 \cdot \frac{10^{2n} - 1}{9} + 16 \cdot \frac{10^n - 1}{9} + 4 = \frac{4}{9} \cdot (10^{2n} - 1 + 4 \cdot 10^n - 4 + 9) \\
 &= \left(\frac{2(10^n + 2)}{3} \right)^2 = \underbrace{66\dots68^2}_{n-1}.
 \end{aligned}$$

634. Приметимо најпре да $n = 4$ задовољава услове (лако се проверава да су услови задовољени ако 4 тачке формирају неконвексан четвороугао).

Ако скуп од $n \geq 5$ тачака садржи 4 које формирају конвексан четвороугао, тада тачке можемо означити тако да у посматраној изломљеној линији буду обе дијагонале које се морaju сећи. Дакле тада тражени услови нису задовољени.

Остаје још да покажемо да међу било којих 5 тачака у равни можемо изабрати 4 тако да оне формирају конвексан четвороугао. Посматрајмо конвексан омотач скupa од 5 тачака. Случај када то није троугао очигледно не задовољава услове задатка. У случају када је конвексни омотач троугао, унутар њега се налазе још две тачке. Повуцимо праву кроз те две тачке. Та права дели троугао на два дела. Са једне стране те праве морају се наћи два темена троугла, која ће са две унутрашње тачке формирати конвексан четвороугао. Дакле, $n = 4$.

635. (a) Нека је S центар уписаног круга троугла ABC . Тада се дужи AD , BE и CF секу у тачки S . Нека је $\angle BAC = \alpha$, $\angle ABC = \beta$ и $\angle ACB = \gamma$. По условима задатка тада је: $\angle ADE = \angle ABE = \frac{\beta}{2}$, $\angle ADF = \angle ACF = \frac{\gamma}{2}$, па је

$$\angle MDN = \angle ADE + \angle ADF = \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma}{2} = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}.$$

Даље је

$$\begin{aligned}
 \angle CHE &= 180^\circ - (\angle ECH + \angle CEH) = 180^\circ - (\angle EBA + \angle CAD) \\
 &= 180^\circ - \left(\frac{\beta}{2} + \frac{\alpha}{2} \right) = 90^\circ + \frac{\gamma}{2}.
 \end{aligned}$$

Сада је $\angle CHG = 180^\circ - \angle CHE = 90^\circ - \frac{\gamma}{2}$. Из $\triangle CHG$ је

$$\angle HGC = 180^\circ - (\angle CHG + \angle HCG) = 90^\circ - \frac{\gamma}{2},$$

па је троугао CHG једнакокрак. Како код једнакокраког троугла симетрала угла при врху полови основицу, то је тачка M у пресеку дужи CF и ED и $\angle CMD = \angle SMD = 90^\circ$. Аналогно и тачка N је у пресеку дужи DF и BE и $\angle DNB = \angle SND = 90^\circ$. Поншто је $\angle SMD + \angle SND = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, четвороугао $SMDN$ је тетиван, па је

$$\angle SMN = \angle SDN = \frac{\gamma}{2} = \angle SCB \quad \text{и} \quad \angle SNM = \angle SDM = \frac{\beta}{2} = \angle SBC$$

одакле следи да је $MN \parallel BC$. Сада лако рачунамо тражене углове:

$$\begin{aligned}
 \angle NMD &= \angle IGD = \angle GCD + \angle GDC \\
 &= \angle BCD + \angle EDC = \angle BAD + \angle EBC = \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = 90^\circ - \frac{\gamma}{2}
 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned}\angle MND &= \angle GID = \angle IBD + \angle IDB \\ &= \angle CBD + \angle FDB = \angle CAD + \angle FCB = \frac{\alpha}{2} + \frac{\gamma}{2} = 90^\circ - \frac{\beta}{2}.\end{aligned}$$

(б) Аналогно доказу да је $MN \parallel BC$ може се показати да је $PN \parallel AB$ и $PM \parallel AC$. Онда је $\angle MPN = \angle CAB = \alpha$. Како је $\triangle MND$ оштроугли, то се тачка O налази унутар $\triangle MDN$, па је $\angle MON = 2 \cdot \angle MDN = \beta + \gamma$ (однос централног и периферијског угла у кругу описаном око троугла MDN). У четвороуглу $MPNO$ збир наспрамних углова је

$$\angle MPN + \angle MON = \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ,$$

па је он тетиван, тј. тачке O, P, M и N припадају истој кружници.

636. Због $y \leq \frac{1+y^2}{2}$ важи

$$\frac{1+x^2}{1+y+z^2} \geq \frac{1+x^2}{1+z^2 + \frac{1+y^2}{2}}$$

и остала две аналогне неједнакости.

Уводећи смену $a = 1+x^2, b = 1+y^2, c = 1+z^2$,овољно је показати да важи неједнакост

$$(1) \quad \frac{a}{2c+b} + \frac{b}{2a+c} + \frac{c}{2b+a} \geq 1$$

за све $a, b, c > 0$.

Означимо $A = 2c+b, B = 2a+c, C = 2b+a$. Онда је

$$a = \frac{C+4B-2A}{9}, \quad b = \frac{A+4C-2B}{9}, \quad c = \frac{B+4A-2C}{9},$$

односно

$$\frac{C}{A} + \frac{A}{B} + \frac{B}{C} + 4 \left(\frac{B}{A} + \frac{C}{B} + \frac{A}{C} \right) \geq 15.$$

Како је $A, B, C > 0$, последња неједнакост је задовољена јер из неједнакости између аритметичке и геометријске средине следи

$$\frac{C}{A} + \frac{A}{B} + \frac{B}{C} \geq 3 \sqrt[3]{\frac{C}{A} \cdot \frac{A}{B} \cdot \frac{B}{C}} = 3 \quad \text{и слично} \quad \frac{B}{A} + \frac{C}{B} + \frac{A}{C} \geq 3.$$

Напомена. Неједнакост (1) се може доказати и применом Коши-Шварцове неједнакости:

$$\begin{aligned}\frac{a}{2c+b} + \frac{b}{2a+c} + \frac{c}{2b+a} &= \frac{a^2}{2ac+ab} + \frac{b^2}{2ab+bc} + \frac{c^2}{2bc+ac} \\ &\geq \frac{(a+b+c)^2}{3(ab+bc+ca)} \geq 1.\end{aligned}$$


Последња неједнакост се непосредно своди на $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$.

2004. година


637. Највећи тражени петоцифрени број је 98765, а најмањи тражени шестоцифрени број је 102345. Њихов збир је 201110.

638. Ако са x означимо умањеник, наш задатак се своди на решавање једначине $x - 2004 = 5 \cdot 2004$. Према томе $x = 12024$.

639. Ако је површина добијеног квадрата 81 cm^2 , онда је његова страница 9 cm . Одавде израчунавамо да су странице почетног правоугаоника 5 cm и 3 cm . Обим тог правоугаоника је $O = 2 \cdot (5 + 3) = 16 \text{ cm}$.



Сл. уз задатак 639



Сл. уз задатак 642

640. Са 219 цифара, Марија је откуцала 9 једноцифрених бројева, 90 двоцифрених бројева и 10 троцифрених бројева. При том је откуцала $1 + 19 + 11 = 31$ пут цифру 1.

641. „Ширина“ стаклених делова је $80 - 15 = 65 \text{ cm}$, а „висина“ $100 - 15 = 85 \text{ cm}$. Према томе укупна површина стаклених делова је $65 \cdot 85 = 5525$.

642. (а) $A_1B_1 = 1 \text{ cm}$ (б) $A_2B_2 = 11 \text{ cm}$ (в. слику).

643. Двоцифрени бројеви који имају остатак 10 при дељењу са 21 су: 10, 31, 52, 73 и 94.

644. Ако је један од тих комплементних углова x , други је $x + 2004'$. Како је $2004' = 33^\circ 24'$, то је $2x + 33^\circ 24' = 90^\circ$. Одавде је $x = 28^\circ 18'$, а тражени угао је $61^\circ 42'$.

645. Како је $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$, то ће цифре четвороцифрених бројева чији је производ цифара 105 бити: 1, 3, 5 и 7. Тражени бројеви су: 1357, 1375, 1537, 1573, 1735 и 1753.

646. Како је $X \cap \{a, c, d\} = \{a, d\}$, закључујемо да $a \in X$, $d \in X$ и $c \notin X$. Према томе, због $X \subset \{a, b, c, d, e\}$ скуп X може бити $X = \{a, d\}$ или $X = \{a, d, b\}$ или $X = \{a, d, e\}$ или $X = \{a, b, d, e\}$.

647. Јасно је да се ради о бројевима $-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$.

648. Ако са O обележимо пресек тих симетрала, а са D пресек симетрале $\angle ABC$ и странице AC , видимо да треба одредити $\angle AOD$. Како је то спољашњи угао троугла ABO то је $\angle AOD = \frac{1}{2}(\angle BAC + \angle ABC)$. Није тешко видети да је $\angle AOD = 59^\circ 42'$.

649. Очигледно важи $-7(-2 - 3x) > -\frac{49}{7}$, тј. $7(2 + 3x) > -7$. Даљим сређивањем добијамо $x > -1$.

650. Одмах видимо да је $-7 \leq x + 5 \leq 7$, тј. $-12 \leq x \leq 2$. Према томе целобројна решења су $-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2$, а њихов збир је -75 .

651. Очигледно је $\alpha = 80^\circ$, $\beta = 60^\circ$ и $\gamma = 40^\circ$. Сада можемо приметити да је $\triangle ADC$ једнакокрак, тј. $AD = CD$. У троуглу ABD је $AD > BD$ јер се наспрам већег угла налази већа страница. Значи, $CD > BD$, јер је $CD = AC$.

652. Лако се добија да је висина једног троугла $h_1 = 15\text{ cm}$, а другог $h_2 = 48\text{ cm}$. Површина делтоида је $P = \frac{d_1 d_2}{2}$, тј. $P = \frac{40 \cdot 63}{2} = 1260\text{ cm}^2$.

653. Није, јер бесконачни децимални запис овог броја није периодичан.

654. $\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6}}} < 3$ ако је $6 + \sqrt{6 + \sqrt{6}} < 9$, тј. $\sqrt{6 + \sqrt{6}} < 3$. Међутим, $\sqrt{6 + \sqrt{6}} < 3$ ако је $6 + \sqrt{6} < 9$, тј. $\sqrt{6} < 3$, што је очигледно тачно.


$$\mathbf{655.} \quad a = \frac{3\sqrt{501}}{\sqrt{2004}} + \frac{\sqrt{2004}}{\sqrt{2004}} - \frac{3\sqrt{2004}}{\sqrt{2004}} = \frac{3\sqrt{501}}{2\sqrt{501}} + 1 - 3 = \frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2}.$$

656. Како је $P_K = \sqrt{3} \cdot P_T$, тј. $P = \sqrt{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ (a – страница троугла), то је страница x траженог квадрата дата са $x = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Значи, страница траженог квадрата је једнака висини датог једнакостранничног троугла.

Према томе конструкција ће ићи на следећи начин.

(1) Конструишемо једну висину датог једнакостранничног троугла.

(2) Конструишемо квадрат чија је страница добијена висина датог једнакостранничног троугла.



Сл. уз задатак 656

657. Неједначина $\frac{2p - \frac{3}{4}}{1 - \frac{p}{2}} < 1$ се своди на $\frac{10p - 7}{2 - p} < 0$, односно

$$10p - 7 < 0, \quad 2 - p > 0 \quad \text{или} \quad 10p - 7 > 0, \quad 2 - p < 0.$$

Према томе, тражене вредности за p су $p < \frac{7}{10}$ и $p > 2$.

658. Како је пресек квадрат, то је $H = 2a = 8\text{ cm}$. Према томе, $V = H \cdot 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 192\sqrt{3}\text{ cm}^3$.

659. Ако један број означимо са x , други број ће бити $135 - x$, па је тада

$$\frac{35}{100}x = \frac{28}{100}(135 - x).$$

Сада је $5x = 4(135 - x)$ односно $x = 60$. Тражени бројеви су 60 и 75.

$$\mathbf{660.} \quad \sqrt{6 + 2\sqrt{5}} - \sqrt{6 - 2\sqrt{5}} = \sqrt{(1 + \sqrt{5})^2} - \sqrt{(1 - \sqrt{5})^2} = 1 + \sqrt{5} - |1 - \sqrt{5}| = 1 + \sqrt{5} - \sqrt{5} + 1 = 2.$$

661. Разликујемо два случаја:

1° катете су дужине 2 см и $\sqrt{5}$ см, па је дужина хипотенузе 3 см. Тада је $R = \frac{3}{2}$ см, а површина круга $P = \frac{9}{4}\pi\text{ cm}^2$;

2° $\sqrt{5}$ је дужина хипотенузе, па је тада $R = \frac{\sqrt{5}}{2}$ см, а $P = \frac{5}{4}\pi\text{ cm}^2$.

662. $4008 - 2004 : 6 + 6 \cdot 2004 = 4008 - 334 + 12024 = 3674 + 12024 = 15698$.

663. $O = 8 + 12 + 12 + 4 + 8 + 4 + 4 + 4 = 56$, $P = 8 \cdot 12 = 96$.

664. Укупно време свих играча на леду у том мечу је $6 \cdot 30 = 180$ минута. Ако је сваки од 15 играча провео исто време на леду, онда је сваки од играча био у игри $180 : 15 = 12$ минута.

665. Ако је поље шаховске табле (квадрат) странице a , тада је обим правоугаоника $O = 2 \cdot (64a + a)$. То значи да је $130a = 260$, односно да је $a = 2$ см. Сада је површина шаховске табле $P = 64 \cdot a \cdot a = 256$ см².

666. Најмањи „занимљив“ број је 123456789, а највећи је 9876543210. Њихов збир је 9 999 999 999.

667. Значи, за $n \in \mathbf{N}$, важи $\frac{2}{5} < \frac{8}{n} < \frac{4}{5}$. Ово је исто што и

$$\frac{2 \cdot n}{5 \cdot n} < \frac{40}{5 \cdot n} < \frac{4 \cdot n}{5 \cdot n},$$

односно $n < 20$ и $n > 10$. Према томе, $n \in \{11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}$.

668. Очигледно је $\alpha + 60^\circ = 148^\circ$, тј. $\alpha = 88^\circ$.

669. Очигледно је да ће било који четвороцифрен природан број чије су цифре 2, 3, 5 и 8 бити дељив са 3 јер је $2+3+5+8=18$. Да би тај број био дељив са 12, мораће његов двоцифрени завршетак да буде дељив са 4, тј. његов двоцифрени завршетак је облика 28, 32 или 52. Дакле, ти бројеви су 3528, 5328, 8532, 5832, 8352 и 3852. Има их 6.

670. Та два упоредна угла углу α су међусобно једнака и једнака су 4α . Како је $4\alpha + \alpha = 180$, то је $\alpha = 36^\circ$. Мера комплементног угла углу α је $90^\circ - 36^\circ = 54^\circ$.

671. Највећа могућа вредност разломка $\frac{3 * 5 *}{36}$ је

$$\frac{3959}{36} < \frac{3600 + 360}{36} = 110.$$

Најмања могућа вредност разломка $\frac{5 * 3 *}{45}$ је


$$\frac{5030}{45} > \frac{4500 + 450}{45} = 110.$$

Према томе је $\frac{3 * 5 *}{36} < 110 < \frac{5 * 3 *}{45}$.

672. Ова неједначина се своди на $|x| > 3,25$, а њена решења су $x > 3,25$ и $x < -3,25$.

673. (i) Ако $O \in AB$, тада је $C \equiv O$ и одмах $AC = BC$.

(ii) Ако $O \notin AB$, уочимо тачку $C \in AB$ такву да је $OC \perp AB$, слика. Ако сада уочимо $\triangle ACO$ и $\triangle BCO$, лако је видети да су они подударни ($OA = OB$, $OC = OC$ и $\angle OCA = \angle OCB = 90^\circ$). Према томе, $AC = CB$.



Сл. уз задатак 673

-10	11	-7
1	-2	-5
3	-15	6

Сл. уз задатак 676

674. Одмах се види да је $K = 1$, $H = 0$, $A = 2$, и $B = 9$. Ако је $O = 3$ тада је $\Gamma = 5$, а $T = 8$ (или 6) и $L = 6$ (или 8). Ако је $O = 4$ тада је $\Gamma = 6$, а $T = 8$ (или 7) и $L = 7$ (или 8), или $T = 8$ (или 5) и $L = 5$ (или 8). Коначно ако је $O = 5$ тада је $\Gamma = 7$, а $T = 8$ (или 6) и $L = 6$ (или 8).

Сва решења су: $821 + 9631 = 10452$, $621 + 9831 = 10452$, $821 + 9741 = 10562$, $721 + 9841 = 10562$, $821 + 9541 = 10362$, $521 + 9841 = 10362$, $821 + 9651 = 10472$ и $621 + 9851 = 10472$ (има их 8).

675. Одмах се може израчунати $\angle ACB = 75^\circ$. Даље, $\angle AOS = 60^\circ$ (као збир унутрашњих несуседних углова $\triangle AOC$). $\angle OAS$ као угао између симетрала спољашњег и унутрашњег угла $\triangle ABC$ је прав. И коначно $\angle ASO = 30^\circ$.

676. Ако са x означимо вредност у средњем пољу прве врсте, тада одмах можемо добити да је у свакој врсти, колони и дијагонали збир тих бројева $x - 17$. Тада су у последњој врсти редом бројеви $x - 8$, -15 и $x - 5$. Сада је $x - 17 = x - 8 + x - 5 + (-15)$, тј. $x = 11$, односно $x - 17 = -6$. Решење је дато на слици.


677.

$$\sqrt{(-4)^2} + (2^2)^2 \cdot \frac{5^{-8+2\cdot7}}{\left(\sqrt{13 + \sqrt{139 + \sqrt{(-5)^2}}}\right)^3} = 4 + 16 \cdot \frac{5^6}{5^3} = 2004.$$


678. Осенченни део се састоји од четири правоугаоника и једног квадрата. Правоугаоници су дужине 2 cm и ширине $\sqrt{2}$ cm. Према томе, површина осенченог дела је $P = (2^2 + 4 \cdot 2 \cdot \sqrt{2}) = 4(1 + 2\sqrt{2})$ cm².

679. Ако ставимо $x = 2,320042004\dots$, тада је $10x = 23,20042004\dots$, а $100000x = 232004,20042004\dots$. Сада можемо да израчунамо да је $99990x = 231981$, па је коначно $x = \frac{77327}{33330}$.

680. Нека је дат трапез $ABCD$ тако да је $AB = 25$ cm, $BC = 6$ cm, $CD = 15$ cm и $DA = 8$ cm. Ако одредимо $C_1 \in AB$ тако да је $CC_1 \parallel AD$, тада ће $\triangle C_1BC$ имати странице дужине $C_1B = 10$ cm, $BC = 6$ cm, $CC_1 = 8$ cm, па је то на основу обратне Питагорине теореме правоугли троугао. Сада је јасно да је $\frac{h \cdot 10}{2} = \frac{8 \cdot 6}{2}$, тј. $h = 4,8$ cm, односно $P = \frac{25 + 15}{2} \cdot 4,8 = 96$ cm².



Сл. уз задатак 680



Сл. уз задатак 683

681. Како је $5 \cdot 3^{61} = 3 \cdot 5 \cdot (3^3)^{20} = 15 \cdot 27^{20}$ и $3 \cdot 5^{41} = 3 \cdot 5 \cdot (5^2)^{20} = 15 \cdot 25^{20}$, то је очигледно да је $5 \cdot 3^{61} = 15 \cdot 27^{20} > 15 \cdot 25^{20} = 3 \cdot 5^{41}$.

682. Дати разломак је облика $\frac{x}{x+2}$. Из услова задатка имамо да је $\frac{x-1}{x+2-1} = \frac{1}{2}$, а одавде је $x = 3$.

683. Очигледно је $ACMN$ трапез (MN средња линија троугла $A_1B_1C_1$ па је $MN \parallel A_1C_1$, тј. $MN \parallel AC$). Према томе $AC = 12\sqrt{2}$ cm и $MN = 6\sqrt{2}$ cm. Висина трапеза NN_1 је катета троугла AN_1N па је

$$NN_1 = \sqrt{10^2 - (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{82}.$$

Површина траженог пресека је

$$P = \frac{12\sqrt{2} + 6\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{82} = 9 \cdot 2\sqrt{41} = 18\sqrt{41} \text{ cm}^2.$$

684. Одмах се види да је $ab + ac + bc = \frac{abc}{2004}$. Дељењем са $abc > 0$ добијамо

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2004}.$$

685. Очигледно је $AD = BD$ (јер је $\triangle ADE \cong \triangle BDC$), па је $\triangle ABD$ једнакокрак. Из тога следи да је $\angle EDA = \angle ADO = \angle ODB = \angle BDC = 15^\circ$, па су троуглови ADE и ADO једнакокраки и подударни. Значи, $r = a$.

686. Важи

$$\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

Применом ове једнакости дати збир је једнак

$$(\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{p+1} - \sqrt{p}) = \sqrt{p+1} - 1.$$

Сада имамо $\sqrt{p+1} - 1 = n$, $n \in \mathbf{N}$. Одавде је $p+1 = (n+1)^2$, тј. $p = n^2 + 2n$. Ако то запишемо у облику $p = n(n+2)$ онда ће p бити прост број једино када је $n = 1$, тј. $p = 3$.

687. $O = 2 \cdot (12 + 8) + 4 \cdot 4 = 56 \text{ cm}$; $P = 8 \cdot 12 - 4 \cdot 4 = 80 \text{ cm}^2$.

688. Ако је један од тих бројева трећина другог, онда је тај мањи број заправо четвртина збира. Значи један од тих бројева је 2004, а други 6012.

689. A може бити или 1 или 6, док је B свакако 9. Како је $1 + 11 + 911 + 911 < 2000$, то је очигледно $A = 6$.

690. То су $ABC, ACD, ABE, BEC, BEF, EFC, FCH, EGF, FGC, GCH$.

691. Како је $30 = 1 \cdot 30 = 2 \cdot 15 = 3 \cdot 10 = 6 \cdot 5$ то су могућа ова четири решења:

<table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td><td>30</td></tr><tr><td>1</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td></tr></table>	1	1	30	1	30		30			<table border="1"><tr><td>2</td><td>1</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td></tr></table>	2	1	15	2	15		30			<table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td></tr></table>	3	1	10	3	10		30			<table border="1"><tr><td>6</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td></tr></table>	6	1	5	6	5		30		
1	1	30																																					
1	30																																						
30																																							
2	1	15																																					
2	15																																						
30																																							
3	1	10																																					
3	10																																						
30																																							
6	1	5																																					
6	5																																						
30																																							

Сл. уз задатак 691


и слично с истим бројевима, а у другом распореду још одговарајућа четири решења.

692. Нека су α и β углови са паралелним крацима. Тада је $\alpha + \beta = 180^\circ$, тј. $\alpha + \alpha + \frac{1}{2}\alpha = 180^\circ$. Одавде је $\alpha = 72^\circ$, а његов комплемент има 18° .


693. Тражени број је $16q + q = 17q$, па се најмањи тражени број добија за $q = 6$, тј. $17 \cdot 6 = 102$. Највећи тражени број се добија за $q = 15$, јер је 15 највећи остатак при дељењу са 16 – значи $17 \cdot 15 = 255$.

694. Ако је прве године ученик порастао 3 см, тада је четврте порастао 9 см, а друге и треће најмање 4 см, односно 5 см. То је укупно 21 см, што је немогуће јер је укупно порастао 17 см. Ако је прве године порастао 1 см, тада је четврте године порастао 3 см па није могао да укупно порасте 17 см. Значи ученик је порастао прве године 2 см, а четврте 6 см. Да би укупно порастао 17 см недостаје још 9 см. Из услова задатка закључујемо да је друге године порастао 4 см, а треће 5 см.

695. Задатак се може решити пребројавањем на следећи начин: ако је AK једна страна четвороугла, за насприму постоје четири могућности: BL , BM , CL , CM ; ако је AL једна страна четвороугла, за насприму постоје две могућности MB и MC ; за BK такође две: CL и CM и коначно за BL једна – CM .



Сл. уз задатак 695



Сл. уз задатак 698

696. Двоцифрени бројеви који су деливи са 16 су 16, 32, 48, 64, 80 и 96. Ако броју 16 прецртамо цифру 6 добијамо 1, ако у броју 32 прецртамо цифру 3 добијамо 2, ако у броју 64 прецртамо цифру 6 добијамо 4 и коначно ако у броју 96 прецртамо цифру 9 добијамо 6.

697. Са стоваришта је однето прво $\frac{3}{8} \cdot 304t = 114t$ робе, а затим још $\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{5} \cdot 304t = 152t$ робе. На стоваришту је остало $38t$ робе.

698. Троугао BCM је правоугли са оштрим угловима од 30° и 60° . Како је $\triangle DMC$ једнакокраки са углом при врху од 30° , то је $\angle CDM = 75^\circ$.

699. Како је $2004 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 167$, то троцифрени имениоци тих тражених разломака могу бити само $4 \cdot 167$ и $3 \cdot 167$ (јер је $6 \cdot 167 = 1002$). Према томе

$$\frac{17}{2004} = \frac{x}{4 \cdot 167} + \frac{y}{3 \cdot 167}, \quad x, y \in \mathbb{N},$$

па је $17 = 3x + 4y$. Како x мора бити непаран природан број и не може бити нити 1 нити већи или једнак 5, то је $x = 3$. Сада видимо да је $y = 2$.

700. Ако BB_1 продужимо преко B_1 до B_2 тако да је $BB_1 = B_1B_2$, четвороугао $ABC B_2$ је паралелограм. Троугао ABB_2 је лако конструисати јер је $\angle BAB_2 = 120^\circ$, $AB = 4\text{ cm}$ и $BB_2 = 10\text{ cm}$. Тачку C конструисати тако да је $ABC B_2$ паралелограм.

701. Из $M : A = M \cdot A$ одмах закључујемо да је $A = 1$. Сада се наши услови своде на $M = T - E = T : I = K - 1$. Како је $I \neq M$, $M \neq 1$, $I \neq 1$ и $T : I = M$ то је T сложен број и $T \in \{6, 8\}$. Како је $T \neq 6$, јер би тада било $I = 2$, $M = 3$ и $E = 3$ или $I = 3$, $M = 2$ и $K = 3$, то је $T = 8$. Сада је $M = 2$, $I = 4$, $K = 3$ и $E = 6$, јер за $M = 4$, $I = 2$ је $E = 4$.

702. Ако ставимо да је $a + \frac{1}{a} = A$, тада је $a^2 + \frac{1}{a^2} = A^2 - 2$, па је


$$\left(a + \frac{1}{a}\right) \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) = A^3 - 2A = a^3 + \frac{1}{a^3} + a + \frac{1}{a}.$$

Значи, $a^3 + \frac{1}{a^3} = A(A^2 - 3)$. Како је $a + \frac{1}{a} = A > 2$, то је $A^2 - 3 > 1$, па је $a^3 + \frac{1}{a^3}$ сложен број.


703. Троуглови AFF и BCF су подударни и једнакокраки са углом при врху од 48° . Значи $\angle EFA = \angle BFC = 66^\circ$. Сада се лако израчунава $\angle EFC = 168^\circ$.

704. $2^{2004} = 2^4 \cdot 2^{2000} > 10 \cdot (2^{10})^{200} = 10 \cdot 1024^{200} > 10^{601}$. Даље, број има бар 602 цифре, па с обзиром да имамо 10 различитих цифара бар једна мора да се јави 61 пут.


705. Ако уочимо тачку E на AB тако да је $AE = EB = DC$, тада добијамо два паралелограма $AECD$ и $EBCD$, па је $AD = EC = BC = ED = 5$ cm. Сада се лако доказује да су троуглови AED , ECD и EBC једнакокраки и подударни (ССС). Углови тих троуглова су на основици по 75° и при врху 30° , па је висина EF троугла AED једнака $\frac{5}{2}$. Површина овог трапеза је $P = 3 \cdot \frac{5}{4} \cdot 5 = \frac{75}{4}$ cm².



Сл. уз задатак 705



Сл. уз задатак 709



Сл. уз задатак 711

706. Троцифрених бројева са траженом особином има $5 \cdot 9 \cdot 9 = 405$, а четвороцифрених $9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 6561$. Укупно 6966.

707. Одговарајуће апотеме су $h_1 = 3\sqrt{17}$ и $h_2 = 4\sqrt{10}$, па је површина овог тела, тј. најмања количина лима $P = 48(\sqrt{17} + \sqrt{10})$ dm².

708. За сваки позитиван реалан број x важи $x + \frac{1}{x} \geq 2$. У случају да тражени бројеви a, b, c постоје важило би $\left(a + \frac{1}{a}\right) + \left(b + \frac{1}{b}\right) + \left(c + \frac{1}{c}\right) < 6$, што је немогуће.

709. (а) Како су троуглови $AC'H$ и $CA'H$ слични, то ће важити $AH : CH = HC' : HA'$. Ако искористимо оно што је дато, биће $AH = HC'\sqrt{2}$. Из овога закључујемо да је $\angle C'AH = \angle HCA' = \angle ABC = 45^\circ$.

(б) Како је $BC' = CC' = 3HC'$ и $AC' = C'H$ то је $AB : CC' = 4C'H : 3C'H = 4 : 3$.

710. Ако са x означимо број ученика који уче енглески, тада је $20040 - x$ број ученика који уче немачки, па је $\frac{80}{100}(20040 - x) + \frac{20}{100}x = \frac{40}{100} \cdot 20040$, одакле се добија $x = 13360$.

711. Ако са P означимо површину целог паралелограма, а површине троуглова и четвороуглова означимо као на слици, очигледно је $S_2 + S_3 + S_6 = S_5 + S_4 + S_1 = \frac{1}{2}P$ и $S_3 + S_4 = \frac{1}{2}P$.

(а) $S_5 + S_4 + S_1 = S_3 + S_4$, тј. $S_5 + S_1 = S_3$, односно $P_{\Delta EPF} = P_{\Delta FK} + P_{\Delta MBE}$.

(б) $S_2 + S_3 + S_6 = S_3 + S_4$, тј. $S_4 = S_2 + S_6$, односно $P_{BCFE} = P_{AMEP} + P_{PFKD}$.

712. Ако са x обележимо број листова у једној свесци, тада је $\frac{x}{4} + \frac{x}{9} = 26$, тј. $x = 72$.

Број листова ће се смањити за $\frac{26}{144} = 0,1806 \approx 18\%$.

713. Како је $\triangle ABM \cong \triangle ADN$, јер је $\angle ABM = \angle ADN$, $\angle BAM = \angle DAN$ и $BM = DN$, то је онда $AB = AD$ (слика). Ово је довољно да се закључи да су правоугли троуглови ACD и ABC подударни и да су због тога углови CAD и CAB једнаки. Значи, AC је симетрала угла BAD и како је троугао BAD једнакокраки ($AB = AD$) то је $AC \perp BD$, што је и требало доказати.


714. Ако је $x = \overline{abc}$ где је $\overline{abc} = 100a + 10b + c$, то је према услову задатка

$$\overline{abc} + \overline{acb} + \overline{bac} + \overline{bca} + \overline{cab} + \overline{cba} = 3 \cdot \overline{aaa},$$


тј. $222(a+b+c) = 3 \cdot 111 \cdot a$. Одавде је $a = 2b + 2c$, па су могућа решења:

$$a = 6, b = 2, c = 1; \quad a = 6, b = 1, c = 2;$$

$$a = 8, b = 3, c = 1; \quad a = 8, b = 1, c = 3.$$



Сл. уз задатак 713



Сл. уз задатак 715


715. Како је $\angle ABP = \angle PBA_1$, $\angle APB = \angle BPA_1 = 90^\circ$ и BP заједничка страница троуглова ABP и PBA_1 , то је $\triangle ABP \cong \triangle PBA_1$, па је $AB = A_1B$, тј. $2AB = BC$. Сада закључујемо да су мерни бројеви дужина страница троугла ABC 1, 2 и 3 или 2, 3 и 4. Како је $1 + 2 = 3$, то је $AB = 2$ см, $BC = 4$ см и $AC = 3$ см.

716. Не могу се добити сви једнаки бројеви, без обзира колико пута примењивали дозвољену операцију „увећавања“ два броја за по 1“. То је немогуће, јер увећавањем два броја за по један од почетног збира $1 + 2 + \dots + 221 + 222 = 111 \cdot 223$ увек добијамо непаран број, а ако би у једном тренутку сви бројеви били једнаки њихов збир би био $222 \cdot A$, тј. паран број.


$$\text{717. } \underbrace{100\dots0}_{2004} \underbrace{200\dots0}_{2004} 1 = 10^{4010} + 2 \cdot 10^{2005} + 1 = (10^{2005} + 1)^2 = (\underbrace{100\dots0}_{2004} 1)^2.$$

Тражени број је $\underbrace{100\dots0}_{2004} 1$.

718. Нека је R тачка додира праве одређене са BD и кружне линије, а M и N тачке пресека BD са OP и OQ редом. Тада је $\triangle ORM \cong \triangle MBP$ ($PB = OR = r$, $\angle ORM = \angle MPB = 90^\circ$ и $\angle OMR = \angle BMP$) и слично $\triangle ORN \cong \triangle NQD$. Значи, површина правоугаоника $OPCQ$ је једнака површини троугла BCD , а она је 1002 cm^2 .



Сл. уз задатак 718



Сл. уз задатак 720

719. Број који је збир 7 узастопних природних бројева је делив са 7 јер:

$$a + (a + 1) + \dots + (a + 6) = 7a + \frac{6 \cdot 7}{2} = 7(a + 3).$$

Слично је и број који је једнак збиру 11, односно 13 узастопних природних бројева делив са 11, односно 13. Дакле, тражимо број који је делив са 7, 11 и 13, а да није непаран, јер би тада био збир два узастопна природна броја. Дакле, тражени број је $2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = 2002$.

720. Нека је дат квадрат $ABCD$ и нека кружна линија додирује странице AB и AD у тачкама E и F редом. Ако је S центар кружне линије, онда је очигледно да је $AESF$ квадрат (две суседне странице су једнаке и сви углови прави), па је $AS = 10\sqrt{2}$ см.

С друге стране, ако кружна линија сече стране квадрата BC и CD редом у тачкама G и H , троугао HGC је правоугли и HG је пречник тако да C припада кружној линији. Како


је $\angle BAC = \angle EAS = 45^\circ$, то тачке A, S и C припадају једној правој, па је дијагонала квадрата $AC = (10\sqrt{2} + 10)$ см, а површина $P = \frac{1}{2} (10(\sqrt{2} + 1))^2 = 50(3 + 2\sqrt{2})$ см².

721. (а) Бранко и Ратко ће укупно уписати 2003 симбола (+ или ·), па како Бранко почиње игру, то ће он последњи уписати знак + или ·. Бранко увек побеђује, јер ће на крају уписати + ако је претходно добијени број (без последње јединице) био непаран или · ако је претходно добијени број био паран.


(б) Не. Увек побеђује први играч (при оптималној стратегији), јер он ставља последњи знак и тиме одређује парност, односно непарност целог броја.

722. Дато је да је Воја првог дана засадио једну садницу. Онда је другог дана засадио $1 + 1 = 2$, а трећег $2 + 2 = 4$ саднице. четвртог дана ја засадио $4 + 4 = 8$ садница, а петог 7 садница јер је $8 + 8 = 16$ и $1 + 6 = 7$. Шестог дана је засадио 5 садница, јер је $7 + 7 = 14$ и $1 + 4 = 5$. Седмог дана је засадио опет једну садницу (као првог дана) јер је $5 + 5 = 10$ и $1 + 0 = 1$. Сада је јасно да ће осмог дана засадити онолико садница колико је засадио другог дана итд. Према томе, за шест дана засади $1 + 2 + 4 + 8 + 7 + 5 = 27$ садница, а за 60 дана ће засадити свих 270 садница.

723. Према условима датим у задатку $\angle ANM = 90^\circ$, па су онда углови $\angle AND$ и $\angle MNC$ комплементни. Дакле, $\angle AND = \angle NMC$ па важи: $\triangle AND \sim \triangle NMC$. Значи: $CM : CN = ND : DA$, тј. $a : 2b = b : 3a$, тј. $3a^2 = 2b^2$, односно $a : b = \sqrt{2} : \sqrt{3}$. Сада је $BC : AB = 3a : 3b$, тј. $BC : AB = \sqrt{2} : \sqrt{3}$.



Сл. уз задатак 723



Сл. уз задатак 726

724. Нека је тај троцифрен број \overline{xyz} . Из услова задатка имамо:

$$\overline{xyz} + 45 = \overline{xzy}, \quad \text{тј. } 100x + 10y + z + 45 = 100x + 10z + y,$$

односно $y - z + 5 = 0$; и

$$\overline{xyz} - 270 = \overline{yxz}, \quad \text{тј. } 100x + 10y + z - 270 = 100y + 10x + z,$$

односно $x - y - 3 = 0$. Да видимо шта се дешава са разликом

$$\overline{xyz} - \overline{zyx} = 100x + 10y + z - 100z - 10y - x = 99(x - z).$$

Треба нам разлика $x - z$. Како је $x - z = (x - y) - (z - y) = 3 - 5 = -2$, то закључујемо да је $\overline{xyz} - \overline{zyx} = -198$, тј. да се заменом цифара стотина и јединица тај број повећава за 198.

725. Нека је A тражени број и B збир цифара броја A . Како се зна да A и B имају исти остатак при дељењу са 9, тј. да је $A - B$ дељив са 9, то је због $A - B = 2004B - B = 2003B$ и чинијенице да је 2003 прост број, B дељиво са 9. Према томе, број A је најмањи од бројева облика $(9k) \cdot 2004$ чији је збир цифара $9k$.

За $k = 1$ имамо $9 \cdot 2004 = 18036$ и $1+8+3+6 = 18 > 9$, а за $k = 2$ имамо $18 \cdot 2004 = 36072$ и $3+6+0+7+2 = 18$. Дакле, тражени број је $A = 36072$.


726. Ако уочимо на ивици BB' тачку N_1 тако да је $BN_1 = A'N$ (слика), онда ће важити $\triangle ABN_1 \cong \triangle AA'N$ (јер је $AB = AA'$, $A'N = BN_1$, $\angle AA'N = \angle ABN_1 = 90^\circ$), па је $AN_1 = AN$ и $\triangle A'NM \cong \triangle MN_1B'$ (јер је $\angle NA'M = \angle MB'N_1 = 90^\circ$, $B'M = A'N$ и $B'N_1 = A'M$) па је $MN_1 = MN$.

Сада је очигледно да је $\triangle AMN \cong \triangle AMN_1$ (ССС) па важи


$$\angle A'AM + \angle A'AN + \angle MAN = \angle A'AM + \angle BAN_1 + \angle N_1AM = 90^\circ.$$

727. Тражени број не може бити облика pq , где су p и q прости бројеви, јер би тада имао укупно 4 делиоца. Такође, не може бити ни облика p^2q , јер би тада имао 6 делилаца. Повећањем степена са којим неки прост фактор учествује у разлагању датог броја, а такође повећањем броја његових простих фактора, укупан број делилаца се даље повећава. Према томе, тражени број мора бити облика p^n . Како тада он има $n+1$ делилац, то мора бити $n=4$. Једини прост број чији је четврти степен троцифрен је број 5. Дакле, постоји само један број који задовољава услове задатка, а то је 625.

728. На страници AB уочимо тачке E и F такве да је $\angle ADE = 60^\circ$ и $\angle BDF = 40^\circ$ (слика). Тада је $\triangle ADC \cong \triangle ADE$ (заједничка страница AD и на њој једнаки налегли углови од 20° и 60°). Следи да су троуглови ADF , EFD и FBD једнакокраки са основицама (редом) DF , EF и BD . Због тога је $AF = AD$ и $CD = ED = FD = FB$, па је $AD + DC = AF + FB = AB$.



Сл. уз задатак 728



Сл. уз задатак 729

729. Из подударности троуглова DAH и CDE и услова $ED = DF$ следи да је $AH = DE = DF$ (слика), па је $HBCF$ правоугаоник. Дијагонала BF тог правоугаоника је пречник његове описане кружнице. Како је $\angle HGC = 90^\circ$, то тачка G припада тој кружници, па је и $\angle BGF = 90^\circ$.

730. Обележимо тражену дуж AM са x (слика). Тада је у троуглу APM , $AP = \frac{x}{2}$, па је $PB = 12 - \frac{x}{2}$. Из троугла PBQ је $BQ = \frac{1}{2} \left(12 - \frac{x}{2}\right) = 6 - \frac{x}{4}$, па је $QC = 12 - \left(6 - \frac{x}{4}\right) = 6 + \frac{x}{4}$. Из троугла QCR је $RC = 3 + \frac{x}{8}$. Из услова $M = R$ следи $AM + MC = 12$, односно $x + 3 + \frac{x}{8} = 12$, одакле се налази $x = 8$ см.


731. Нека су дати природни бројеви a, b, c, d и e , и нека је

$$\begin{aligned} a+b &= x_1, & a+c &= x_2, & a+d &= x_3, & a+e &= x_4, & b+c &= x_5, \\ b+d &= x_6, & b+e &= x_7, & c+d &= x_8, & c+e &= x_9, & d+e &= x_{10}. \end{aligned}$$


Нека је n најмањи од добијених збирива x_1, x_2, \dots, x_{10} и претпоставимо да су они 10 узастопних природних бројева. Сабирањем претходних једнакости се добија

$$4(a+b+c+d+e) = x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = n + (n+1) + \dots + (n+9) = 10n + 45.$$

Како је лева страна једнакости паран, а десна непаран број, то значи да добијени збирови не могу бити 10 узастопних природних бројева.



Сл. уз задатак 730




Сл. уз задатак 732

732. Нека је $P_{\triangle AMS} = P_1$ и $P_{\triangle CNS} = P_2$ (слика). Тада је $P_{\triangle ABN} = 4P_1 + 2P_3 = \frac{2}{3} \cdot 2004$, $2P_1 + P_2 = 668$. Слично је $P_{\triangle BCM} = 3P_1 + 3P_2 = \frac{3}{4} \cdot 2004$, па је $P_1 + P_2 = 501$. Сабирањем добијених једнакости следи да је $P_{MBNS} = 3P_1 + 2P_2 = 501 + 668 = 1169$.


733. Како је $abc = 1$, то је

$$\begin{aligned} \left(a + \frac{1}{a}\right) \left(b + \frac{1}{b}\right) \left(c + \frac{1}{c}\right) &= abc + \frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} + \frac{a}{bc} + \frac{b}{ca} + \frac{c}{ab} + \frac{1}{abc} \\ &= 2 + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + a^2 + b^2 + c^2 \\ &= \left(a^2 + 2 + \frac{1}{a^2}\right) + \left(b^2 + 2 + \frac{1}{b^2}\right) + \left(c^2 + 2 + \frac{1}{c^2}\right) - 4 \\ &= \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{c}\right)^2 - 4. \end{aligned}$$

734. Нека је констатовано да има k препуних и l осталых аутобуса; нека је у препуним аутобусима x , а у осталим y путника. Тада је $x > 50k$, $y \leqslant 50l$. Ако је $k = 0$ или $l = 0$, проценти поменути у формулацији задатка су међусобно једнаки (и једнаки 0, односно 100). У противном је $\frac{x}{k} > 50 \geqslant \frac{y}{l}$, одакле је $\frac{y}{x} < \frac{l}{k}$. Даље је $\frac{x+y}{x} < \frac{k+l}{k}$, односно $\frac{x}{x+y} > \frac{k}{k+l}$. Дакле, проценат путника у препуним аутобусима (број који је добио Раде) је већи од процента препуних аутобуса (броја који је добио Воја).



Сл. уз задатак 735



Сл. уз задатак 736

735. Нека је $\angle DAM = x$ (слика). Тада је из једнакокраког троугла AMD , $\angle AMD = 90^\circ - \frac{x}{2}$, а из, такође једнакокраког, троугла ANM је $\angle MAN = 90^\circ - x$ и $\angle AMN =$


$45^\circ + \frac{x}{2}$. Са обзиром да је $\angle DMA + \angle AMN + \angle NMB = 180^\circ$, следи да је $\angle NMB = 180^\circ - \left(90^\circ - \frac{x}{2}\right) - \left(45^\circ + \frac{x}{2}\right) = 45^\circ$. С друге стране, $\triangle NBC$ је једнакокраки и правоугли, па је $\angle NCB = 45^\circ$. Дакле, $\angle NMB = \angle NCB$, па је четвороугао $NBCM$ тетивни. Зато је $\angle BMC = \angle BNC = 45^\circ$.

736. Из услова задатка следи да у једној колони може бити изабран само један квадрат. Како треба изабрати 2004 квадрата, то значи да треба изабрати 2004 колоне од могућих 2005, односно једну колону треба изоставити. Ако се изостави прва колона, онда постоје две могућности за избор квадрата из друге колоне, а тиме је одређен избор свих осталих. Још две могућности постоје ако се изостави последња колона. Међутим, ако се изостави једна од 2003 преостале колоне (између прве и последње), онда се квадрати у суседним колонама могу независно бирати, у свакој на по два начина. У том случају има 4 могућности. Према томе, укупно има $2 + 2 + 2003 \cdot 4 = 8016$ могућности.

737. Нека су дате тачке $A_1, A_2, \dots, A_{2004}$ и нека из њих полази, редом, $n_1, n_2, \dots, n_{2004}$ дужи. Јасно је да бројеви $n_1, n_2, \dots, n_{2004}$ могу узимати вредности из скупа $\{0, 1, 2, \dots, 2003\}$. Разликујемо два случаја.

а) Ако не постоји тачка из које полази 0 дужи, онда бројеви $n_1, n_2, \dots, n_{2004}$ припадају скупу $\{1, 2, \dots, 2003\}$, па на основу Дирихлеовог принципа постоје два од њих који су међусобно једнаки.

б) Ако постоји тачка из које полази 0 дужи, онда не постоји тачка из које полази 2003 дужи. Тада бројеви $n_1, n_2, \dots, n_{2004}$ припадају скупу $\{0, 1, \dots, 2002\}$, па опет на основу Дирихлеовог принципа постоје два од њих који су међусобно једнаки.



Сл. уз задатак 738

Сл. уз задатак 740

738. Нека је K средиште ивице BB_1 и L средиште ивице AB . Пресек равни α и призме је $\triangle AKC_1$, а пресек равни β и призме је $\triangle LCB_1$ (слика). Уочени троуглови имају за пресек дуж MN чију дужину треба израчунати. Из троугла AA_1C_1 налазимо $AC_1^2 = AA_1^2 + A_1C_1^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2$, дакле $AC_1 = a\sqrt{3}$. Тачка M је тежиште троугла ABB_1 , па је $MK = \frac{1}{3}AK$. Слично, тачка N је тежиште троугла BC_1B_1 , па је $KN = \frac{1}{3}KC_1$.

Тако добијамо да је $\triangle MKN \sim \triangle AKC_1$ (са коефицијентом сличности $1 : 3$), па је $MN = \frac{1}{3}AC_1 = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

739. Како је $(k^3)^2 + (2k^2)^3 = k^6 + 8k^6 = 9k^6 = (3k^3)^2$, то је, за сваки природан број k , тројка $(k^3, 2k^2, 3k^3)$ решење дате једначине.

740. У троуглу BDM је $\angle DBM = 25^\circ$, $\angle BDM = 20^\circ$, па је $\angle BMD = 135^\circ$ (слика). Посматрајмо кружницу k са центром A и полупречником AB . BD је тетива која одговара четвртини те кружнице, па је периферијски угао над том тетивом једнак 135° . Дакле, тачка M припада кружници k . Следи да је $AM = AB = AD$. Троугао MAD је једнакокрак, при чему је угао на основици $\angle ABM = 65^\circ$. Према томе је и $\angle AMB = 65^\circ$ и $\angle MAB = 180^\circ - 2 \cdot 65^\circ = 50^\circ$.

741. Приметимо да ако за реалне бројеве x и y важи $xy = 1$, онда је

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x^{2004}} + \frac{1}{1+y^{2004}} &= \frac{1+y^{2004}+1+x^{2004}}{(1+x^{2004})(1+y^{2004})} \\ &= \frac{2+x^{2004}+y^{2004}}{1+x^{2004}+y^{2004}+x^{2004}y^{2004}} = \frac{2+x^{2004}+y^{2004}}{2+x^{2004}+y^{2004}} = 1. \end{aligned}$$

Примењујући добијени резултат најпре на бројеве $x = a_1$, $y = a_{2004}$, затим на бројеве $x = a_2$, $y = a_{2003}$, ..., и, на крају, на бројеве $x = a_{1002}$, $y = a_{1003}$, добијамо да је тражени збир једнак $1 + 1 + \dots + 1 = 1002$.

742. Приметимо прво да је дати израз увек паран јер има паран број непарних сабирaka. Према томе, једини прост број који може бити вредност датог израза је 2.

За било којих 8 узастопних природних бројева важи:

$$(n+8)^2 - (n+7)^2 - (n+6)^2 + (n+5)^2 - (n+4)^2 + (n+3)^2 + (n+2)^2 - (n+1)^2 = 0,$$

па распоређујући знаке + и - на тај начин редом у блоковима од по 8 сабирaka добијамо да је

$$\underbrace{2004^2 * 2003^2 * \dots * 5^2}_{=0} + 4^2 - 3^2 - 2^2 - 1^2 = 2.$$

743. Претпоставимо да постоји такав број D . Постоји је $D = A^2$ и $A = 10a + 5$, $a \in \mathbb{N}$, из

$$A^2 = 100a^2 + 100a + 25 = 100a(a+1) + 25$$

следи да је цифра десетица броја D једнака 2. На основу следеће табеле

$$\begin{array}{cccccccccc} a \equiv \cdot \pmod{10} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ a(a+1) \equiv \cdot \pmod{10} & 0 & 2 & 6 & 2 & 0 & 0 & 2 & 6 & 2 & 0 \end{array}$$

закључујемо да је цифра стотина броја D : 0, 2 или 6, па према условима задатка то може бити једино цифра 6 (цифре 2 и 5 су већ употребљене, а 0 је искључена). Дакле, $D = 1000b + 625$, $b \in \mathbb{N}$, па $125 \mid D$. Постоји је $D = A^2$, то следи да $5^4 \mid D$, па цифра хиљада броја D мора бити или 0 или 5. Контрадикција.


744. На произвољној правој помоћу обележених тачака лењира обележимо тачке A и B , а затим тачке B и C (видети слику). Обележимо сада тачке B и D , тако да D буде ван уочене праве. Спојимо A и D . Лако се показује да је $AD \perp CD$. Обележимо сада тачке B и E тако да E не буде ни на уоченој правој ни на правој BD . Спојимо A и E и E и C . Тада је $AE \perp EC$. Нека је H тачка у пресеку правих AD и CE , а F тачка у пресеку правих AE и CD . Тада је H ортоцентар троугла ACF , па је права FH ортогонална на полазну праву.

745. Нека је $(m+1)^3 - m^3 = n^2$, где је m неки природан број. Тада је n^2 , а отуда и n , непаран број. Дакле $(m+1)^3 - m^3 = (2p+1)^2$. То се даље може представити у облику


$$\begin{aligned} 3m^2 + 3m + 1 &= (2p+1)^2 \\ 4(3m^2 + 3m + 1) - 1 &= 4(2p+1)^2 - 1 \\ 3(4m^2 + 4m + 1) &= (2(2p+1) - 1)(2(2p+1) + 1) \\ 3(2m+1)^2 &= (4p+1)(4p+3). \end{aligned}$$

Како су бројеви $4p+1$ и $4p+3$ узајамно прости, а њихов производ једнак $3(2m+1)^2$, један од њих је потпун квадрат. То не може да буде $4p+3$, јер квадрат сваког непарног броја даје остатак 1 при дељењу са 4. Отуда је $4p+1 = (2t+1)^2$, односно

$$\begin{aligned} 4p+1 &= 4t^2 + 4t + 1 \\ 2p + \frac{1}{2} &= 2t^2 + 2t + \frac{1}{2} \\ 2p+1 &= t^2 + t^2 + 2t + 1 \\ 2p+1 &= t^2 + (t+1)^2. \end{aligned}$$



Сл. уз задатак 744



Сл. уз задатак 747

746. Неједнакост се може записати у еквивалентном облику

$$\frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} \leqslant \frac{\sqrt{2(x^2 + y^2)}}{\frac{x^2 + y^2}{2}}.$$

Зато је довољно доказати следеће две неједнакости:

$$x+y \leqslant \sqrt{2(x^2 + y^2)} \quad \text{и} \quad x^2 - xy + y^2 \geqslant \frac{x^2 + y^2}{2},$$

а оне су обе једноставне. Једнакост важи ако и само ако је $x = y$.

747. Нека је P средиште кружнице кроз B , C и M , O средиште описане кружнице око $\triangle ABC$ и нека је K средиште дужи MC , а C_1 средиште дужи AB , слика. Означимо $KP \cap l = \{L\}$. Како су KP и OM нормални на AC , то је $KP \parallel OM$. Из $MK = KC$ следи $OL = CL$. С друге стране, $OP \perp BC$, па је $\angle LOP = \angle COP = 90^\circ - \angle BCC_1$. Такође је $\angle OLP = \angle CLK = 90^\circ - \angle ACC_1$. Како је $\triangle ABC$ једнакокрак и $\angle BCC_1 = \angle ACC_1$, то је $\angle LOP = \angle OLP$ и $LP = OP$. Из $CP = PQ$ добијамо да је $\angle CLP = \angle QOP$ и $CL = OQ$.

Тако је $CL = LO = OQ$, па је $CO = \frac{2}{3}CQ$. Најзад, за полупречник R описаног круга троугла ABC добијамо $R = \frac{2}{3}m$.

748. Из $3x + 4y = m^2$ и $4x + 3y = n^2$ следи $7(x + y) = m^2 + n^2$, па $7 \mid m^2 + n^2$. Како су једини могући остаци квадрата природних бројева при дељењу са 7 једнаки 0, 1, 2 и 4, одатле лако следи да мора бити $7 \mid m$ и $7 \mid n$. То значи да $7^2 \mid m^2 + n^2$ и $x + y \equiv 0 \pmod{7}$.

С друге стране, из $3x + 4y = m^2$ и $4x + 3y = n^2$ следи и $x - y = n^2 - m^2$, па је, на основу претходног, и $x - y \equiv 0 \pmod{7}$. Сабирањем и одузимањем добијених конгруенција налазимо да $7 \mid 2x$ и $7 \mid 2y$, одакле $7 \mid x$ и $7 \mid y$.

749. Означимо са c , r и b бројеве црних, црвених и белих троуглова, респективно. Како је дати полигон подељен на $n - 2$ троугла, то је

$$c + r + b = n - 2.$$

С друге стране, свака страница полигона је страница тачног једног троугла који учествује у разлагању, па је

$$2c + r = n.$$

Одузимањем добијених релација налазимо да је $c - b = 2$, што је и требало доказати.

2005. година

750. Тражена разлика је $4050 \cdot 6 - 5004 : 6$, па како је $4050 \cdot 6 = 24300$, а $5004 : 6 = 834$, то је вредност те разлике 23466.

751. $x \in \{0, 1, 2, \dots, 98\}$.

752. Сва тројица су на крају имала $36 : 3 = 12$ ораха. Значи, $B - 6 = 12$, $V + 6 - 4 = 12$ и $D + 4 = 12$, тј. на почетку Бранко је имао 18 ораха, Воја 10 ораха и Драган 8 ораха.

753. *Први начин.* Ако је мања страница (ширина) правоугаоника дужине a , онда је већа (дужина) дужине $2a$, па је страница осенченог квадрата дужине a . То значи да је она три пута мања од странице квадрата $ABCD$, која је очигледно 3a. Обим квадрата $ABCD$ је $12a$ и три пута је већи од обима осенченог квадрата који је $4a$.

Други начин. Како је $2 \cdot (2a) + 2 \cdot a = 90$ mm, то је $a = 15$ mm, па је обим шрафираног квадрата 60 mm. Обим квадрата $ABCD$ је $4 \cdot (15 + 30) = 180$ mm и три пута је већи од обима осенченог квадрата.

754. *Први начин.* Четвороцифрених бројева има 9000, а непарних 4500. Како је сваки пети од њих дељив са 5, следи да тражених бројева има 900.

Други начин. То су они четвороцифрени бројеви којима је цифра јединица 5. Таквих бројева има $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.

755. Бројеви дељиви са 9 имају збир цифара који је такође дељив са 9. Тражени скуп је: $\{144, 414, 441, 333, 234, 243, 324, 342, 423, 432\}$.

756. Из $\alpha + (\alpha - 2005') = 180^\circ$ добијамо $2\alpha = 180^\circ + 33^\circ 25'$, односно $\alpha = 106^\circ 42' 30''$.

757. Највећи могући број букета према услову задатка је НЗД(18, 45, 72) = 9. У сваком букету ће бити по две беле, пет жутих и осам црвених ружа и цена ће му бити 255 динара. *Напомена.* До цене букета може да се дође и ако се вредност свих ружа (2295) подели бројем букета (9).

758. *Први начин.* Ако су узастопни бројеви дужине страница правоугаоника, онда је осенчени квадрат површине 1 cm^2 , а површина квадрата $ABCD$ је 2025 cm^2 и 2025 пута је већа од површине осенченог квадрата.

Други начин. $506 = 2 \cdot 11 \cdot 23$, па су странице правоугаоника 22 см и 23 см. Значи, површина квадрата $ABCD$ је 2025 cm^2 и 2025 пута је већа од површине осенченог квадрата која је 1 cm^2 .

759. Не постоје, јер збир свих бројева из скupa S је $\frac{2006 \cdot 2005}{2} = 1003 \cdot 2005$, дакле, непаран број.


760. Лако се види да је $2\alpha_1 = 236^\circ$, тј. $\alpha_1 = 118^\circ$ и $\beta_1 = 102^\circ$. Одавде је $\alpha = 62^\circ$, $\beta = 78^\circ$ и $\gamma = 40^\circ$.

761. Нађимо тачку A' симетричну тачки A у односу на праву p (слика). Пресек дужи $A'B$ и праве p је тражена тачка M . Ако уочимо било коју другу тачку $M_1 \in p$, тада је $AM_1 + M_1B = A'M_1 + M_1B > A'B = A'M + MB = AM + MB$.


762. Очигледно је $-2005 < x - 1 < 2005$, тј. $-2004 < x < 2006$, па је скуп целобројних решења:

$$\{-2003, -2002, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, 2003, 2004, 2005\}.$$

Збир целобројних решења се своди на $2004 + 2005$ и једнак је 4009.



Сл. уз задатак 761



Сл. уз задатак 767

763. Ако уочимо праву паралелну са AB која садржи тачку C и тачку E (њен пресек са AD), тада је четвороугао $ABCE$ правоугаоник. Како је $AE = ED = BC = \frac{1}{2}AD$ и $CE \perp AD$, то су троуглови $\triangle ACE$ и $\triangle DCE$ подударни, па је $AC = CD$.

764. Лако се добија да је $b = -11$. Како је $a < b < c$ и $ac < 0$, следи да је $a < -11$ и $c > 0$. Једно решење је $a = -14$ и $c = 2$, а друго решење је $a = -28$ и $c = 1$.

$$\text{765. } a^{2004} \cdot b^{2006} = 5^{2004} \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)^{2006} = \frac{5^{2004}}{5^{2006}} = \frac{1}{25}.$$

$$\text{766. } a = \sqrt{6,25 - 2,25} = 2 \text{ cm}; \quad c = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \text{ cm}; \quad P = \frac{3 \cdot 2}{2} = 3 \text{ cm}^2; \quad O = (5 + \sqrt{13}) \text{ cm}.$$

767. Нека је квадрат $ABCD$ површина a^2 (види слику). Продужимо AB преко B тако да је $BA_1 = \frac{1}{2}AB$. Тада је

$$A_1C = \sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}a,$$

а површина квадрата $A_1B_1C_1D_1$ је $P_{A_1B_1C_1D_1} = \frac{5}{4}a^2 = \frac{5}{4}P_{ABCD}$.

768. Ако је $\alpha + \gamma = 118^\circ$, тада је $\alpha = \beta = 62^\circ$, а $\gamma = 56^\circ$. Одавде закључујемо да је $a > c$, па како је $\frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2} = P$, то је $h_a < h_c$, тј. висина која одговара основици је већа од висине која одговара краку.

769. Како је $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{13}{12} = \frac{65}{60}$, а $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{47}{60}$, и како је

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{65}{60} > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{53}{60} > \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{47}{60} > \frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{k}$$

за $m, n, k > 3$, то тражени бројеви не постоје.

770. Ако је површина почетне коцке $6a^2$, тада је после увећања сваке ивице за 20% површина новодобијене коцке $6 \cdot \left(\frac{6}{5}a\right)^2$. Према томе је: $6a^2 : 6 \cdot \left(\frac{6}{5}a\right)^2 = 100 : x$, тј. $x = 144$, па је површина новодобијене коцке за 44% већа од почетне.

771. Како је $\frac{17}{100}A = \frac{68}{100}B$, односно $A = 4B$, то је $5B = 2005$, тј. $B = 401$ и $A = 1604$.

772. Нека су B_1 и D_1 пројекције тачака B и D на раван α . Тада су $\triangle ABB_1$ и $\triangle CDD_1$ правоугли са катетама $BB_1 = DD_1 = 12$ см. Како је $\angle BAB_1 = 30^\circ$, то је хипотенуза $AB = 24$ см. Из услова задатка видимо да је $CD = 24$ см, па је $\triangle ABB_1 \cong \triangle CDD_1$, а онда је и $\angle DCD_1 = 30^\circ$.

773. Како је $1 + 2 + \dots + 62 = 1953$, а $1 + 2 + \dots + 63 = 2016$, то је 2005 збир највише 62 различита природна броја и то на пример $2005 = (1 + 2 + 3 + \dots + 60 + 61) + 114$.

774. Поделе $7 + 0 + 0$, $5 + 1 + 1$, $3 + 2 + 2$ и $3 + 3 + 1$ су могуће на три начина (свака), а поделе $6 + 1 + 0$, $5 + 2 + 0$, $4 + 3 + 0$ и $4 + 2 + 1$ су могуће на шест начина (свака). То је укупно $3 \cdot 4 + 6 \cdot 4 = 36$ различитих начина.

775. Ако замиšљени број означимо са x , онда је $12x$ први производ, а $9x$ други производ. Њихова разлика је 270, тј. $12x - 9x = 270$. Одавде је $x = 270 : 3$, тј. $x = 90$.

776. Од датих картона можемо саставити четири правоугаоника (2×18 , 3×12 , 4×9 и 6×6).

(a) Највећи могући обим је $O = 2(2 + 18) = 40$ см.

(a) Најмањи могући обим је $O = 2(6 + 6) = 24$ см.

777. Површина фигуре је 33 квадратића.

778. Лако се види да 5 свезака и 5 оловака коштају 175 динара, а 2 оловке и 2 свеске 70 динара. Према томе, цена једне свеске је 30 динара, а једне оловке 5 динара. За 60 свезака и 41 оловку биће потребно 2005 динара, јер је $60 \cdot 30 + 41 \cdot 5 = 1800 + 205 = 2005$.

779. Како је $2005 \cdot a - 2004 \cdot b = a + 2004 \cdot a - 2004 \cdot b = a + 2004 \cdot 2005$, то је најмања вредност датог израза $2006 + 2004 \cdot 2005 = 4020026$.

780. Ако са α означимо мањи од упоредних углова, тада је $(180^\circ - \alpha) - \alpha = \frac{\alpha}{2}$, тј. $\alpha = 72^\circ$. Његов комплемент има 18° и једнак је $\frac{1}{4}\alpha (= 72/4 = 18^\circ)$.


781. Лако се види да 5 свезака и 5 оловака коштају 175 динара, а 2 оловке и 2 свеске 70 динара. Према томе, цена једне свеске је 30 динара, а једне оловке 5 динара. Највише предмета се може купити ако се купе само оловке, тј. ако се купи $2005 : 5 = 401$ оловка.

782. Дужи одређене овим тачкама су: AB , AC , AD , AE , BC , BD , BE , CD , CE и DE и има их 10, а троуглови са теменима у овим тачкама су: ABC , ABD , ABE , BCD , BCE , DCE , DCA , DEA , DEB и EAC и има их 10. Према томе, има исто толико дужи са крајевима у датим тачкама колико и троуглова са теменима у датим тачкама.


783. Први начин. Број ће бити дељив са 4 ако уместо ♣ ставимо једну од цифара из скупа $\{0, 2, 4, 6, 8\}$. Од добијених 5 бројева само су 3204 и 3264 дељиви са 3, па самим тим и са 12.

Други начин. Дати број ће бити дељив са 3 ако уместо ♣ ставимо једну од цифара из скупа $\{0, 3, 6, 9\}$. Од добијених 5 бројева само су 3204 и 3264 дељиви са 4, па самим тим и са 12.

784. Стављајући k доле десно (слика 1), добијамо да је $(k + 55) \cdot 5 = 16k$, тј. $k = 25$. Решење је на слици 2. Напоменимо да се k може ставити у било који круг – једначине су различите, а резултат је исти.




Сл. 1 уз задатак 784



Сл. 2 уз задатак 784

785. Одмах се види да је $-\frac{5}{15} < \frac{n+1}{15} < \frac{3}{15}$, односно да је $-5 < n+1 < 3$. Тражено решење припада скупу $\{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1\}$.

786. Лако се види да 5 свезака и 5 оловака коштају 175 динара, а 2 оловке и 2 свеске 70 динара. Према томе, цена једне свеске је 30 динара, а једне оловке 5 динара. Ако са x означимо број свезака, тада је $30 \cdot x + (101 - x) \cdot 5 = 2005$. Одавде је $x = 60$, тј. купљено је 60 свезака и 41 оловка.



Сл. уз задатак 787

787. Како је $\angle EAB = \angle BCD$ (углови са нормалним крацима) и $AB = CH$ (по претпоставци), то су правоугли троуглови $\triangle ABE$ и $\triangle HCE$ подударни. Закључујемо да је $AE = EC$, а одатле и $\angle EAC = \angle ACE = 45^\circ$.

788. (1) Из деливости 135 и 30 са 5 и 135 и 252 са 9 закључујемо где се налази 5 и 9. (2) Одмах закључујемо где се налази 3, а онда и 6 и 1. (3) Број 4 не може бити у истој колони са 3, јер је $3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$, па су редом бројеви треће врсте 4, 2, 1. (4) Сада лако закључујемо где се налазе 8 и 7.

9		5	135
			336
			8

252 48 30

9	3	5	135
		6	336
		1	8

252 48 30

9	3	5	135
		6	336
	4	2	8

252 48 30

9	3	5	135
7	8	6	336
4	2	1	8

252 48 30

Сл. уз задатак 788


789. Ако квадрат, правим паралелним страницама, поделимо на $44 \cdot 44 = 1936$ малих квадрата странице 1 см, онда, на основу Дирихлеовог принципа, бар две од датих 2005 тачака морају бити у истом (малом) квадрату. Растојање те две тачке је мање од дијагонале малог квадрата, која је мања од 2 см због односа страница у троуглу.

790. Очигледно је $\overline{abcabc} = \overline{abc} \cdot 1000 + \overline{abc} = \overline{abc} \cdot 1001$, па како је $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$, то је и \overline{abcabc} деливо са 7, 11 и 13.


791. Како је $AC = BD$, то је $P = \frac{d^2}{2}$, тј. $d = 4\sqrt{2}$ cm.

Први начин. Ако уочимо тачке E и F такве да је $DF \perp AB$ и $BE \perp DC$, тада је $DFBE$ квадрат јер је $FE = BD$, $FB \parallel DE$ и $FE \perp BD$, а страница овог квадрата, тј. висина трапеза је $DF = 4$ cm.

Други начин. Ако је $CG \parallel BD$ и G на правој AB , троугао AGC је једнакокрако-правоугли и висина му је једнака половини хипотенузе, тј. 4 cm.



Сл. уз задатак 791



Сл. уз задатак 793

792. Лако се види да 5 свезака и 5 оловака коштају 175 динара, а 2 оловке и 2 свеске 70 динара. Према томе, цена једне свеске је 30 динара, а једне оловке 5 динара. Ако са x означимо број свезака тада је $30x + (205 - x) \cdot 5 = 2005$, тј. $5x = 196$. Како је $x \in \mathbf{N}_0$, закључујемо да није могуће купити 205 предмета.

793. Ако уочимо E на AB тако да је $CE \perp AB$, тада је $AE = ED$, јер је $\triangle CDA$ једнакокрак. Сада је $AB = 5$, $CE = 2$ и $AE = ED = 1$ (слика). Према томе, $O_{\triangle BCD} = 2\sqrt{5} + \sqrt{5} + 5 - 2 = 3(1 + \sqrt{5})$ и $P_{\triangle BCD} = 5 - 2 = 3$.

794. I случај. $p = q = 2$ и r – непаран: $r^2 = 1997$, што је немогуће. II случај. p, q, r – непарни: $(2k+1)^2 + (2l+1)^2 + (2m+1)^2 = 2005$, тј. $4(k^2 + k + l^2 + l + m^2 + m) = 2002$, што није могуће јер 2002 није дељиво са 4.

795. Решења прве неједначине су $y \geq -8$, а друге $y > -\frac{1}{5}$. Заједничка решења су $y > -\frac{1}{5}$, тј. $y \in \left(-\frac{1}{5}, +\infty\right)$.


796. Лако се види да 5 свезака и 5 оловака коштају 175 динара, а 2 оловке и 2 свеске 70 динара. Према томе, цена једне свеске је 30 динара, а једне оловке 5 динара. Нека је набављено x оловака и y свезака. Тада је $5x + 30y = 2005$, тј. $x + 6y = 401$. Значи, $0 \leq 6y \leq 401$, односно, $0 \leq y \leq \frac{401}{6}$, па је могуће купити 0 или 1 или 2 или ... или 66 свезака и за остале динаре оловке. Према томе, има 67 начина да се за 2005 динара купе свеске и оловке.

797. Запремина квадра је $V = a^2 H$, а запремина мањег дела је $V_1 = \frac{1}{2}a^2 \frac{a}{\sqrt{3}}$. Запремина већег дела је $V_2 = a^2 H - \frac{1}{2}a^2 \frac{a}{\sqrt{3}}$. Како је $V_1 : V_2 = 1 : 2$, то је $H = a \frac{\sqrt{3}}{2}$, па је $V = \frac{a^3 \sqrt{3}}{2}$.


798. Ако је r полуупречник малог круга (видети слику), тада је $2r\sqrt{2} + 2r + a = a\sqrt{2}$, па је

$$r = \frac{a(\sqrt{2} - 1)}{2(\sqrt{2} + 1)} = \frac{a(3 - 2\sqrt{2})}{2}$$

$$\text{и } P = r^2 \pi = \frac{a^2(3 - 2\sqrt{2})^2}{4} \pi.$$



Сл. уз задатак 798



Сл. уз задатак 802

799. Бројеви 7, 16, 25, 34, 43, 52, 59, 61, 68, 70, 77, 86 и 95 имају збир цифара дељив са 7, а између никоја два од њих нема 10 бројева. Према томе, најмањи број који је Милан записао је 96 јер су првих 10 узаостопних бројева којима збир цифара није дељив са седам: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 и 105.

800. За првих 9 страна потребно је 9 цифара, а за наредних 90 страна 180 цифара. За преосталих 126 страна потребно је $126 \cdot 3 = 378$ цифара. Значи, за нумерацију 225 страна књиге потребно је 567 цифара.

801. Нека је x мањи од тих бројева. Тада је већи од њих $x + 1001$. Како је њихов збир 2005, то је $2x + 1001 = 2005$, односно $x = 502$. Већи од ових бројева је 1503.

802. Како је обим добијених правоугаоника за две дужине странице квадрата већи од квадрата, то је $a = 210 : 2 = 105$ cm (слика). Како је површина мањег правоугаоника 4 пута мања од површине већег, то је једна његова страница 4 пута мања од странице већег (друге странице су им по 105 cm). Обим мањег правоугаоника је $O = 2(105 + 21) = 252$ cm.

803. На месту треће звездице (с лева на десно) мора да стоји цифра 6, јер је $9 \cdot 8 = 72$. Ако на место средње звездице ставимо цифру 7, добијамо $708 = 79 \cdot 8 + 76$. Ако на место средње звездице ставимо цифру 8, тада добијамо $788 = 89 \cdot 8 + 76$.

804. У горњем десном углу мора да се упише $10 + 5 - 4 = 11$, а у средини $11 + 7 - 10 = 5 + 7 - 4 = 8$. Онда добијамо да је збир по врстама, колонама и дијагоналама једнак 24. Дакле:


	4	
10		
5		7

	4	11
10		
5		7

	4	11
10	8	
5		7

9	4	11
10	8	6
5	12	7

Сл. уз задатак 804



Сл. уз задатак 805

805. Уочимо тачке M , N , P и Q као на слици. Тада $\angle MAN$ има 45° , $\angle PAQ$ има 75° и коначно тражени угло α има 60° .

806. Нека су $a, b, c \in \mathbb{N}$ дужине ивица квадра. Тада је $12 \cdot b \cdot c = 960$ и $2(12b + 12c + bc) = 596$, значи $bc = 80$ и $b + c = 18$. Растављањем броја 80 на чиниоце и провером збира добија се $b = 10$ cm и $c = 8$ cm.

807. Број који је дељив са 36 мора да буде дељив са 4 и са 9. Ако је дељив са 4, а записује се само цифрама 7 и 4, он мора да се завршава са 44. Збир цифара тог броја треба да буде дељив са 9, па како су случајеви $8+1$ и $8+10$ немогући, остаје нам $8+19$, тј. $8+4+4+4+7$, па је тражени број 444744.

808. Пустимо да „тече време“ на пешчаном сату који мери 10 min. Када истекне 10 min, окренемо га и истовремено пустимо да „тече“ и други сат који мери 7 min. Када истекне 7 min, окренемо сат који мери 7 min. Када „истекне“ сат који мери 10 min, окренемо сат који мери 7 min, а на коме је „истекло“ 3 min. Када „истекне“ сат који мери 7 min, прошло је тачно 23 min.

		$\frac{8}{10}$
$\frac{7}{10}$		
		$\frac{4}{10}$

		$\frac{8}{10}$
$\frac{7}{10}$	$\frac{5}{10}$	
		$\frac{4}{10}$

		$\frac{8}{10}$
$\frac{7}{10}$	$\frac{5}{10}$	
		$\frac{4}{10}$


	$\frac{1}{10}$	$\frac{8}{10}$
$\frac{7}{10}$	$\frac{5}{10}$	
		$\frac{4}{10}$

$\frac{6}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{8}{10}$
$\frac{7}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{3}{10}$
$\frac{2}{10}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{4}{10}$


Сл. уз задатак 809

810. Како је $-3 < x < 3$, то се провером другог услова добија да је $x = 1$ или $x = 2$.


811. Лако се доказује да је $\triangle AEH \cong \triangle FCG$ и $\triangle EBF \cong \triangle HGD$, па је $EH = FG$ и $EF = HG$, па је четвороугаоник $EFGH$ паралелограм (слика). Нека је $\angle BAD = \alpha$. Тада је $\angle AEH = \frac{180^\circ - \alpha}{2}$ и $\angle BEF = \frac{\alpha}{2}$, те је $\angle HEF = 90^\circ$. Према томе, паралелограм $EFGH$ је правоугаоник.



Сл. уз задатак 811



Сл. уз задатак 814



Сл. уз задатак 815

812. Како је $7r < 47$, то је $r = 2$ или $r = 3$ или $r = 5$. Ако је $r = 2$, тада је $p + 5q = 33$, па како је p или $5q$ паран, то је једино могуће за $q = 2$ и $p = 23$. Ако је $r = 3$, тада је $p + 5q = 26$. Провером добијамо $p = 11$ и $q = 3$. Ако је $r = 5$, тада је $p + 5q = 12$. Провером добијамо решење $p = 2$ и $q = 2$.

813. Нека су x и y узајамно прости бројеви. Како су

$$\frac{x}{y} : \frac{11}{210} = \frac{210x}{11y} \quad \text{и} \quad \frac{x}{y} : \frac{11}{280} = \frac{280x}{11y}$$

природни бројеви, то $11 \mid x$, $y \mid 210$ и $y \mid 280$. Како тражимо најмањи могући разломак $\frac{x}{y}$, то ће x бити што је могуће мање, тј. $x = 11$, а y што је могуће веће, а то је $y = \text{НЗД}(210, 280) = 70$.


814. Нека је (види слику) AA_2 висина која одговара страници a , а AA_1 њена тежишна дуж, B_1 средиште странице AC и T тежиште троугла ABC . Прво можемо конструисати $\triangle AA_2A_1$ (познати су $\angle AA_2A_1$, AA_2 и AA_1), а затим и $\triangle BA_1T$ (познати су $\angle BA_1T$, A_1T и TB). Затим продужимо BA_1 преко A_1 тако да је $BA_1 = A_1C$. Спајањем A са тачкама B и C добијамо тражени $\triangle ABC$.

815. Сви троуглови AA_1F , BB_1A_1 , CC_1B_1 , DD_1C_1 , EE_1D_1 , FF_1E_1 су подударни, па је $A_1B_1 = B_1C_1 = C_1D_1 = D_1E_1 = E_1F_1 = F_1A_1$ (слика). Како је A_1B_1 средња линија $\triangle ABC$, то је $A_1B_1 = \frac{1}{2}AC = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Осим тога, како је $\angle FF_1E_1 = \angle AF_1A_1 = 30^\circ$, то је $\angle E_1F_1A_1 = 120^\circ$. Слично је и за остале углове. Дакле, $A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ је правилан шестоугаоник чија је странице дужине $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Његова површина је $P = \frac{9a^2\sqrt{3}}{8}$.

816. Нека су p , q и r прости бројеви такви да је $p \leq q \leq r$. Како је $pqr = 47(p+q+r)$ и p , q и r су прости бројеви, то је $r = 47$. Тада је $pq = p+q+47$, тј. $(p-1)(q-1) = 48$. Провером долазимо до јединог решења $p = 5$ и $q = 13$.

817. Нека је O пресек дијагонала. Троуглови AOD и BOC су правоугли, па је $2MO = AD$ и $2NO = BC$. Из троугла OMN је $MN \leq MO + NO$ (једнакост важи ако су тачке M , O и N колинеарне), па је $2MN \leq 2MO + 2NO = AD + BC$.

818. Тражених бројева са цифрама 1 и 2 „на почетку“ има $2 \cdot 8 \cdot 7 = 112$. Ако су цифре 1 и 2 „у средини“, таквих бројева има $7 \cdot 2 \cdot 7 = 98$ и са цифрама 1 и 2 на крају $7 \cdot 7 \cdot 2 = 98$. Дакле, тражених бројева има укупно 308.




Сл. уз задатак 819


819. Најмање квадрата ће бити употребљено ако састављамо правоугаоник чија је једна страница 5 cm, а друга 401 cm и то као на слици. Дакле, биће потребно најмање 84 квадрата.

820. (а) Како је $3 = (2m + 1) \cdot 4 + 6$, то је $m = -\frac{7}{8}$.


(б) Једначина праве је $y = -\frac{3}{4}x + 6$. Тражена удаљеност је једнака висини која одговара хипотенузи, тј. $\frac{h \cdot \sqrt{36+64}}{2} = \frac{6 \cdot 8}{2}$, одакле је $h = 4,8$.



Сл. уз задатак 820



Сл. уз задатак 823



Сл. уз задатак 824

821. Нека су P, P_1 и P_2 , затим s, s_1 и s_2 редом површине и полуобими троуглова ABC , ADC и DBC . Тада је $s_1 < s$ и $s_2 < 2$ и $P = sr$, $P_1 = s_1r_1$ и $P_2 = s_2r_2$. Како је $P = P_1 + P_2$, то је

$$r_1 + r_2 = \frac{P_1}{s_1} + \frac{P_2}{s_2} > \frac{P_1}{s} + \frac{P_2}{s} = \frac{P}{s} = r.$$

822. Лако се види да је $p(1 + q + qr) = 5 \cdot 401$. Ако је $p = 5$, тада је $q(1 + r) = 400$, одакле се добија $q = 2$ и $r = 199$ или $q = 5$ и $r = 79$. Ако је $p = 401$, тада нема решења.


823. Нека ивица коцке има дужину a . Тада је (види слику) $BD_1 = a\sqrt{3}$, $AD_1 = a\sqrt{2}$, $AE = 2005$ cm и троугао ABD_1 је правоугли. Тада је $a \cdot a\sqrt{2} = 2005 \cdot a\sqrt{3}$, тј. $a = 2005\sqrt{\frac{3}{2}}$. Површина и запремина су једнаке $P = 6a^2 = 9 \cdot 2005^2$ cm² и $V = a^3 = 2005^3 \cdot \frac{3}{2}\sqrt{\frac{3}{2}}$ cm³.

824. Нека је S збир бројева по сваком правцу (види слику). Тада је $S = y_1 + x_1 + x_2$, $S = y_2 + x_2 + x_3$ и $S = y_3 + x_3 + x_1$, па је $3S = (y_1 + y_2 + y_3 + x_1 + x_2 + x_3) + x_1 + x_2 + x_3$, тј. $3S = 21 + x_1 + x_2 + x_3$, па је $x_1 + x_2 + x_3 = 3(S - 7)$.


825. Нека је a цена пансиона у хотелу Славија, а b цена пансиона у хотелу Звезда пре прве промене цене. Цена пансиона после обе промене је $0,8 \cdot 1,2a$ у хотелу Славија и $1,2 \cdot 0,8b$ у хотелу Звезда. Како је $|0,8 \cdot 1,2a - 1,2 \cdot 0,8b| = 240$, то је $|a - b| = \frac{24}{0,96}$, односно $|a - b| = 250$. Према томе, разлика у цени пансиона пре прве промене је била 250 динара.

826. Нека је C_1 средиште странице AB (видети слику). Ако продужимо CC_1 преко C_1 тако да је $CC_1 = C_1D$, добијамо паралелограм $ADBC$. Сада је $CD < DA + AC$, тј. $2t_c < a + b$, односно $t_c < \frac{a+b}{2}$.

С друге стране је, из троуглова AC_1C и C_1BC , $t_c > b - \frac{c}{2}$ и $t_c > a - \frac{c}{2}$, па је $t_c > \frac{a+b-c}{2}$.



Сл. уз задатак 826



Сл. уз задатак 828

827. Како је $\overline{abc} - \overline{def} = 860$, то је $a = 9$, $d = 1$, $c = f$ и $b - e = 6$. Ако је $b = 6$ и $e = 0$, тада је $a + b + c + d + e + f = 16 + 2c$. Како је број \overline{abcdef} делив са 9, то је $16 + 2c$ деливо са 9, па је $c = 1$ (јер је $c \in \{0, 1, \dots, 9\}$). Решење у овом случају је 961101. Слично, ако је $b = 7$ и $e = 1$ решење је 970110 или 979119; ако је $b = 8$ и $e = 2$ решење је 988128 и ако је $b = 9$ и $e = 3$ решење је 997137.

828. Нека је $ABCD$ дати ромб. Конструишимо кружницу описану око $\triangle ABD$ (видети слику). Нека је M пресечна тачка кружнице и дужи OC , а S средина дужи MC . Кружница са центром O која садржи тачку S је тражена кружница. Има укупно четири решења.

829. Четврта врста завршава се бројем $4n$. Како је 77 у петој врсти, то је $4n < 77$, односно $n \leq 19$. Седма врста се завршава бројем $7n$, па како је 127 у седмој врсти, то је $127 \leq 7n$, тј. $n > 18$. Према томе, $n = 19$. Сада знамо да последња врста почиње бројем $18m + 1$, а завршава бројем $19m$, па мора бити $18m + 1 \leq 307 \leq 19m$, тј. $m > 16$ и $m \leq 17$. Дакле, $m = 17$.

830. Како је $\frac{1}{\sqrt{12} - \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{12} + \sqrt{6}}{6}$, то је $\frac{\sqrt{11} + \sqrt{7}}{6} > \frac{1}{\sqrt{12} - \sqrt{6}}$, јер је $(\sqrt{11} + \sqrt{7})^2 > (\sqrt{12} + \sqrt{6})^2$, односно $\sqrt{77} > \sqrt{72}$.

831. Одмах примећујемо да је $\frac{\alpha}{2} = \angle OAC = \angle ACO = \frac{\gamma}{4}$, тј. $\gamma = 2\alpha$ (слика). Сада је и

$$\beta = \angle ABC = \angle ABO + \angle OBC = \frac{\alpha}{2} + \frac{3}{4}\gamma = \gamma,$$


па је $\alpha + 2\alpha + 2\alpha = 180^\circ$, тј. $\alpha = 36^\circ$. Дакле, $\alpha = 36^\circ$, $\beta = 72^\circ$ и $\gamma = 72^\circ$.

832. Како су бар два од бројева a , b и c исте парности, рецимо a и b , то је број $b^c + a$ паран и прост. Значи, $b^c + a = 2$, па је $b = a = 1$. Према томе, $p = 1 + c$ и $r = c + 1$, па су два од бројева p , q и r међусобно једнака.


833. Како тачке A, B, A', B' припадају једној кружници чији је пречник страница AB , а центар средиште странице AB , то је $\angle ABB' = \angle AA'B' = 25^\circ$ (слика). Како је $\angle CA'B' = 180^\circ - (90^\circ + 25^\circ) = 65^\circ$, то је и $\angle A'B'C = 55^\circ$, јер је $\angle A'CB' = \angle BCA = 60^\circ$. С друге стране, $\triangle OA'B'$ је једнакокрак и

$$\angle B'OA' = 180^\circ - (\angle AOB' + \angle BOA') = 180^\circ - (50^\circ + 70^\circ) = 60^\circ.$$

Значи, $\triangle OA'B'$ је једнакостраничан, па је $A'B' = 5$ см.



Сл. уз задатак 831




Сл. уз задатак 833

834. Како странница квадрата чија је дијагонала мања од 1 cm мора бити мања од $\frac{\sqrt{2}}{2}$ cm, то ћемо дати квадрат поделити на $44 \cdot 44 = 1936$ мањих подударних квадрата странице $\frac{31}{44}$ cm ($\frac{31}{44} < \frac{\sqrt{2}}{2}$). Ако сада 2005 тачака на произвољан начин распоредимо у 1936 малих квадрата, тада ће постојати мали квадрат у коме се налазе бар две тачке, а њихово растојање је мање од дијагонале $d < \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2} = 1$ cm.


835. Дату једначину можемо записати у облику $5n + 401m = mn$, тј. $(m-5)(n-401) = 2005$. Ово је могуће за:

- $m - 5 = 1$ и $n - 401 = 2005$, тј. $m = 6$ и $n = 2406$;
- $m - 5 = 2005$ и $n - 401 = 1$, тј. $m = 2010$ и $n = 402$;
- $m - 5 = 401$ и $n - 401 = 5$, тј. $m = 406$ и $n = 406$;
- $m - 5 = 5$ и $n - 401 = 401$, тј. $m = 10$ и $n = 802$.


836. Ако је A_1 средиште ивице BC , тада T припада дужи VA_1 и S припада дужи AA_1 (јер је пирамида правилна), па се AT и VS секу. Обележимо пресечну тачку са M . Нормала из тачке T на раван основе сече дуж AA_1 у тачки P . Очигледно је $\triangle A_1SV \sim \triangle A_1PT$, па је $A_1T : TV = 1 : 2 = A_1P : PS$. Како је S тежиште основе, ако је x дужина дужи A_1P , тада је $AS : SP = 6x : 2x$. Сада из сличности троуглова ASM и APT следи $AM : MT = AS : SP = 3 : 1$.



Сл. уз задатак 836



Сл. уз задатак 837



Сл. уз задатак 838

837. Темена A , B и C једнакостраничног троугла деле кружницу на три лука, сваки дужине $\frac{O}{3}$. На једном од та три лука морају се наћи два темена квадрата, на пример на луку \widehat{AB} (видети слику). Дужина лука \widehat{DE} је $\frac{O}{4}$, па је збир дужина лукова \widehat{AD} и \widehat{EB} једнак $\frac{O}{3} - \frac{O}{4} = \frac{O}{12}$, па бар један од њих има дужину не већу од $\frac{O}{24}$.

838. Нека је дужина странице квадрата a . Троугао AXY је правоугли и $\angle AXY = 90^\circ$. Како је $\angle CXY = \angle XAB$ (углови са нормалним крацима), то је $\triangle CXY \sim \triangle BAX$, па је $CX : BA = XY : AX$, односно $CX = \frac{XY \cdot BA}{AX} = \frac{3a}{4}$. Непосредно следи да је $BX = \frac{a}{4}$. У правоуглом троуглу ABX је $a^2 + \left(\frac{a}{4}\right)^2 = 4^2$, па је $a = \frac{16\sqrt{17}}{17}$.

839. Ако са k означимо број неиздатих соба у току дана, тада је дневна зарада хотела

$$(40 - k)(1000 + k \cdot 50) - (40 - k) \cdot 100 = 50(40 - k)(18 + k),$$


односно $50(841 - (k - 11)^2)$ динара. Зарада ће бити највећа ако је $k = 11$, а то значи да ће цена собе бити 1550 динара.

840. Разликујемо два случаја:


1° ако је $p = 2$, онда је $p^3 = 8$, па је $249 \cdot p^3 = 249 \cdot 8 = 1992$, што значи да је $q = 2005 - 1992 = 13$;

2° ако је $p \geq 3$, онда је p непаран број. Тада q мора бити паран, па је $q = 2$. Значи да је $249 \cdot p^3 = 2003$, па је $p^3 = \frac{2003}{249}$. Како 2003 није дељиво са 249, то p^3 није природан број. Једино решење је $p = 2$, $q = 13$.

841. (a) $1^\circ \alpha < 90^\circ$ и $\beta < 90^\circ$ (слика). Из троугла ABE је $2\alpha + 90^\circ + \frac{\beta}{2} = 180^\circ$, а из троугла ABD је $2\beta + 90^\circ + \frac{\alpha}{2} = 180^\circ$, одакле је $\alpha = \beta = 36^\circ$, $\gamma = 108^\circ$.



Сл. уз задатак 841a-1




Сл. уз задатак 841a-2

$2^\circ \alpha < 90^\circ$ и $\beta > 90^\circ$ (слика). Из троугла ABD је $450^\circ - 2\beta - \frac{\alpha}{2} = 180^\circ$, а из троугла ABE је $2\alpha + 90^\circ + \frac{\beta}{2} = 180^\circ$, одакле је $\alpha = 12^\circ$, $\beta = 132^\circ$, $\gamma = 36^\circ$.


(б) $\alpha > 90^\circ$ (слика). Из троугла ABD је $2\beta + 90^\circ + \frac{\alpha}{2} = 180^\circ$, а из троугла ABE је $450^\circ - 2\alpha - \frac{\beta}{2} = 180^\circ$, одакле је $\alpha = 132^\circ$, $\beta = 12^\circ$, $\gamma = 36^\circ$.

842. Ако са x означимо цену књиге у динарима, онда је Анка пре куповине имала $\frac{9}{5}x$ динара, Бранка $\frac{4}{5}x$ и Весна $2x$ динара. После куповине књиге Анка нема више новца, Бранки је остало $\frac{4}{5}x$, а Весни x динара. Како је то укупно $\frac{9}{5}x$, да би сви имали подједнако новца, Бранка је морала дати Анки $\frac{1}{5}x$, а Весна $\frac{2}{5}x$, тј. дупло више од Бранке. Значи, Весна је Анки дала 200 динара.

843. Нека права p сече BC у тачки F и нека је $DM \parallel BC$ (слика). $\triangle BEF$ је једнакопрек, јер је симетрала $\angle EBF$ нормална на основицу EF . Закључујемо да је $ED = DF$.



Сл. уз задатак 841б



Сл. уз задатак 843

Како је $DM \parallel BC$, то је DM средња линија $\triangle BEF$, па је $EM = MB$. Тада је тежишна дуж DM правоуглог $\triangle BDE$ једнака половини дужи BE , тј. $DM = \frac{1}{2}BE$. Како је $\triangle AMD$ једнакокрак ($\angle DAM = \angle DMA = 2\varphi$), следи да је $DM = AD = \frac{1}{2}BE$, па је $BE = 2AD$.

844. Ако са x означимо збир свих додељених бројева, тада је збир било којих осам бројева додељених узастопним тачкама константан и једнак $x - 5 \cdot 1000$. Како је $108 = 13 \cdot 8 + 4$, на сличан начин закључујемо и да је збир било која четири броја додељена узастопним тачкама такође константан и једнак $100 : 5 = 200$ (јер пет „четворочланих блокова“ стаје у један „двадесеточлани блок“). Према томе, тачкама $A_1, A_5, \dots, A_{4n+1}, \dots, A_{105}$ додељен је број 1; тачкама $A_2, A_6, \dots, A_{4n+2}, \dots, A_{106}$ додељен је број 50; тачкама $A_3, A_7, \dots, A_{4n+3}, \dots, A_{107}$ додељен је број 19 и коначно тачкама $A_4, A_8, \dots, A_{4n}, \dots, A_{104}, A_{108}$ додељен је број $130 = 200 - (1 + 50 + 19)$.

845. Нека је K подножје висине из темена C датог троугла (слика). Дуж MN је средња линија троугла ABD , па је

$$(1) \quad MN = \frac{1}{2}AB \quad \text{и} \quad MN \parallel AB.$$

Дуж QP је средња линија троугла ABC , па је


$$(2) \quad QP = \frac{1}{2}AB \quad \text{и} \quad QP \parallel AB.$$

Из (1) и (2) следи да је $MNPQ$ паралелограм. Дуж NP је средња линија троугла BCD , па је $PN \parallel CD$. Како је $CD \perp AB$, односно $MN \parallel PN$, то је и $PN \perp MN$, тј. $MNPQ$ је правоугаоник.

846. Доказаћемо да је број $(n-3)(n-2)(n-1)(n+1)(n+2)(n+3) + 36$ квадрат природног броја за сваки природан број n . Заиста,

$$\begin{aligned} (n-3)(n-2)(n-1)(n+1)(n+2)(n+3) + 36 &= (n^2 - 9)(n^2 - 4)(n^2 - 1) + 36 \\ &= n^2(n^4 - 14n^2 + 49) = (n(n^2 - 7))^2. \end{aligned}$$

847. Пошто су бројеви 3 и 8 узајамно прости, довољно је доказати да је број $a+b$ дељив са 3 и са 8. Из услова следи да ab при дељењу са 3 даје остатак 2, што је могуће једино ако један од бројева a и b има остатак 1, а други има остатак 2 при дељењу са 3. Како је збир остатака 3, број $a+b$ је дељив са 3. Слично, при дељењу са 8 број ab има



Сл. уз задатак 845

Сл. уз задатак 849

остатак 7, што је могуће једино ако један од бројева a и b има остатак 1, а други 7 или ако један има остатак 3, а други 5. У оба случаја збир остатака је 8, па је број $a + b$ дељив са 8.

848. Скуп $A = \{00, 01, \dots, 23\}$ садржи бројеве који одређују сате. Ако у сваком броју из скупа A цифре замене места, добијају се 24 броја, међу којима 16 њих који могу представљати секунде.

Скуп $B = \{00, 01, \dots, 59\}$ садржи бројеве који одређују минуте и секунде. Ако у сваком броју из скупа B цифре замене места, добија се 60 бројева, међу којима има 36 њих који могу представљати минуте. На пример, од бројева 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 првих шест одређују број минута на дигиталном часовнику, а последња четири не одређују број минута. Ако у сваком броју из скупа B цифре замене места, добија се 60 бројева међу којима има 16 њих који могу представљати сате. Наведена тврђења се доказују непосредним преbroјавањем. Како се сваки број сати може комбиновати са сваким бројем минута и сваким бројем секунди, то је на основу правила производа тражени број једнак $16 \cdot 36 \cdot 16 = 9216$.

849. Нека је N таква тачка да је $\triangle MCN \cong \triangle ABC$ (N је са исте стране праве BC са које је и тачка A) (слика). Тада је $\angle NCA = \angle NCM - \angle ACM = 80^\circ - 20^\circ = 60^\circ$ и како је $CN = CA$, троугао ACN је једнакостраничан, па је и $\angle CNA = 60^\circ$. Следи да је $\angle MNA = 60^\circ - 20^\circ = 40^\circ$. Троугао AMN је једнакокрак, јер је $AN = MN$. Његов угао при врху N је $\angle MNA = \angle CNA - \angle CNM = 60^\circ - 20^\circ = 40^\circ$, па је угао на основици $\angle NMA = 70^\circ$. Како је $\angle CMN = 80^\circ$, то је $\angle CMA = 70^\circ + 80^\circ = 150^\circ$, па је $\angle AMB = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$.

850. Како је $9999 = 9 \cdot 11 \cdot 101$, број јединица у запису траженог броја је дељив са 9 и 11. С друге стране, тражени број је облика

$$101 + 101 \cdot 10^4 + 101 \cdot 10^8 + \dots$$

или


$$1 + 101 \cdot 10^2 + 101 \cdot 10^6 + \dots,$$

у зависности од тога да ли је број јединица паран или непаран. У првом случају број је дељив са 101, а у другом при дељењу са 101 даје остатак 1. Дакле, број јединица у запису датог броја мора бити паран. Најмањи паран природан број који је дељив са 9 и 11 је 198. Тражени број у запису садржи 198 јединица и 197 нула, тј. има укупно 395 цифара.

851. Троуглови AOS и ADE су слични јер је $\angle AOS = \angle DEA = 90^\circ$ (из услова задатка) и $\angle OSA = \angle ADE$ (као углови са нормалним крацима) (слика). Из уочене сличности поставимо пропорцију $AD : AS = AE : AO$, одакле делимичном заменом добијамо

$$(1) \quad a^2 = 2AE \cdot AS.$$

Даље, из услова задатка имамо $AE : ES = 9 : 8$ и $AS = AE + ES$, па је $ES = \frac{8}{9}AE$ и $AS = \frac{17}{9}AE$. Заменом у једнакости (1) добијамо $AE = \frac{9}{\sqrt{34}} \text{ dm}$ и $AS = \frac{17}{\sqrt{34}} \text{ dm}$. Из правоуглог троугла AOS је $OS^2 = AS^2 - AO^2$, где је $AO = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \text{ dm}$. Даље добијамо $OS^2 = \frac{11}{2} \text{ dm}^2$. Применом Питагорине теореме на $\triangle ODS$ који је, такође, правоугли, важи да је $SD^2 = OD^2 + OS^2$, где је $OD = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ dm}$. Сада је висина бочне стране $SD = \frac{5}{2} \text{ dm}$, па заменом у формули $P = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} + \frac{3a \cdot SD}{2}$ добијамо да је површина правилне тростране пирамиде $P = \frac{9}{4}(\sqrt{3} + 5) \text{ dm}^2$.



Сл. уз задатак 851

Сл. уз задатак 853

852. Сређивањем леве стране неједнакости добијамо

$$\begin{aligned} \left| \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} - \frac{b}{a} - \frac{c}{b} - \frac{a}{c} \right| &= \frac{|a^2c + b^2a + c^2b - b^2c - c^2a - a^2b|}{abc} \\ &= \frac{|a^2c + b^2a + c^2b - b^2c - c^2a - a^2b + abc - abc|}{abc} \\ &= \frac{|(b-c)(c-a)(a-b)|}{abc}. \end{aligned}$$


Како су a , b и c странице троугла, то је $|b - c| < a$, $|c - a| < b$ и $|a - b| < c$, па је

$$\left| \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} - \frac{b}{a} - \frac{c}{b} - \frac{a}{c} \right| = \frac{|b-c|}{a} \cdot \frac{|c-a|}{b} \cdot \frac{|a-b|}{c} < 1.$$

853. Продужимо странице AB и DC до пресека у тачки H (слика). Како је $AHDF$ паралелограм, јер је $AH \parallel DF$, $DH \parallel FA$ и $AF = DF$, и како је $AC = AF$, то је $AC = AH$. Из сличности троуглова HBC и HAD , имамо $\frac{BC}{AD} = \frac{BH}{AH}$, тј. $\frac{1}{AD} = \frac{AH - 1}{AH} = \frac{AC - 1}{AC}$, па је $\frac{1}{AD} + \frac{1}{AC} = 1$.

854. Нека је A једна плава тачка и B њој дијаметрално супротна тачка. Преостале тачке су крајеви тетива које су нормалне на пречник AB . Ако је B плава тачка, тада једна од тих тетива има црвено крајеве, па је A средиште лука одређеног том тетивом. Ако је B црвена тачка, тада према услову задатка постоји тетива чији су крајеви плави. Како међу преосталим тачкама има мање црвених него плавих тачака, постоји и тетива са црвеним крајевима. И у овом случају тачка A је средиште лука одређеног том тетивом.

855. Означимо $CN = BM = x$ и $AM = BC = y$. Нека је p права паралелна са AB која садржи тачку C и D тачка те праве таква да је $AMCD$ паралелограм (слика).



Сл. уз задатак 855

Правоугли троуглови MBC и NCD су подударни ($MB = NC = x$, $BC = CD = AM = y$), па је $\angle BCM = \angle CDN$. Како је $DC \perp BC$, одатле се лако изводи да је $DN \perp MC$. Како је $MC \parallel AD$, то је и $DN \perp AD$. При том је $DN = MC = AD$, тј. троугао NDA је једнакокраки и правоугли, па је $\angle NAD = 45^\circ$. Дакле, права AN сече праву AD под углом од 45° , па значи да сече и њој паралелну праву CM такође под углом од 45° .

856. Одредимо најпре колико има троуглова на које је подељен дати квадрат. Код сваког од темена тих троуглова које лежи унутар квадрата сустиче се неколико углова чији је збир 360° , док се код сваког темена квадрата сустиче неколико углова чији је збир 90° . Укупан збир тих углова је, дакле, $2005 \cdot 360^\circ + 4 \cdot 90^\circ$. Како је збир углова у сваком од троуглова 180° , то је тражени број троуглова

$$\frac{2005 \cdot 360^\circ + 4 \cdot 90^\circ}{180^\circ} = 4012.$$

Претпоставимо сада, супротно тврђењу, да је површина сваког од датих троуглова већа од $\frac{1}{1003}$. Онда би збир површина свих троуглова био већи од $4012 \cdot \frac{1}{1003} = 4$, дакле већи од површине датог квадрата, што је немогуће. Тиме је доказано да постоји троугао чија површина није већа од $\frac{1}{1003}$.

857. Једноставним трансформацијама се показује да је дата неједнакост еквивалентна свакој од следећих:

$$(1) \quad \begin{aligned} \frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - 1}{4} &\leqslant \frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2(ab + ac + ad + bc + bd + cd)}{16}, \\ 3(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) - 2(ab + ac + ad + bc + bd + cd) &\leqslant 4, \\ (a - b)^2 + (a - c)^2 + (a - d)^2 + (b - c)^2 + (b - d)^2 + (c - d)^2 &\leqslant 4. \end{aligned}$$

Не ограничавајући општост, можемо претпоставити да је $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d$. Користећи

чињеницу да је $x^2 \leq x$ за $0 \leq x \leq 1$, добијамо да тада важи

$$\begin{aligned} & (a-b)^2 + (a-c)^2 + (a-d)^2 + (b-c)^2 + (b-d)^2 + (c-d)^2 \\ & \leq (a-b) + (a-c) + (a-d) + (b-c) + (b-d) + (c-d) \\ & = 3(a-d) + (b-c) \leq 4(a-d) \leq 4, \end{aligned}$$

јер је $b-c \leq a-d$ и $a-d \leq 1$. Тиме је неједнакост (1), а са њом и дата неједнакост, доказана. Једнакост важи ако и само ако су два од датих бројева a, b, c, d једнака 1, а друга два једнака 0.

858. Дата једначина може се написати у облику

$$(1) \quad 2(x+y)^2 + (x-y)^2 = 664.$$

Бројеви $x+y$ и $x-y$ су исте парности. Из (1) следи да су оба парна.

Нека је $x+y = 2m$ и $x-y = 2t$, где су m и t цели бројеви. Тада се (1) може написати у облику

$$(2) \quad 2m^2 + t^2 = 166,$$


одакле закључујемо да су t и t^2 парни бројеви, док је m непаран. (Ако су и t и m парни, онда бисмо са леве стране у (2) имали број дељив са 4, а са десне број који није дељив са 4.)

Нека је $t = 2k$ и $m = 2n+1$, где је k цео, а n ненегативан цео број. Из (2) тада следи да је


$$(3) \quad k^2 = 41 - 2n(n+1).$$

Дакле, $41 - 2n(n+1) \geq 0$. Та неједнакост је задовољена само за $n = 0, 1, 2, 3, 4$. Међутим, само за $n = 4$ је број на десној страни једначине (3) потпун квадрат, $k^2 = 1$. Дакле, $k = 1$, $n = 4$, $m = 9$, $t = 2$, $x = 11$, $y = 7$ или $k = -1$, $n = 4$, $m = 9$, $t = -2$, $x = 7$, $y = 11$. Непосредно се порверава да су парови $(x, y) = (11, 7)$ и $(x, y) = (7, 11)$ решења дате једначине.

859. Не умањујући општост, претпоставимо да тачка C припада дужи BP (слика). Имајући у виду потенцију тачке M у односу на кружницу, имамо да је $MA^2 = MR \cdot MB$, дакле и $MP^2 = MR \cdot MB$. Из последње једнакости закључујемо да су троуглови MRP и MPB слични. Из те сличности следи да је $\angle MPR = \angle MBP$. Како је и $\angle PSC = \angle MBP$ (периферијски углови над истим луком), то је и $\angle MPR = \angle PSC$, одакле следи тврђење.



Сл. уз задатак 859



Сл. уз задатак 860

860. (а) Такве тачке су темена једног квадрата и његов центар (пресек дијагонала).

(б) Посматрајмо квадрат 7×7 издељен на јединичне квадрате и 64 тачке које су темена тих квадрата (слика). На слици се могу уочити $\binom{8}{2} \binom{8}{2} = 784$ правоугаоника са страницама на линијама мреже. Сваки од тих правоугаоника одређује 4 различита правоугла троугла (са теменима у три темена правоугаоника). Различити правоугаоници одређују различите троуглове. На тај начин добија се $784 \cdot 4 = 3136 > 2005$ различитих правоуглих троуглова са теменима у датим тачкама. (Јасно је да има и других правоуглих троуглова који нису обухваћени овим поступком.)

861. Дата једнакост еквивалентна је са

$$9(11a + b) = (a + b + c)(abc - 1),$$

где су a, b, c једноцифренi позитивни бројеви. Лева страна претходне једнакости је дељива са 9, па је таква и десна. При том, бар један од чинилаца на десној страни мора бити дељив са 9. Заиста, ако је само $a + b + c \equiv 0 \pmod{3}$ и $abc - 1 \equiv 0 \pmod{3}$, онда је $a \equiv b \equiv c \equiv 1 \pmod{3}$ и $11a + b \equiv 0 \pmod{3}$, па је лева страна дељива са 27. Закључујемо да је $a + b + c \equiv 0 \pmod{9}$ или $abc - 1 \equiv 0 \pmod{9}$.

(1) Ако је $abc - 1 \equiv 0 \pmod{9}$, онда је $11a + b = (a + b + c)k$, где је k цео број и $1 < k \leq 10$. Дакле, треба да испитамо случајеве $k = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$. Ако је $k = 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10$, онда број $9k + 1 = abc$ има прост делитељ већи од 9, што је немогуће. Преостаје да размотримо случајеве $k = 3$ и $k = 7$.

Ако је $k = 3$, онда је $8a = 2b + 3c$ и $abc = 28$. Јасно је да је c паран број, $c = 2c_1$, и важи $4a = b + 3c_1$ и $abc_1 = 14$. Лако се види да су b и c_1 непарни, па постоје две могућности: $a = 2, b = 7, c_1 = 1$ и $a = 2, b = 1, c_1 = 7$. Ни у једном од ова два случаја не постоји решење.

Ако је $k = 7$, онда је $4a = 6b + 7c$ и $abc = 64$. Јасно је да је c паран број, $c = 2c_1$, и важи $2a = 3b + 7c_1$ и $abc_1 = 32$. Лако се види да b и c_1 морају бити парни бројеви. Међутим, то је немогуће, јер то повлачи да је $a > 9$. Дакле, ни у овом случају нема решења.

(2) Размотримо случај кад је $a + b + c \equiv 0 \pmod{9}$, тј. $a + b + c = 9l$, где је l природан број.

Ако је $l \geq 2$, онда је $a + b + c \geq 18$, $\max\{a, b, c\} \geq 6$ и лако се види да је $abc \geq 72$ и $abc(a + b + c) > 1000$, па је случај $l \geq 2$ немогућ.

Ако је $l = 1$, имамо $11a + b = abc - 1$, тј.

$$11a + b + 1 = abc \geq \left(\frac{a + b + c}{3}\right)^3 = 27.$$

Сада постоје две могућности: $a = 1$ и $a = 2$.

Ако је $a = 2$, онда је $b(2c - 1) = 23$, па не постоји решење.

Ако је $a = 1$, тада је $b + c = 8$ и $11 + b = bc - 1$ или $b + (c - 1) = 7$ и $b(c - 1) = 12$, дакле могућа решења су $(a, b, c) = (1, 3, 5)$ и $(a, b, c) = (1, 4, 4)$. Лако се проверава да троцифренi бројеви 135 и 144 задовољавају услове задатка.


2006. година

862. Како је $27 \cdot 10^6 = 27\,000\,000$ и $3 \cdot 10^7 = 30\,000\,000$, то је $3 \cdot 10^7$ веће од $27 \cdot 10^6$.

863. Површина дате фигуре P једнака је збиру површина квадрата странице 4 м и правоугаоника страница 3 м и 10 м, (или збиру површина правоугаоника страница 4 м и 7 м и правоугаоника страница 3 м и 6 м), то јест $P = 46 \text{ m}^2$.

864. Како је $1+2+3+\dots+2006 = (1+2006)+(2+2005)+\dots+(1003+1004) = 1003 \cdot 2007$, то је тражени збир 2013 021.

865. Могуће је направити следећа три правоугаоника:



Сл. уз задатак 865

Најмањи обим има први правоугаоник.

866. Да би тражени број био непаран, цифра јединица мора да буде 1 или 3. Највећи такав број је онај коме је прва цифра (цифра стотина хиљада) највећа, па су све остале цифре 0. Због тога, највећи тражени шестоцифрени број је 300 001.

867. Скуп X који задовољава услов задатка може бити \emptyset , $\{2\}$, $\{3\}$, $\{4\}$, $\{5\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{2, 5\}$, $\{3, 4\}$, $\{3, 5\}$, $\{4, 5\}$, $\{2, 3, 4\}$, $\{2, 3, 5\}$, $\{2, 4, 5\}$, $\{3, 4, 5\}$ или $\{2, 3, 4, 5\}$.

868. Како је $\alpha = 180^\circ - \beta$, то је $180^\circ - 2\beta = 48^\circ$. Следи да је $\beta = 66^\circ$, па је њему комплементан угао од 24° .


869. Како је 520 дељив са 4 а није са 3, мора $\overline{17a}$ бити дељив са 3. Следи да $a \in \{1, 4, 7\}$.

870. Ако дужину дужи QB обележимо са x , онда ће дужина дужи AP бити $2x$, а дужина дужи PQ ће бити $4x$. Како је $7x = 28 \text{ cm}$, следи да је $x = 4 \text{ cm}$. Према томе, дужине дужи AP , PQ и QB су 8 cm , 16 cm и 4 cm . Како су M и D средишта дужи AP и QB , то је дуж MD једнака збиру дужи MP , PQ и QD , па је њена дужина 22 cm .


871. Како је $D(21, 24, 27) = 3$, дужина ивица исечених коцки је 3 cm , а има укупно $7 \cdot 8 \cdot 9 = 504$ коцке. Коцки које немају ниједну обојену страну ('унутрашње коцке') има $5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$, са две обојене стране ('ивичне коцке') има $5 \cdot 4 + 6 \cdot 4 + 7 \cdot 4 = 72$, а са три обојене стране ('темене коцке') има 8. Према томе, коцки које имају само једну обојену страну има $504 - (210 + 72 + 8) = 214$.

872. Нека је цифра десетица траженог броја x , а цифра јединица y . Из $\overline{xy} = 4(x+y)$ добија се $10x + y = 4x + 4y$, односно $2x = y$. Решења су 12, 24, 36 и 48.

873. Како троуглови ABD и ADC имају заједничку страницу AD и једнаке странице BD и DC , то је основица AB за 1 cm дужа од крака AC . Ако је x дужина (у cm) крака AC , обим троугла ABC је $3x+1$, па је $x=8$. Према томе, дужина основице AB је 9 cm .



Сл. уз задатак 873



Сл. уз задатак 875

874. Обележимо са n природан број који задовољава услов задатка, а са q количник који се добија при дељењу n са 6. Тада је $n = 6q + q$, тј. $n = 7q$. Мора бити $q < 6$, јер је q истовремено и остатак при дељењу природног броја са 6. Такође је $q > 0$, јер је n природан број. Према томе, $n \in \{7, 14, 21, 28, 35\}$. Тражени збир је 105.


875. Нека је тачка D подножје висине из темена C , тачка E пресек симетрале $\angle ACB$ и странице AB , а $\angle ABC = \beta$. Тада је $\angle BAC = 2\beta$, а $\angle ECB = \frac{1}{2}(180^\circ - 2\beta - \beta) = 90^\circ - \frac{3}{2}\beta$. Из правоуглог троугла BCD добијамо да је $\angle DCB = 90^\circ - \beta$, па је $\angle DCB$ већи од $\angle ECB$ за $\frac{1}{2}\beta$. Према томе, $\angle DCE = \frac{1}{2}\beta = \frac{1}{2}(\angle BAC - \angle ABC)$.

876. За пешачење у једном смеру потребно му је $7 : 2 = 3\frac{1}{2}$ сати, што значи да му за јахање у једном смеру треба $5\frac{1}{4} - 3\frac{1}{2} = 1\frac{3}{4}$ сати. Да је јахао у оба смера требало би му $2 \cdot 1\frac{3}{4} = 3\frac{1}{2}$ сати.


877. Како је $\sqrt{7} < 3$, то је $7 - \sqrt{7} > 7 - 3 = 4$. Следи да је $\sqrt{7} - \sqrt{7} > 2$.

878. Како је $8^{2n+1} \cdot 16^n = (2 \cdot 4)^{2n+1} \cdot 4^{2n} = 2^{2n+1} \cdot 4^{4n+1} \cdot 2 \cdot 4^n \cdot 4^{4n+1} = 2 \cdot 4^{5n+1}$, следи да је вредност датог израза једнака 2.

879. Нека су a и b дужине основица, c дужина крака, а h дужина висине (све у cm) датог трапеза. Из $h \frac{a+b}{2} = 32$ следи да је $a+b = 32 : \sqrt{2} = 16\sqrt{2}$. Како је оштар угао трапеза 45° , то је $c = h\sqrt{2} = 4$. Према томе, обим датог трапеза је $8(2\sqrt{2} + 1)\text{ cm}$.



Сл. уз задатак 879



Сл. уз задатак 881

880. Ако су x и y цифре јединица датих бројева, из услова задатка добијамо да је $6x \cdot 6y = \overline{xy} \cdot \overline{xy}$. Из једнакости $(60+x)(60+y) = (10x+6)(10y+6)$ следи $3600 + xy = 100xy + 36$, односно $xy = 36$. Како су x и y цифре, оне могу бити једино 4 и 9, па су тражени бројеви 64 и 69.


881. Како је $\angle DEC = \angle AED = \angle EDC$, следи да је $CE = CD$, односно $CE = AB$. У правоуглом троуглу EBC хипотенуза EC два пута је већа од катете BC . Према томе, $\angle CEB = 30^\circ$, што значи да је $\angle AED = \angle DEC = 75^\circ$.

882. Како је квадрат било ког реалног броја ненегативан број, добијамо да је $4x^2 - 4x + 3 = (2x - 1)^2 + 2 \geq 2 > 0$.

883. Нека су дужине катета a и b (у cm). По услову задатка је $a + b = 22$ и $ab = (a - 4)(b + 2)$. Из друге једначине добија се $2a - 4b = 8$, тј. $a - 2b = 4$. Решавањем система једначина $a + b = 22$, $a - 2b = 4$ добијамо $a = 16$, $b = 6$.

884. Множењем датих једнакости добијамо $(xy) \cdot (yz) \cdot (zx) = 20 \cdot 35 \cdot 28$ тј. $(xyz)^2 = 140^2$.

Следи да је $xyz = 140$ или $xyz = -140$. Решења су $x = 4$, $y = 5$, $z = 7$, односно $x = -4$, $y = -5$, $z = -7$.



Сл. уз задатак 885

885. Нека је O центар велике кружнице, O_1 и O_2 центри две суседне мале кружнице k_1 и k_2 и нека је A тачка додира велике кружнице и кружнице k_1 (слика). Тада је OA полу пречник велике кружнице који садржи тачку O_1 . Како је $OO_1 = OO_2 = R - r$ и $\angle O_1OO_2 = \frac{1}{6}360^\circ = 60^\circ$, то је троугао OO_1O_2 једнако страничан. Због тога је $OO_1 = O_1O_2$, то јест $R - r = 2r$. Следи да је $R = 3r$.

886. Означимо са a и b две различите цифре које се појављују у четвороцифреном броју, с тим што ћемо са a означити цифру на првом месту. Сваки број који задовољава услове задатка припада једном од следећих седам типова: $aaab$, $aaba$, $abaa$, $aabb$, $abab$, $abba$, $abbb$. Сваки тип садржи $9 \cdot 9$ бројева. Наиме, цифра a се може изабрати на 9 начина (различита од 0), а цифра b такође на 9 начина (различита од a). Према томе, има укупно $7 \cdot 9 \cdot 9 = 567$ четвороцифреных бројева са тачно две различите цифре.

887. Највећи такав број је 976320, а најмањи 203679. Њихова разлика је $976320 - 203679 = 772641$.

888. Решења ове неједначине су сви природни бројеви већи од 2006 и мањи од 8008, тј. $x \in \{2007, 2008, \dots, 8007\}$. Тражених решења има $8007 - 2006 = 6001$.

889. Прекlopљени део је, очигледно, квадрат странице 3 cm. Обим добијене фигуре (у cm) је $15 + 2 \cdot 3 + 12 + 2 \cdot 12 + 3 = 60$.

890. Ако дужину краће странице правоугаоника означимо са x (у cm), онда је дужина дуже странице тог правоугаоника једнака $4x$. Како је његов обим 20 cm, следи да је $2 \cdot (4x + x) = 20$, односно $x = 2$. Дужина странице квадрата је $4x$, тј. 8 cm, а његова површина 64 cm^2 .

891. За нумерацију првих 100 страна употребљено је 20 седмица, и то за нумерацију следећих страна: 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87 и 97. Слично, за нумерацију наредних 200 страна употребљено је још 40 седмица, тако да је остало 17 седмица. Значи да књига има 378 страна, односно 189 листова.

892. Провером за $x \in \{0, 1, \dots, 9\}$ добијају се два решења: $x = 6$, $y = 5$ и $x = 9$, $y = 2$.

893. Како је по услову задатка $A = \{500, 501, \dots, 2005\}$ и $B = \{1000, 1002, \dots, 2006\}$, добијамо да је $A \setminus B = \{500, 501, \dots, 999, 1001, 1003, \dots, 2005\}$ и $B \setminus A = \{2006\}$. Следи да је $A \star B = \{500, 501, \dots, 999, 1001, 1003, \dots, 2005, 2006\}$.

894. Означимо већи угао са α , а мањи са β . Како је $\frac{8}{9}$ правог угла 80° , а $\frac{1}{4}$ правог угла $22^\circ 30'$, то је $\alpha = \beta + 22^\circ 30'$, а $\alpha + \beta = 80^\circ$. Одатле следи да је $2\beta + 22^\circ 30' = 80^\circ$, па је $2\beta = 57^\circ 30'$. Коначно, добијамо да је $\beta = 28^\circ 45'$, а $\alpha = 51^\circ 15'$.


895. Множењем два двоцифрена броја добија се број који може да има или 3 или 4 цифре, јер је $10 \cdot 10 = 100$, а $99 \cdot 99 = 9801$. Како је $7777 = 7 \cdot 11 \cdot 101$, а 101 је прост број, следи да производ два двоцифрена броја не може бити 7777. С обзиром да је $777 = 3 \cdot 7 \cdot 37$, једини двоцифрени бројеви који задовољавају услове задатка су 21 и 37.

896. Сем 2. јануара који је био петак, у години је било још 52 петка, што значи да је та година имала $2 + 7 \cdot 52 = 366$ дана, тј. да је била преступна. У таквој години, између 1. јануара и 1. априла има тачно $30 + 29 + 31 = 90$ дана, што значи да је 1. април 92. дан у години. Како је $92 = 7 \cdot 13 + 1$, а 1. јануар је био четвртак, следи да је 1. април био такође четвртак.


897. Како је $\frac{21}{37} = 0,\overline{567}$, а $2006 = 3 \cdot 668 + 2$, на 2006-ом месту иза децималне запете налази се цифра 6.

898. Нека је ученик требало да сабере бројеве x и y . По услову задатка је $x + y = 62,5876$. Како се померањем децималне запете за два места удесно број повећа 100 пута, то је $x + 100y = 295$. Даље добијамо да је $99y = 295 - 62,5876$, па је $y = 2,3476$, а $x = 60,24$.

899. Нека су D и E тачке у којима висина из темена A , односно симетрала угла код темена A секу крак BC . Угао на основици обележимо са α . Како је AE симетрала угла код темена A , то је $\angle BAE = \frac{\alpha}{2}$, па је $\angle BAD = \frac{\alpha}{2} + 18^\circ$. Троугао ABD је правоугли, па је $\angle BAD + \angle ABD = 90^\circ$, тј. $\frac{\alpha}{2} + 18^\circ + \alpha = 90^\circ$. Следи да је $\frac{3}{2}\alpha = 72^\circ$, односно $\alpha = 48^\circ$.



Сл. уз задатак 899



Сл. уз задатак 900


900. Како је $\angle BCF = 90^\circ - \angle FCD = 30^\circ$ и $\angle EDF = \angle EDA - \angle FDA = 60^\circ - (90^\circ - \angle CDF) = 30^\circ$, то су ова два угла једнака. Такође је $BC = AD = ED$ и $CF = DF$, па на основу става СУС следи да је $\triangle BCF \cong \triangle EDF$. Одатле је $FB = FE$. Како је и $\angle CFB = \angle DFE$, добијамо да је $\angle EFB = \angle DFC = 60^\circ$. Према томе, $\triangle BEF$ је једнакокраки са углом између кракова од 60° , па је једнакостранничан.

901. Сабирајући 5 сабирaka из скупа $\{-1, 0, 1\}$ могуће је добити 11 збирова, и то: $-5, -4, \dots, 4, 5$. Како врста, колона и дијагонала у табелици има 12, по Дирихлеовом принципу бар два збира морају бити једнака.


902. Из $\frac{a+b}{b} = 2 - \sqrt{2}$ следи да је $\frac{a}{b} + 1 = 2 - \sqrt{2}$, тј. $\frac{a}{b} = 1 - \sqrt{2}$. Одатле је $\frac{b}{a} = \frac{1}{1-\sqrt{2}} = \frac{1}{1-\sqrt{2}} \cdot \frac{1+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} = -(1+\sqrt{2})$. Како је $\frac{a^2+b^2}{ab} = \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$, вредност датог израза је $(1-\sqrt{2}) + (-1-\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}$.

903. Нека је тачка O пресек дијагонала датог трапеза и нека су x и y дужине дужи AO и CO (слика). Тада су и дужине дужи BO и DO такође x и y . Како су троуглови

ABO , CDO и BCO правоугли, користећи Питагорину теорему добијамо да је $a^2 = 2x^2$, $b^2 = 2y^2$ и $c^2 = x^2 + y^2$. Одатле следи да је $2c^2 = a^2 + b^2$, па је $c = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$.



Сл. уз задатак 903



Сл. уз задатак 905

904. Како је $a = 2^{2003} \cdot (2^2 - 2 + 1) = 3 \cdot 2^{2003}$, $b = 2^{2004} \cdot (1 - 2 + 2^2) = 3 \cdot 2^{2004} = 6 \cdot 2^{2003}$ и $c = 3\sqrt{3} \cdot 2^{2003}$, узимајући да је $2^{2003} = A$, добијамо да је $a^2 = 9A^2$, $b^2 = 36A^2$ и $c^2 = 27A^2$. Следи да је $a^2 + c^2 = b^2$.


905. У трапезу $APRD$ троуглови APR и APD имају једнаке површине, што значи да и троуглови PRS и ASD имају једнаке површине (слика). На исти начин се показује да и троуглови PQR и BCQ имају једнаке површине. Према томе, површина четвороугла $PQRS$ је једнака збиру површина троуглова ASD и BCQ .

906. Претпоставимо супротно, тј. да је у свакој групи производ бројева мањи од 72. Тада би производ бројева у свакој од група био мањи или једнак 71, па би производ свих бројева био мањи или једнак 71^3 , односно 357911. Међутим, производ бројева од 1 до 9 је 362880. Према томе, дата претпоставка није тачна, односно постоји група у којој производ бројева није мањи од 72.

907. Како је $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = a^2$, следи да је $x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 - 2$. Даље је $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 = (a^2 - 2)^2$, па је $x^4 + \frac{1}{x^4} = (a^2 - 2)^2 - 2$, тј. $x^4 + \frac{1}{x^4} = a^4 - 4a^2 + 2$.

908. Множењем почетне једнакости са $1000(x+y+z)$ добијамо да је $1000 = \overline{xyz} \cdot (x+y+z)$. Како је $x+y+z \leq 27$, могућа су следећа представљања броја 1000 као производа два броја: $500 \cdot 2$, $250 \cdot 4$, $200 \cdot 5$, $125 \cdot 8$, $100 \cdot 10$, $50 \cdot 20$ и $40 \cdot 25$. Провером налазимо да је једино решење задатка: $x = 1$, $y = 2$, $z = 5$.

909. Обележимо са M и N подножја нормала из тачке D на катете AC и BC . Како дуж CD полови прав угло ACB , следи да су троуглови CMD и CND једнакокрако правоугли, па је четвороугао $MDNC$ квадрат. Обележимо дужину његове странице са x . Како је површина троугла ABC једнака збиру површина троуглова CDB и ADC , добијамо да је $\frac{ab}{2} = \frac{ax}{2} + \frac{bx}{2}$. Одатле следи да је $x = \frac{ab}{a+b}$. Како је CD дијагонала квадрата $MDNC$, то је њена дужина $x\sqrt{2}$, тј. $\frac{ab}{a+b}\sqrt{2}$.



Сл. уз задатак 909

910. За $x < 1$ дата једначина је еквивалентна са $1 - x + 2 - x = a$. Следи да је $x = \frac{3-a}{2}$, па једначина има највише једно решење без обзира на a . Слично, за $x \geq 2$ дата једначина

је еквивалентна са $x - 1 + x - 2 = a$, па је $x = \frac{a+3}{2}$. Опет, без обзира на a једначина има највише једно решење. За $1 \leq x < 2$ дата једначина је еквивалентна са $x - 1 + 2 - x = a$, односно са $a = 1$, па ако је $a \neq 1$ нема решења, а ако је $a = 1$ има бесконачно много решења. На основу сва три случаја закључујемо да дата једначина за $a \neq 1$ има највише два решења, док за $a = 1$ има бесконачно много решења.

911. Растојања од пресека дијагонала до ивица квадра једнака су половинама дужина дијагонала страна квадра. Означимо дужине ивица квадра са a , b и c (у cm) тако да је $a^2 + b^2 = 14^2$, $b^2 + c^2 = 16^2$ и $a^2 + c^2 = 18^2$. Из прве две једнакости добијамо да је $a^2 + c^2 + 2b^2 = 14^2 + 16^2 = 452$, па користећи и трећу једнакост израчунавамо да је $2b^2 = 452 - 18^2$. Следи да је $b^2 = 64$. Даље се лако добија да је $a^2 = 132$ и $c^2 = 192$, па је $a = 2\sqrt{33}$, $b = 8$ и $c = 8\sqrt{3}$. Запремина квадра (у cm³) је $V = abc = 384\sqrt{11}$.

912. Дељењем броја 2030 редом једноцифреним бројевима 1, 2, ..., 9 добија се да је 2030 дељив само бројевима 1, 2, 5, и 7, тј. да је $2030 = 2030 \cdot 1 = 1015 \cdot 2 = 406 \cdot 5 = 290 \cdot 7$. Решења су 406 и 290.

913. Површина дате фигуре једнака је површини осам малих квадрата, па је површина малог квадрата 25 mm², а дужина његове странице 5 mm. Обим дате фигуре (у mm) је $16 \cdot 5 = 80$.

914. Погледајмо спискове са именима такмичара. Укупно се на сва три списка налази 90 имена. Од тог броја 23 имена су само на једном од тих спискова, а 23 се налазе на по два списка. Како је $23 + 2 \cdot 23 = 69$, на списковима остаје укупно 21 име, при чему су то уствари 7 имена која се налазе на сва три списка. Према томе, 7 ученика је учествовало на сва три такмичења.

915. Број који је при дељењу са 11 дао резултат 21 је 231. Када уклонимо цифру 1 која је дописана, остаје број 23. Слично, из $13 \cdot 23 = 299$ закључујемо да је пре дописивања цифре 9 био број 29. Дакле, почетни број је 29.


916. Ако на највећу коцку ставимо средњу коцку, тада је површина насталог тела једнака збиру површина тих коцки умањеном за двоструку површину једне стране средње коцке. Како је $6 \cdot 3^2 + 6 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2^2 = 70$, та површина је 70 cm^2 . Ако сад мању коцку прислонимо уз обе коцке, површина новог тела је најмања могућа и једнака је збиру површина правоформираног тела и најмање коцке, умањеном за четврсторуку површину једне стране најмање коцке. Та површина (у cm²) је $70 + 6 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1^2 = 72$.

917. Ако је x број белих, тада је $\frac{7}{8}x$ број црвених ружа. Из услова задатка добијамо једначину $\frac{7}{8}x + 7 = x - 7$, чије је решење број 112. Дакле, белих ружа има 112, а црвених $\frac{7}{8} \cdot 112$, односно 98.


918. Од 5 узастопних природних бројева бар један мора бити дељив са 2, бар један са 3 и бар један са 5, па производ тих 5 бројева мора бити дељив и са 10 и са 3. Због тога, цифра јединица мора бити 0, а ако цифру стотина обележимо са a , збир $9 + 5 + a + 4 + 0$ мора бити дељив са 3. Следи да је a из скупа $\{0, 3, 6, 9\}$. Провером за свако a из овог скупа следи да је једино за $a = 0$ добијени број производ 5 узастопних природних бројева и то $95040 = 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12$.

919. Из $E \subset B$ следи да је $a = 1$. Из $B \subset A$ закључујемо да је или $c = 4$ или $d = 4$. Не може бити $c = 4$, јер и c и 4 припадају скупу C , па је $d = 4$. Даље, из $D \subset A$ следи да је $c = 3$. Коначно, из $C \subset A$ закључујемо да је $b = 2$.

920. Како је површина правоугаоника $TURS$ једнака $\frac{2}{7}$ површине правоугаоника $PQRS$, следи да је површина квадрата $PQUT$ једнака $\frac{5}{7}$ површине правоугаоника $PQRS$, па је површина правоугаоника $PQRS$ једнака 35 cm^2 . Одатле следи да је површина правоугаоника $TURS$ једнака 10 cm^2 . Како је то $\frac{2}{11}$ површине правоугаоника $ABCD$, добијамо да је површина правоугаоника $ABCD$ једнака 55 cm^2 .



Сл. уз задатак 920



Сл. уз задатак 923

921. Добијени низ је 2357111317192329 и он садржи 16 цифара, тако да након брисања 9 цифара остаје седмоцифрен број. Како је цифра 9 на петом месту гледано са десне стране, она не може бити прва цифра траженог броја, већ испред ње треба узети две цифре. Тражени број ће бити највећи ако за те две цифре узмемо седмице. Даље, брисањем цифара 2, 3, 5, 1, 1, 1, 3, 1, 1 остаје број 7792329 који је највећи могућ.

922. Нека су x и y поменути бројеви. Тада је $\frac{7}{9}x - \frac{7}{9}y = \frac{7}{9}(x-y) = \frac{3}{7}$, па је $x-y = \frac{27}{49}$. Следи да је $\frac{3}{4}y - \frac{3}{4}x = -\frac{3}{4}(x-y) = -\frac{81}{196}$.

923. Тачка O је центар кружнице уписане у троугао ABC , па је AO симетрала угла BAC (слика). Због тога је $\angle KAO = \angle OAB$. Како је $KO \parallel AB$, следи да је $\angle OAB = \angle AOK$, па је $\angle KAO = \angle AOK$. Троугао AOK је једнакокраки, па је $KA = KO$. Аналогно се добија да је $LB = LO$. Ако је $O_{\Delta ABC}$ обим троугла ABC , онда је $O_{\Delta ABC} = AB + BC + CA = AB + BL + LC + CK + KA = AB + (OL + LC + CK + KO) = c + s$.


924. Како су све цифре којима се записује тражени број парне, следи да ће и тај број бити паран. Да би био дељив са 18 потребно је још да буде дељив са 9, односно да му збир цифара буде дељив са 9. Најмањи такав збир, узимајући у обзир да су све цифре парне, је 18. Тражени број ће бити најмањи ако му је прва цифра 2, тако да збир осталих цифара треба да буде 16. Најмање цифара чији је збир 16 се користи ако 16 представимо као збир $6+6+2+2$. Тражени број је 20...02266, где у запису има 2001 нула.

925. Обележимо тачку пресека дијагонала паралелограма са S (слика). Како је S средиште обе дијагонале, следи да је тачка K тежиште троугла ACD , па је $3KD = \frac{2}{3}SD = 2SD = BD$.


926. Запремина сока од боровнице је два пута већа од запремине сока од рибизле, па је мерни број укупне запремине сока дељив са три. Укупна запремина балона је 7ℓ , а како је 74 број који при дељењу са три даје остатак 2, празан је онај балон чији мерни број запремине при дељењу са три такође даје остатак 2. Једини такав балон је онај чија је запремина 14ℓ , па је он празан. Следи да је укупна запремина сокова 60ℓ , тако да је

запремина соке од рибизле 20ℓ . Тим соком напуњени су балони од 7 и 13ℓ . Балони од 9 , 15 и 16ℓ напуњени су соком од боровнице.

- 927.** Из једнакости $\frac{a^2}{a+3} = \frac{a^2-9}{a+3} + \frac{9}{a+3} = a-3 + \frac{9}{a+3}$ следи да је $\frac{a^2}{a+3}$ цео број једино ако је $\frac{9}{a+3}$ цео број, односно ако $a+3 \in \{-9, -3, -1, 1, 3, 9\}$. Тражени скуп је $\{-12, -6, -4, -2, 0, 6\}$.



Сл. уз задатак 925




Сл. уз задатак 928


- 928.** Нека је тачка O пресек дијагонала датог ромба $ABCD$. Обележимо са a , d_1 и d_2 дужине (у см) странице и дијагонала ромба. Обим ромба је 36 см, па је $a = 9$. Дијагонале ромба се половине и нормалне су једна на другу, па применом Питагорине теореме на троугао ABO добијамо да је $(\frac{d_1}{2})^2 + (\frac{d_2}{2})^2 = a^2$, тј. $d_1^2 + d_2^2 = 324$. На основу услова $d_1 + d_2 = 20$ имамо да је $400 = (d_1 + d_2)^2 = d_1^2 + d_2^2 + 2d_1d_2 = 324 + 2d_1d_2$, што значи да је $d_1d_2 = 38$. Према томе, површина датог ромба је 19 cm^2 .

- 929.** Из једнакости $\sqrt{ab} = a + \sqrt{b}$ добијамо да је $10a + b = (a + \sqrt{b})^2 = a^2 + 2a\sqrt{b} + b$, односно $10a = a^2 + 2a\sqrt{b}$. Како је $a \neq 0$, следи да је $a = 10 - 2\sqrt{b}$. То значи да је \sqrt{b} цео број, па b може бити само $0, 1, 4$ или 9 . Налажењем одговарајуће вредности за a и провером датог услова добијамо да су тражени бројеви: $49, 64$ и 81 .

- 930.** Нека је O центар датог круга, ABO карактеристични троугао правилног дванаестоугла, а BC висина тог троугла. Како је $\angle AOB = 30^\circ$, следи да је $|BC| = \frac{R}{2}$, $|OC| = R\frac{\sqrt{3}}{2}$ и $|AC| = R - R\frac{\sqrt{3}}{2}$. Применом Питагорине теореме на троугао ABC добијамо да је тражена дужина странице правилног дванаестоугла $|AB| = R\sqrt{2 - \sqrt{3}}$.



Сл. уз задатак 930



Сл. уз задатак 933


- 931.** Тражени бројеви су облика \overline{abcba} . Тих бројева има колико и троцифрених бројева \overline{abc} , тј. $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.

- 932.** Нека је година рођења те особе \overline{abcd} . По услову задатка је $\overline{abcd} + a + b + c + d = 2006$, тј. $1001a + 101b + 11c + 2d = 2006$. Мора бити $a = 1$ или $a = 2$. Ако је $a = 1$, онда је


$101b + 11c + 2d = 1005$. Одавде је $b = 9$, па је $11c + 2d = 96$. Провером се добија $c = 8$, $d = 4$. Дакле, једно решење је 1984. Ако је $a = 2$, онда је $101b + 11c + 2d = 4$. Следи да је $b = 0$, $c = 0$ и $d = 2$. Друго решење је 2002.

933. Тачка $M(4, 6)$ припада и графику функције $y = x + 2$ и графику функције $y = kx + n$, па је она теме троугла који граде ти графици и x оса (слика). Онда је дужина висине троугла из темена M једнака 6. Како је површина троугла 36, следи да је дужина одговарајуће странице 12. Један крај те странице је у тачки $(-2, 0)$, па ће други бити или у $A(10, 0)$ или у $B(-14, 0)$. График функције $y = kx + n$ садржи или тачке M и A , или M и B . У првом случају из система $6 = 4k + n$ и $0 = 10k + n$, добија се $k = -1$ и $n = 10$. У другом случају из система $6 = 4k + n$ и $0 = -14k + n$, добија се $k = 1/3$ и $n = 14/3$.

934. Нека су дужине (у см) крака, висине, веће и мање основице трапеза $ABCD$ и полупречника круга редом c, h, a, b и r . Како је $h = 2r = 4$, а површина (у cm^2) $P = 20$, из формуле $P = \frac{a+b}{2}h$ добијамо да је $a + b = 10$. Због једнакости тангентних дужи је $c = \frac{a}{2} + \frac{b}{2}$, па је $c = 5$. Нека је CE висина датог трапеза. Како је $BE = \frac{a-b}{2}$, из правоуглог троугла BCE добијамо да је $\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = 5^2 - 4^2$, па је $a - b = 6$. Даље лако следи $a = 8$, $b = 2$.



Сл. уз задатак 934



Сл. уз задатак 936


935. Из услова $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$ следи $\frac{ab + bc + ca}{abc} = 0$, односно $ab + bc + ca = 0$. Због тога је $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = a^2 + b^2 + c^2$. Како су a, b и c различити од 0, следи $a^2 + b^2 + c^2 > 0$. Према томе, $a + b + c \neq 0$.

936. Обележимо са x дужине (у см) дужи које раван одсеца од ивица коцке (слика). Како је мањи део на који раван дели коцку тространа пирамида, његова запремина је $\frac{x^3}{6}$. Запремина већег дела се добија када се од запремине коцке одузме запремина мањег дела и једнака је $125 - \frac{x^3}{6}$. По услову задатка је $(125 - \frac{x^3}{6}) : \frac{x^3}{6} = 371 : 4$, одакле следи да је $4 \cdot (125 - \frac{x^3}{6}) = 371 \cdot \frac{x^3}{6}$. Даље је $\frac{375}{6} \cdot x^3 = 500$, па је $x^3 = 8$, односно $x = 2$. Већи и мањи део коцке имају заједничку страну (део равни који пресеца коцку), па ће разлика површина тих делова (у cm^2) бити $(3 \cdot 25 + 3 \cdot (25 - \frac{2 \cdot 2}{2})) - 3 \cdot \frac{2 \cdot 2}{2} = 138$.


937. Није могуће. Постоји врста у којој се налази број 7 и врста у којој се не налази број 7. У првој врсти је производ бројева дељив са 7, а у другој није, па ти производи не могу бити једнаки.

938. Нека је x цена карте (у динарима) без попуста. Путник је очигледно карту резервисао или 7 или 14 или 30 дана пре путовања. Претпоставимо да је то учинио 7 дана пре путовања. Тада је $0,9 \cdot x = 21\,000$, па је $x = \frac{70\,000}{3}$. Да је резервисао 6 дана пре путовања платио би је 25 200 динара и то би била цена карте без попуста, тј. x . Контрадикција. Ако је путник резервисао карту 14 дана пре путовања, тада је $0,75 \cdot x = 21\,000$, па је $x = 28\,000$. Да је резервисао дан касније, морао би да плати $0,9 \cdot x$, а то је 25 200 динара, што је тачно 4 200 динара више. Према томе, путник је карту резервисао 14 дана пре путовања. Што се тиче трећег случаја, сличним резоновањем као у првом случају добија се да је и он неодговарајући.

939. Како је $\triangle ABE \cong \triangle DCE$ (једнаке по две странице и углови између њих), следи да је $\angle ABE = \angle DCE$. Слично, $\triangle BCF \cong \triangle ADF$ (такође једнаке по две странице и углови између њих), па је $FB = FA$. Одатле следи да је $\angle ABF = \angle BAF$. Како је $\angle BAF = \angle AFD$ (углови са паралелним крацима), добијамо да је $\angle ABF = \angle AFD$. На основу свега овога и чињенице да је спољашњи угао једнак збиру два несуседна унутрашња угла троугла добијамо да је $\angle EBF = \angle ABF - \angle ABE = \angle AFD - \angle DCE = \angle FGC = \angle EGA$.



Сл. уз задатак 939




Сл. уз задатак 941

940. У пуном миксеру укупна количина чоколаде је 3,5 пута већа од количине беле чоколаде. Због тога ће црне чоколаде бити $\frac{5}{7}$, а беле $\frac{2}{7}$ од пуног миксера. За то је потребно да славина за црну чоколаду буде отворена $\frac{5}{7} \cdot 23$ минута, а за белу $\frac{2}{7} \cdot 17$ минута. Пошто је $\frac{5}{7} \cdot 23 - \frac{2}{7} \cdot 17 = \frac{81}{7}$, славину за белу чоколаду треба отворити $11\frac{4}{7}$ минута након отварања славине за црну чоколаду.


941. Нека су B_1 и B' средиште катете AC и пресек дијагонала квадрата чија је страница та катета, а C_1 и C' средиште хипотенузе AB и пресек дијагонала квадрата чија је страница та хипотенуза (слика). Како је A_1C_1 средња линија троугла ABC , следи да је $A_1C_1 = \frac{CA}{2}$, па је $A_1C_1 = B'B_1$. Слично се добија да је $C_1C' = B_1A_1$. Како је још и $\angle A_1C_1B = \angle CB_1A_1$ (углови са паралелним крацима), односно $\angle A_1C_1C' = \angle B'B_1A_1$, следи да је $\triangle A_1C_1C' \cong \triangle B'B_1A_1$. Одавде добијамо да је $A_1C' = A_1B'$, па важи тврђење задатка.

942. Обележимо са x прву цифру траженог, односно последњу цифру новог броја. Како је нови број пет пута већи од траженог, он је дељив са 5, па следи да је $x = 0$ или $x = 5$. Не може бити $x = 0$ јер је x прва цифра траженог броја, а не може ни $x = 5$ јер би тада нови број имао цифру више него тражени број. Следи да не постоји број са траженим својством.

943. Центри O , O_1 и O_2 кругова k , k_1 и k_2 су колинеарне тачке. Нека су C и D додирне тачке кругова k_1 и k_2 , односно k_2 и k и нека су r_1 и r_2 дужине полупречника (у cm) кругова k_1 и k_2 . Како је $OC = \frac{AB}{2} = 5\sqrt{2}$, $OO_1 = r_1\sqrt{2}$ и $O_1C = r_1$, следи да је $r_1\sqrt{2} + r_1 = 5\sqrt{2}$. Из ове једнакости добијамо да је $r_1 = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1} = 5\sqrt{2}(\sqrt{2}-1) = 5(2-\sqrt{2})$. Слично, из $OD = 10$, $OC = 5\sqrt{2}$ и $CD = 2r_2$, следи да је $5\sqrt{2} + 2r_2 = 10$, односно $2r_2 = 5(2-\sqrt{2})$. Према томе, $r_1 : r_2 = 2$.



Сл. уз задатак 943



Сл. уз задатак 946

944. За $p = 2$ је $p^2 + 11 = 15$, а делиоци броја 15 су 1, 3, 5 и 15. За $p = 3$ је $p^2 + 11 = 20$, а делилаца броја 20 има шест и то су : 1, 2, 4, 5, 10 и 20. Ако је $p > 3$, онда је p облика $6k \pm 1$, $k \in \mathbb{N}$, па је $p^2 + 11 = (6k \pm 1)^2 + 11 = 36k^2 \pm 12k + 12 = 12 \cdot (3k^2 \pm k + 1)$. Дакле, $12 | p^2 + 11$ и $p^2 + 11 > 12$. Како број 12 има шест делилаца, следи да број $p^2 + 11$ има више од 6 делилаца јер је међу делиоцима бар још и сам број $p^2 + 11$. Једино решење је $p = 3$.

945. Бројеви 1, 2 и 3 имају једноцифрене квадрате који заузимају прва 3 места у датом низу цифара. Бројеви од 4 до 9 (укупно 6 бројева) имају двоцифрене квадрате који заузимају следећих 12 места у датом низу цифара. Бројеви од 10 до 31 (укупно 22 броја) имају троцифрене квадрате који заузимају наредних 66 места у датом низу цифара. Бројеви од 32 до 99 (укупно 68 бројева) имају четвороцифрене квадрате који заузимају следећих 272 места у датом низу цифара. Бројеви од 100 до 316 (укупно 217 бројева) имају петоцифрене квадрате који заузимају још 1085 места у датом низу цифара. Дакле, цифра јединица квадрата броја 316 се налази на 1438. месту у низу. Квадрати следећа 94 броја (од 317 до 410) су шестоцифрени бројеви, па заузимају још 564 места у датом низу, што значи да је цифра јединица квадрата броја 410 на 2002. месту у датом низу цифара. Како је $411^2 = 168921$, то ће 2006. цифра у датом низу бити 9.

946. Нека су D_1 , G и G_1 редом средишта дужи FC , AD и AD_1 (слика). Тада је E средиште дужи GD , па су DD_1 , GG_1 и EF средње линије троуглова FBC , ADD_1 и трапеза DD_1G_1G . Због тога је $CD_1 = D_1F = FG_1$ и $D_1G_1 = G_1A$. Према томе, $AF : FC = 3 : 2$.


947. Ако је $a + b + c = 2k$, онда је $a + b + d = 8k$, $a + c + d = 8k$ и $b + c + d = 6k$. Тада је $3(a + b + c + d) = 24k$, тј. $a + b + c + d = 8k$, па је $a = 2k$, $b = 0$, $c = 0$ и $d = 6k$. Како су a, b, c и d цифре и $d = 3a$, следи да су решења бројеви 1003, 2006 и 3009.

948. (а) Сваки природан број n може се представити у облику $7k + r$, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, а $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Како је $n^3 = 7(49k^3 + 21k^2r + 3kr^2) + r^3$, следи да је остатак при дељењу n^3 са 7 исти као остатак при дељењу r^3 са 7. Како $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ могући остаци при дељењу куба природног броја са 7 су 0, 1 и 6.

(б) Из $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ следи да је $(2^3)^{668} \equiv 1 \pmod{7}$. Како је $2^{2006} = 4 \cdot (2^3)^{668}$ добијамо да је $2^{2006} \equiv 4 \pmod{7}$. Дакле, 2^{2006} при дељењу са 7 даје остатак 4. Користећи резултат под (а) добијамо да остатак при дељењу $x^3 + y^3$ са 7 може бити 0, 1, 2, 5 или 6. Према томе, не постоје тражени бројеви.

949. Нека је висина празног дела суда пре нагињања h . Запремина воде у суду пре и после нагињања је једнака, па је и запремина празног дела суда пре и после нагињања једнака. Пре нагињања та запремина је $4^2 \cdot h$. После нагињања запремина празног дела суда је облика тростране призме чија је висина 4 cm, а

основа правоугли троугао. Дужина његове катете је 4 cm, а угао између те катете и хипотенузе је 30° . Због тога је дужина друге катете $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ cm. Запремина празног дела суда после нагињања је $\frac{4^3\sqrt{3}}{6}$ cm³. Изједначавањем запремина празног дела суда пре и после нагињања добијамо да је $h = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ cm. ■



Сл. уз задатак 949

950. Обележимо дате бројеве са a_1, a_2, \dots, a_{50} . Претпоставимо супротно тврђењу задатка да је збир било која три броја мањи од 6. Тада је $(a_1 + a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6) + \dots + (a_{46} + a_{47} + a_{48}) < 16 \cdot 6$, па је $a_{49} + a_{50} > 4$. Слично се добија да је $a_{48} + a_{50} > 4$ и $a_{48} + a_{49} > 4$. Одатле следи да је $2(a_{48} + a_{49} + a_{50}) > 12$, односно $a_{48} + a_{49} + a_{50} > 6$. Ово је контрадикција са уведеном претпоставком, па следи да постоје три броја чији збир није мањи од 6.



Сл. уз задатак 951

951. Посматраћемо два случаја. Прво, пресек може бити једнакокракоправоугли троугао (слика лево). Очигледно да је површина пресека максимална када се катете полазних троуглова поклопе, тј. када је хипотенуза троугла који је пресек полазних троуглова дужине 1 cm. Та површина је $\frac{1}{4}$ cm². Друго, пресек може бити петоугао (слика десно). Ако са x обележимо дужину странице петоугла (у cm) која припада правој p , онда је $0 < x < 1$ и површина тог петоугла је једнака збиру површина правоугаоника са страницима x и $1 - x$ и једнакокракоправоуглог троугла са хипотенузом x . Дакле, површина


тог петоугла је

$$x \cdot (1-x) + \frac{1}{4}x^2 = -\frac{3}{4}x^2 + x = \frac{1}{3} - \frac{3}{4} \left(x - \frac{2}{3} \right)^2.$$


Максимум ове функције је $\frac{1}{3}$ и постиже се за $x = \frac{2}{3}$. Како је у првом случају максимална површина пресека $\frac{1}{4}$, а у другом $\frac{1}{3}$, следи да је максимална површина пресека који се може добити померањем полазних троуглова по правој p једнака $\frac{1}{3} \text{ cm}^2$.

952. Број $\overline{cba} \in \{5^3, 6^3, 7^3, 8^3, 9^3\} = \{125, 216, 343, 512, 729\}$, па је $\overline{abc} \in \{521, 612, 343, 215, 927\}$. Како су бројеви 612, 343, 215 и 927 сложени јер су дељиви, редом, са 2, 7, 5 и 9, једини кандидат је број 521. Он није дељив са 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 и 23 (проверити!), па је једино решење задатка $\overline{abc} = 521$, $\overline{cba} = 125 = 5^3$.


953. Нека је C_1E средња линија троугла ABM . Тада је $BE = ME$. Како је $KM \parallel C_1E$ и K средиште дужи CC_1 , следи да је KM средња линија троугла C_1EC , па је $CM = ME$. Према томе, $CM : MB = 1 : 2$.



Сл. уз задатак 953



Сл. уз задатак 955



Сл. уз задатак 956

954. Прва и трећа свећа су се изједначиле по дужини пошто је прва горела 2 сата, а трећа 1 сат. Прва свећа, дакле, гори два пута спорије од треће, па ће цела изгорети за 16 сати. Прва свећа ће за 4 сата изгорети четвртину своје дужине. За то време друга ће горети три сата и такође изгорети четвртину своје дужине. Тада ће се ове две свеће изједначити по дужини.

955. Нека су E и F тачке на страници AB такве да је $\angle ADE = 60^\circ$ и $\angle BDF = 40^\circ$ (слика). Из подударности троуглова ACD и AED следи да је (1) $DC = DE$. Троуглови DEF , FBD и ADF , су једнакокраки, па је (2) $DE = DF = FB$ и (3) $AD = AF$. Из (1) и (2) следи (4) $DC = FB$, па из (3) и (4) добијамо $AB = AF + FB = AD + DC$.

956. Јелена води игру ка сигурној победи користећи чињеницу да је паралелограм централно симетрична фигура, са центром симетрије у пресеку дијагонала. Она прво нацрта круг чији је центар у пресеку дијагонала паралелограма. Затим ма где Радован нацрта свој круг, Јелена нацрта круг који је Радовановом кругу симетричен у односу на пресечну тачку дијагонала. На слици су Јеленини кругови осенчени. На тај начин Јелена ће увек моћи да нацрта круг после Радована, а самим тим и побеђује у игри.

957. Прво решење. Ако су p, q, r непарни бројеви, онда је број $pqr + pq + qr + rp + p + q + r$ непаран, па не може бити једнак 2006. Дакле, бар један од бројева p, q и r је паран, дакле једнак 2. Нека је $r = 2$. Тада једначина постаје $3pq + 3p + 3q = 2004$, односно $pq + p + q = 668$. Опет је један од бројева p и q паран, јер би у супротном $pq + p + q$ био непаран. Следи, на пример, $q = 2$, па је $3p = 666$, односно $p = 222$, што није прост број. Дакле, такви бројеви не постоје.


Друго решење.

$$\begin{aligned} pqr + pq + qr + rp + p + q + r &= 2006 \\ \iff pqr + pq + qr + rp + p + q + r + 1 &= 2007 \\ \iff (p+1)(q+1)(r+1) &= 3 \cdot 3 \cdot 223. \end{aligned}$$


Не смањујући општост, претпоставимо да је $p \leq q \leq r$. Тада је $p+1 = 3$, $q+1 = 3$, $r+1 = 223$, па је $p = 2$, $q = 2$, $r = 222$. Дакле, r није прост, па такви бројеви не постоје.

958. Означимо дужину дужи FE са x (слика). Троугао MCE је правоугли једнакокрачи, па је и $CF = x$. Из $P_{\triangle MCE} = \frac{1}{2}P_{ABCD}$ следи $x^2 = \frac{1}{5}a^2$, односно $x = \frac{a\sqrt{5}}{5}$. Троуглови AHG и MCE су подударни, па је $AH = 2x = \frac{2a\sqrt{5}}{5}$ и $AG = CE = x\sqrt{2} = \frac{a\sqrt{10}}{5}$. Сада је $EF + FG + GH = CF + FG + GA = d = a\sqrt{2}$. Даље је $HB = a - 2x = a - \frac{2a\sqrt{5}}{5}$ и $BE = a - x\sqrt{2} = a - \frac{a\sqrt{10}}{5}$, па је

$$O = EF + FG + GH + HB + BE = a \left(2 + \sqrt{2} - \frac{2}{5}\sqrt{5} - \frac{1}{5}\sqrt{10} \right).$$



Сл. уз задатак 958



Сл. уз задатак 961

959.

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \cdot 6 \cdot 11} + \frac{1}{6 \cdot 11 \cdot 16} + \cdots + \frac{1}{1996 \cdot 2001 \cdot 2006} \\ = \frac{1}{10} \cdot \frac{11-1}{1 \cdot 6 \cdot 11} + \frac{1}{10} \cdot \frac{16-6}{6 \cdot 11 \cdot 16} + \cdots + \frac{1}{10} \cdot \frac{2006-1996}{1996 \cdot 2001 \cdot 2006} \\ = \frac{1}{10} \left(\frac{1}{1 \cdot 6} - \frac{1}{6 \cdot 11} + \frac{1}{6 \cdot 11} - \frac{1}{11 \cdot 16} + \cdots + \frac{1}{1996 \cdot 2001} - \frac{1}{2001 \cdot 2006} \right) \\ = \frac{1}{10} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2001 \cdot 2006} \right) = \frac{1003 \cdot 667 - 1}{10 \cdot 2001 \cdot 2006} = \frac{669000}{10 \cdot 2001 \cdot 2006} = \frac{11150}{667 \cdot 1003}. \end{aligned}$$

Сада је јасно да $q = 667 \cdot 1003$ није делив бројем 2006.

960. Претпоставимо да тврђење задатка није тачно. Тада постоји број n , такав да је после n бацања кошаркаш имао мање од 80%, а после $n+1$ бацања више од 80% погодака.

Ако је k број погодака у тих n бацања, онда је $\frac{k}{n} < \frac{4}{5} < \frac{k+1}{n+1}$. Из ових неједнакости следи да је $5k < 4n$ и $5k < 4n < 5k+1$. Ово је немогуће јер не постоји природан број између два суседна природна броја. Дакле, добили смо контрадикцију са уведеном претпоставком, па следи да је у неком тренутку кошаркаш имао успешност тачно 80%.

961. Дати правоугаоник поделимо на 8 делова као на слици (6 „кућица“ и две „полукућице“). Растојање било које две тачке унутар једног дела мање је од $\sqrt{5}$, тј. од


„дијагонале“ тог дела (може бити једнако $\sqrt{5}$ само у случају да је једна од тачака на рубу датог правоугаоника, што је искључено условом задатка). На основу Дирихлеовог принципа, постоји део у којем су бар две тачке. Те две тачке су међусобно удаљене мање од $\sqrt{5}$.

962. Сваки петоцифрени палиндром може се написати у облику


$$\overline{abcba} = 10001a + 1010b + 100c = 101(99a + 10b + c) + 2a - c.$$

Дакле, $2a - c$ мора бити дељив са 101, а како су a и c једноцифрени бројеви, мора бити $2a - c = 0$, тј. $c = 2a$. Највеће цифре за које то важи су $a = 4$, $c = 8$. За b узимамо највећу цифру, тј. $b = 9$. Тражени број је 49894.

963. Како је $\angle F A A_1 = \angle F E A_1$ (периферијски углови над истим луком) и $\angle A B A_1 = \angle F B E$, следи да је $\triangle A B A_1 \sim \triangle E B F$ (слика). Одатле је $B F = \frac{B A_1}{A B} B E$. Слично, из $\triangle A E C \sim \triangle A_1 G C$ следи да је $C G = \frac{A_1 C}{A C} C E$. Како је $A_1 C = A_1 B$ и $\frac{C E}{B E} = \frac{A C}{A B}$ ($A E$ је симетрала угла $A B C$), следи да је $B F = C G$.



Сл. уз задатак 963



Сл. уз задатак 966

964. Означимо дате бројеве са a , b и c . Према условима задатка је

$$(1) \quad abc = 1 \quad \text{и} \quad (2) \quad a + b + c > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

Из (2), користећи (1), добијамо да је $a + b + c > ab + bc + ca$, одакле је $a + b + c - ab - bc - ca + abc - 1 > 0$, тј. $(a-1)(b-1)(c-1) > 0$. Последња неједнакост важи само ако је тачно један чинилац на левој страни позитиван или су сва три позитивна. Други случај није могућ, јер је $a > 1$, $b > 1$, $c > 1$ супротно услову (1), па остаје први случај, тј. тачно један од бројева a , b , c је већи од 1.

965. Нека је укупан број екипа n ; тада је укупан број бодова које су освојиле екипе $n(n-1)$. Како је $n(n-1) \geq 7 + 5 + 3$, следи да је $n \geq 5$. Екипа које су се пласирале иза трећег места има $n-3$, и свака од њих је освојила мање од 5 бодова, па је $n(n-1) \leq 15 + 5(n-3)$, дакле, $n < 6$. Из свега овога следи да је $n = 5$. Укупан број бодова је 20, па су четврто и петопласирана екипа освојиле 3, односно 2 бода.

966. Нека је F тачка странице AB таква да је $\angle ACF = 60^\circ$ (слика). Троугао AFC је једнакостранничан (сви углови су му од 60°). Зато је симетрала AD нормална на FC . Нека је S тачка пресека AD и FC . Како је D на симетрални дужи FC , то је $DF = DC = DE$. Следи да је EC пречник полуокружнице која пролази кроз тачку F , па је $\angle EFC$ прав. Даље је $\angle FEA = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ - 15^\circ = 15^\circ$, па је троугао EFA једнакокрак. Следи да је $FA = FE$, па је и $FC = FE$. Дакле, $\triangle EFC$ је једнакокрако-правоугли троугао, па је $\angle DCF = 45^\circ$, одакле је $\angle BCA = 45^\circ + 60^\circ = 105^\circ$.

967. Број $n^2 + 2006n$ је свакако већи од n^2 , па ако је он једнак квадрату природног броја, мора бити облика $(n+k)^2$ за неко природно k . Из једнакости

$$(1) \quad n^2 + 2006n = (n+k)^2 = n^2 + 2nk + k^2$$

добијамо да је $k^2 = n(2006 - 2k)$, па мора бити $2006 - 2k \geq 0$, односно $k \leq 1003$. Највећа могућа вредност за k је, дакле, 1003, али она очигледно не задовољава услов (1). За $k = 1002$ се добија $n = 501 \cdot 1002$ који задовољава услове задатка и највећи је број са том особином.

968. Прво решење. Нека је $\triangle ABB'$ симетричан троуглу ABC у односу на праву AB , а $\triangle AC'C$ симетричан троуглу ABC у односу на праву AC (нацртати слику!). Тада је $\triangle AB'C'$ једнакостраничан (јер је једнакокрак, крака једнаког b , са углом при врху једнаким $3 \cdot 20^\circ = 60^\circ$). Означимо са D и E пресеке дужи $B'C'$ са крацима AB и AC датог троугла. Ако означимо $BD = x$ и $DE = y$, из сличности $\triangle B'BD \sim \triangle ABC$ добијамо $x : a = a : b$, одакле $x = \frac{a^2}{b}$. С друге стране, на основу Талесове теореме добијамо да је $y : a = (b-x) : b$, одакле $y = \frac{a}{b} \left(b - \frac{a^2}{b} \right) = \frac{a(b^2 - a^2)}{b^2}$. Најзад, из $b = B'C' = DE + 2 \cdot B'D = y + 2a$, заменом налазимо $b = \frac{a(b^2 - a^2)}{b^2} + 2a$, одакле сређивањем следи тражена релација $a^3 + b^3 = 3ab^2$.

Друго решење. На основу синусне теореме важи

$$\frac{a}{\sin 20^\circ} = \frac{b}{\sin 80^\circ} = \frac{b}{\cos 10^\circ},$$

односно $a \cos 10^\circ = b \sin 20^\circ = 2b \sin 10^\circ \cos 10^\circ$, па је $a = 2b \sin 10^\circ$, тј. $\sin 10^\circ = \frac{a}{2b}$. С друге стране је

$$\frac{1}{2} = \sin 30^\circ = \sin(3 \cdot 10^\circ) = 3 \sin 10^\circ - 4 \sin^3 10^\circ,$$

па замењујући претходно добијени израз за $\sin 10^\circ$ налазимо да је $\frac{1}{2} = 3 \cdot \frac{a}{2b} - 4 \cdot \frac{a^3}{8b^3}$, одакле лако следи тражена релација $a^3 + b^3 = 3ab^2$.

969. Означимо са a и b дужине страница „великог“ правоугаоника, а са a_1, a_2, \dots, a_7 , односно b_1, b_2, \dots, b_7 дужине страница малих правоугаоника који се налазе „на дијагонали“ великог. Тада је обим великог правоугаоника

$$2(a+b) = 2[(a_1 + \dots + a_7) + (b_1 + \dots + b_7)] = 2(a_1 + b_1) + \dots + 2(a_7 + b_7),$$

тј. једнак је збиру обима малих правоугаоника „на дијагонали“. Како су ти обими, по претпоставци, цели бројеви, то је и обим великог правоугаоника цео број.

970. Размотримо следеће случајеве: 1° n је производ два различита непарна делиоца, већа од 1. Оба та делиоца, као и двојка, садржани су међу чиниоцима $2, 3, \dots, n-1$ броја $(n-1)!$, те њихов производ $2n$ дели $(n-1)!$.


2° n је квадрат непарног броја $m > 1$. Тада се међу бројевима $2, 3, \dots, n-1$ налазе свакако бројеви m и $2m$, па и тада $2n \mid (n-1)!$.

3° n је облика $2^k m$, где је m непаран број и $k \geq 1$. Број m је свакако садржан међу бројевима $2, 3, \dots, n-1$. Остаје да се докаже да је производ тих бројева делив са 2^{k+1} . „Најгори“ је случај када је $m = 1, n = 2^k, k > 2$. Међу наведеним бројевима је $n/2 - 1 = 2^{k-1} - 1$ парних, што значи да им је производ делив са 2^{k+1} , јер је $2^{k-1} - 1 > k+1$, сем у случају $k = 3$; но, и тада $2^4 \mid 7!$ (проверити!).

971. Покажимо најпре да тачка D припада дужи AE . У супротном би тачка E припадала дужи AD , па би следило $\angle ACB + \angle CBD = \angle BDE = \angle EDB < \angle ABC$, што није тачно. Дакле, важи $A-D-E$ (слика). Зато је

$$\begin{aligned}\angle DBC &= \angle DBE + \angle EBC = \angle EDB + \angle EBC \\ &= \angle BAC + \angle ABD + \angle EBC = \angle BAC + 2\angle EBC \\ &= 180^\circ - 2\angle ABC + 2\angle EBC = 180^\circ - 2(\angle DBC + \angle ABD) + 2\angle EBC \\ &= 180^\circ - 2(\angle DBE + \angle EBC) + 2\angle EBC = 180^\circ - 2\angle DBC,\end{aligned}$$

дакле, $\angle DBC = 60^\circ$. Тачка O је центар круга уписаног у троугао DBC , па је



$$\begin{aligned}\angle COD &= 180^\circ - (\angle OCD + \angle ODC) \\ &= 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle BDC + \angle DCB) \\ &= 180^\circ - \frac{1}{2}(180^\circ - \angle DBC) \\ &= 90^\circ + \frac{1}{2}\angle DBC = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ.\end{aligned}$$

Сл. уз задатак 971

972. *Прво решење.* Најмањи савршени број је 6 и он задовољава услове задатка. Претпоставимо да је $n > 6$ и да су $n-1$ и $n+1$ прости бројеви. Тада мора да важи $n = 6k$ за неки природан број $k > 1$. То значи да су $1, k, 2k, 3k$ и $6k$ различити делиоци броја n , па је збир свих његових делилаца већи или једнак од

$$1 + k + 2k + 3k + 6k = 12k + 1 = 2n + 1 > 2n$$

и број n није савршен. Дакле, $n = 6$ је једини број који задовољава услове задатка.

Друго решење. Према Еуклид-Ојлеровој теореми сваки паран савршени број n може се приказати у облику

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1),$$

где су p и $2^p - 1$ прости бројеви. Ако је $p = 2$, добија се први савршени број 6 који, очигледно, задовољава услове задатка. Ако је p непаран, онда је $2^p \equiv 2 \pmod{3}$ и $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{3}$, па је $n-1 \equiv 0 \pmod{3}$, и број $n-1$ не може да буде прост. Дакле, број 6 је једино решење задатка.

973. За $n = 2$ фигура се може покрити на начин приказан на слици 1, и у том случају тражени највећи број је 6.



Сл. уз задатак 973

За $n > 2$ исечимо фигуру на четири подударна дела дуж линија између n -те и $(n+1)$ -е врсте и између n -те и $(n+1)$ -е колоне. Обојимо те делове на шаховски начин, као што је приказано на слици 2 за $n = 5$ и на слици 3 за $n = 4$. Свака домина покрива једно бело и

једно црно поље. Тада највећи број домина које се могу сместити на једном делу фигуре није већи од броја белих поља (број белих поља је мањи од броја црних). На сваком од четири дела (без крајњег горњег и крајњег десног) домине се могу поставити на следећи начин тако да покривају сва бела поља: поставити вертикално домине на две најниže врсте, полазећи од леве ивице фигуре, све док је то могуће, и хоризонталне домине на остале врсте, полазећи од леве ивице, све док је то могуће.

Ако је n непарно, $n = 2k - 1$, на сваком делу има

$$2((k-1) + (k-2) + \cdots + 2 + 1) = k(k-1)$$

белих поља, па је то и највећи број домина које се могу поставити на тај део. При томе, према начину постављања који смо описали, гранична поља (којима се делови покривају) остала су непокривена. Зато је највећи број домина које се могу поставити на фигуру једнак $4k(k-1) + 4$ (четири домине су на граничним пољима којима се додирују делови). Дакле, у овом случају, тражени највећи број домина је

$$4k(k-1) + 4 = 4k^2 - 4k + 4 = (2k-1)^2 + 3 = n^2 + 3.$$

За $n = 2k$ имамо $(2k-1) + (2k-3) + \cdots + 3 + 1 = k^2$ белих поља. Слично као у претходном случају добијамо да је сада тражени највећи број домина једнак

$$4k^2 + 4 = (2k)^2 + 4 = n^2 + 4.$$

2007. година

974. а) 693; б) 541; в) 200.

975. $8 \cdot 7 + 8 : 2 = 56 + 4 = 60$.

976. Постоје три решења: III + V + VI = XIV, II + VI + VI = XIV, II + V + VII = XIV.

977. а) $555 + 222 = 522 + 255 = 552 + 225 + 525 + 252 = 777$.

б) $555 - 222 = 255 - 222 = 33$.

978. Софија је замислила број 522, јер је $600 - 148 + 70 = 452 + 70 = 522$.

979. Резултат је 2 450 444.

980. За 8 година.

981. Како је $2007 : 3 = 669$, а $2007 : 9 = 223$, следи да су странице сваког од тих правоугаоника дужине 669 см и 223 см. Према томе, обим једног од њих је 1784 см.

982. Нека је x број ученика које треба преместити из прве у другу школу. Након премештања тих ученика у другој школи би било $946 + x$ ученика, што значи да их је пре премештања у првој школи било $946 + 2x$. Следи да је $2x = 512$, тј. $x = 256$.

983. Број a је тим већи што су остала два сабирка мања. Због тога, највећа вредност броја a је 7999 када су остала два броја 1000 и 1001.

984. Како је $4536 = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 7$, а $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 7 \cdot 80$, то је тражени количник 80.

985. Нека је мера мањег угла α . Како је $2007' = 33^\circ 27'$, следи да је мера већег угла $\alpha + 33^\circ 27'$. Користећи услов комплементности добијамо да је $2\alpha + 33^\circ 27' = 90^\circ$, па је $2\alpha = 56^\circ 33'$. Следи да је мера мањег угла $28^\circ 16' 30''$, а мера већег угла $61^\circ 43' 30''$.

986. Да би број био дељив са 15 он мора бити дељив и са 3 и са 5. Како је број дељив са 5 ако му је цифра јединица 0 или 5, а дељив са 3 ако му је збир цифара дељив са 3, тражени бројеви су: 3150, 6150, 9150, 1155, 4155 и 7155.

987. Нека је распоред тачака A , B , C и D као на слици. Средишта дужи AC и DB означимо са M и N , а дужине дужи MC , CD и DN обележимо редом са a , x и b . Тада су и дужине дужи AM и NB редом a и b . Према условима задатка следи да је $2a + x + 2b = 60$ см, а $a + x + b = 45$ см. Одатле је $a + b = 15$ см, а $x = 30$ см.

Сл. уз зад. 987

988. Унија скупова A и B садржи 17 елемената, а пресек 5 елемената, тако да ће сваки од скупова $A \setminus B$ и $B \setminus A$ садржати по 6 елемената и то $A \setminus B = \{10, 11, 12, 14, 15, 16\}$, а $B \setminus A = \{3, 4, 5, 6, 8, 9\}$. Према томе, $A = \{1, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17\}$, а $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17\}$.

989. Вредност израза је -9 .

990. Прва неједначина је еквивалентна са неједначином $x \geq -6$, а друга са $x < -3$. Према томе, заједничка целобројна решења датих неједначина су $-6, -5$ и -4 , а збир тих решења је -15 .

991. Углови AMP и MBN , односно MAP и BMN су једнаки као углови са паралелним крацима. Такође је $AM = MB$ јер је M средиште дужи AB . На основу другог става подударности (УСУ) следи да су троуглови AMP и MBN подударни.

992. Како је $a = (1 - 2) + (3 - 4) + (5 - 6) + \dots + (2005 - 2006) = (-1) \cdot 1003 = -1003$, а $b = (1 - 3) + (5 - 7) + (9 - 11) + \dots + (2005 - 2007) = (-2) \cdot 502 = -1004$, то је $a > b$.

993. Нека је $\angle ABC = \alpha$. Тада важи да је и $\angle BAC = \alpha$ и $\angle BDE = \alpha$ јер су троуглови ABC и BDE једнакокраки. Како је збир унутрашњих углова у четвороуглу $ABDF$ једнак 360° , то је $3\alpha + 144^\circ = 360^\circ$, односно $\alpha = 72^\circ$. Следи да су и у троуглу ABC и у троуглу BDE мере углова 72° , 72° и 36° .

994. Дата једначина еквивалентна је једначини $3^8 + 3^8 - 5 \cdot 3^8 = x \cdot 3^8$. Следи да је $x = -3$.


995. Како је $-5\sqrt{2} = -\sqrt{50}$, $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$, $-3\sqrt{5} = -\sqrt{45}$ и $2\sqrt{6} = \sqrt{24}$, то је распоред датих бројева од већег ка мањем следећи: $4\sqrt{3}, 2\sqrt{6}, -3\sqrt{5}, -5\sqrt{2}$.

996. У троуглу ABC важи да је $AB^2 + BC^2 = AC^2$, па је $\alpha = 90^\circ$. У троуглу ACD дужина катете AD једнака је половини дужине хипотенузе. Следи да је наспрам те катете угао од 30° , тј. $\beta = 30^\circ$. Према томе, $\alpha + \beta = 120^\circ$.

997. Како је $45^{10} = 3^{10} \cdot 15^{10} = 9^5 \cdot 15^{10}$ и $15^{15} = 15^5 \cdot 15^{10}$, то је 15^{15} већи број од броја 45^{10} .

998. Нека је O пресек дијагонала датог трапеза, CE висина, а F тачка у којој права кроз C паралелна дијагонали BD сече праву којој припадају тачке A и B . Четвороугао $BFCD$ је паралелограм, па је $BF = DC$ и $FC = BD$. Код једнакокраког трапеза дужине дијагонала су једнаке, па је троугао ACF једнакокраки. Како су ACF и AOB углови са паралелним крацима, они су једнаки, па је троугао ACF и правоугли. Следи да је $AF = 2 \cdot CE = 10$ см. Како је $AB + CD = AB + BF = AF$, то је $AB + CD = 10$ см.

Површина трапеза $ABCD$ једнака је $\frac{AB + CD}{2} \cdot CE$, тј. 25 cm^2 .



Сл. уз зад. 998

999. Нека је дужина правоугаоника a , а ширина b . Тада је дужина новог правоугаоника $(1 + \frac{p}{100})a$, а ширина $(1 - \frac{p}{100})b$. Како је површина новог правоугаоника мања за 16% у односу на површину првобитног правоугаоника, добијамо да је $(1 + \frac{p}{100})a \cdot (1 - \frac{p}{100})b = 0,84 \cdot ab$. Одатле следи да је $1 - (\frac{p}{100})^2 = 0,84$, тј. $p = 40$.

1000. Дата неједначина еквивалентна је неједначини $x \cdot (\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} - 1) \geq -\frac{2}{3}$, тј. неједначини $x \cdot (-\frac{2}{3}) \geq -\frac{2}{3}$. Следи да је $x \leq 1$, па $x \in (-\infty, 1]$.

1001. Обележимо са F тачку пресека дужи AE и BC . Површине троуглова AFC , ABF , ADB , FBE и BDE су једнаке јер ови троуглови имају једнаку по једну страницу и одговарају висину. Следи да је површина троугла ADE два пута већа од површине троугла ABC и износи 64 cm^2 .

1002. Јасно је да је $x \neq 0$ јер именилац разломка не може бити 0. Ако је $x < 0$, дата једначина еквивалентна је једначини $x - x = \frac{x}{-x}$, тј. $0 = -1$, па у овом случају нема

решења. Ако је $x > 0$, дата једначина еквивалентна је једначини $x + x = \frac{x}{x}$, односно $x = \frac{1}{2}$, па је то и решење полазне једначине.

1003. Дате праве одређују једну раван. Уколико дате тачке не припадају истој правој, оне такође одређују једну раван. Свака права са сваком тачком одређује по једну раван, што значи још највише 6 равни. Укупно то је највише 8 равни.

1004. а) $438 + 163 = 601$; б) $908 - 159 = 749$; в) $60 : 5 + 5 \cdot 3 = 27$; г) $85 + 15 : 5 = 88$.


1005. В. слику. г) Дуж OC је полу пречник круга.

1006. Симонидина мајка ће за три године имати 30 година, а Симонида 10. Симонида сада има $10 - 3 = 7$ година.

1007. а) Пренос утакмице је трајао 1 час и 45 минута.

б) Како је емисија о рибама трајала 55 минута, то је пренос трајао дуже 50 минута.

1008. Највећи троцифрени број чији је збир цифара 12 је 930, а најмањи троцифрени број чији је збир цифара 21 је 399. Разлика ових бројева је $930 - 399 = 531$.




Сл. уз зад. 1005


1009. а) Највећи могући такав број је 6644322. б) Најмањи могући такав број је 6364422.

1010. Може. То се дешава када једна свешчица има 40 страница, а осталих пет свешчица по 44 странице.

1011. Ако дужину странице квадрата обележимо са a , онда је обим квадрата $4a$, а обим правоугаоника је $8a$. Према томе, обим правоугаоника је два пута већи од обима једног од квадрата.



Сл. уз зад. 1011



Сл. уз зад. 1017

1012. Јиља и Биља заједно имају 62 динара више од Маше и Таше заједно. Како Јиља има 70 динара више од Маше, то Таша има 8 динара више од Биље.

1013. Има их једнако, по десет. То су: 112, 121, 211, 220, 202, 130, 103, 310, 301 и 400, односно 1114, 1141, 1411, 4111, 1122, 1212, 1221, 2112, 2121 и 2211.

1014. То су: 147, 174, 417, 471, 714 и 741.

1015. Како је $(3x^\circ + 1^\circ) + (x^\circ + 7^\circ) = 180^\circ$, то је $4x^\circ = 172^\circ$, односно $x = 43$. Следи да су на слици углови од 130° и 50° .

1016. Како енглески језик учи $\frac{4}{5}$ свих ученика, то остатак, односно $\frac{1}{5}$ свих ученика учи само француски. Број ученика који уче оба језика добијамо када од броја свих који уче француски одузмемо број оних који уче само тај језик. Како је $\frac{3}{4} - \frac{1}{5} = \frac{11}{20}$, следи да $\frac{11}{20}$ свих ученика учи оба језика.

1017. Обележимо сва темена свих квадрата, као на слици. Обим квадрата $EFGH$ је 8 см, па је дужина његове странице 2 см. Квадрати $LIJE$ и $IKFJ$ имају странице једнаке дужине, по 1 см. Даље, дужина странице квадрата $KNCG$ је 3 см, дужина странице квадрата $MBNL$ је 5 см, а дужина странице квадрата $AMHD$ је 8 см. Према томе, дужине страница правоугаоника $ABCD$ су 13 см и 8 см, па је његова површина 104 cm^2 .

1018. Из једнакости $\frac{2}{9} = \frac{2 \cdot 223}{9 \cdot 223} = \frac{446}{2007}$ следи да је $\frac{2}{9} < \frac{447}{2007}$. Како је $\frac{447}{2007} = \frac{149}{669}$ и $\frac{149}{669} < \frac{150}{666} < \frac{150}{666} = \frac{25}{111}$, то је $\frac{2}{9} < \frac{447}{2007} < \frac{25}{111}$. Решење је: $\frac{2}{9}, \frac{447}{2007}, \frac{25}{111}$.

1019. Дата неједначина је еквивалентна са $-6 < x - 1 < 6$, односно са $-5 < x < 7$. Према томе, целобројна решења неједначине су $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$ и 6 , а њихов збир је 11.

1020. Из чињенице да се симетрале углова BAC и ABC секу под углом од 124° следи да је $\frac{1}{2} \cdot \angle BAC + \frac{1}{2} \cdot \angle ABC + 124^\circ = 180^\circ$. Одатле добијамо да је $\angle BAC + \angle ABC = 112^\circ$, па је $\angle ACB = 68^\circ$.

1021. Нека је на почетку у кеси било x кликера. Аца је додао $x + 1$ кликер, што значи да је након тога у кеси било $2x + 1$ кликера. Затим је Веса додао $2(2x + 1) + 3$ кликера, тј. $4x + 5$ кликера, што значи да је након тога у кеси било $6x + 6$ кликера. Последњи је пришао Веса и додао $3(6x + 6) + 5$ кликера, односно $18x + 23$ кликера. Према томе, на крају је у кеси било $24x + 29$ кликера. Како је $24x + 29 = 149$, то је $x = 5$.


1022. Троугао CBE је једнакокрако правоугли, па је $BC = EB$. Нека је $\angle ABC = \alpha$. Тада је $\angle BCA = 90^\circ - \alpha$. Како је $\angle ABC + 90^\circ + \angle EBD = 180^\circ$, то је $\angle EBD = 90^\circ - \angle ABC$, тј. $\angle EBD = 90^\circ - \alpha$. Одатле добијамо да је $\angle DEB = \alpha$. На основу свега овога следи да је $\angle ABC = \angle DEB$ и $\angle BCA = \angle EBD$. На основу другог става подударности (УСУ) следи да је $\triangle ABC \cong \triangle DEB$.

1023. Распоредимо ученике у 366 група, при чему истој групи припадају они ученици који славе рођендан истог датума. Како је $800 = 366 \cdot 2 + 68$, бар једна група садржи бар 3 ученика. Они имају рођендан истог датума.


$$\text{1024. } \sqrt{(\sqrt{5} - 5)^2} - (\sqrt{5} - 5) = |\sqrt{5} - 5| - (\sqrt{5} - 5) = 5 - \sqrt{5} - \sqrt{5} + 5 = 10 - 2\sqrt{5}.$$

1025. Примењујући Питагорину теорему на правоугли троугао ABC добијамо да је $AB^2 = AC^2 + BC^2$, па је дужина хипотенузе AB једнака 50 см. Дужина тежишне дужи која одговара хипотенузи једнака је половини дужине хипотенузе, па је дужина дужи CC_1 једнака 25 см. Површина правоуглог троугла једнака је половини производа дужина катета, односно половини производа дужина хипотенузе и одговарајуће висине. Одавде добијамо да је дужина дужи CC_2 једнака $\frac{30 \cdot 40}{50}$ см, тј. 24 см. Коначно, примењујући Питагорину теорему на правоугли троугао C_1CC_2 добијамо да је $C_1C_2^2 = C_1C^2 - CC_2^2$, па је дужина дужи C_1C_2 једнака 7 см.

1026. Нека је тачка S пресек дужи AB и CN . Како је $\angle BCS = 45^\circ$, а троуглови BCS и ANS су правоугли, то је $\angle CSB = 45^\circ$ и $\angle ASN = \angle ANS = 45^\circ$. Следи да су троуглови BCS и ANS и једнакокраки, па је $BS = BC = 3$ см, а $AN = AS = 2$ см. Како је и $\angle BAM = 45^\circ$, он је једнак са $\angle BSC$, па је $NC \parallel AM$. Такође је $NA \parallel CM$, па је



Сл. уз зад. 1025



Сл. уз зад. 1026


четвороугао $ANCM$ паралелограм. Његова површина је производ дужина странице AN и одговарајуће висине AB , те је према томе једнака 10 cm^2 .

1027. Број је дељив са 15 ако је дељив и са 5 и са 3. Да би био дељив са 5, тражени број се мора завршавати нулом, а да би био дељив са 3, збир цифара му мора бити дељив са 3. Због тога се у декадном запису тог броја мора појавити тачно k четворки, где је k број дељив са 3. Како тражимо најмањи природан број са задатом особином, то је $k = 3$. Тражени број је 4440.


1028. Најмањи природан број који се може добити је 1, на пример на следећи начин: $(1 - 2 - 3 + 4) + (5 - 6 - 7 + 8) + \dots + (2001 - 2002 - 2003 + 2004) - 2005 + 2006$.

1029. Решење дате једначине је $x = \frac{8 - 14k}{3}$. То решење је веће од -2 ако је $\frac{8 - 14k}{3} > -2$, тј. ако је $k < 1$. Према томе, $k \in (-\infty, 1)$.

1030. Нека су тачка O и R центар и дужина полупречника круга k , а тачка O_1 и r центар и дужина полупречника једног од три подударна уписане круга. Нека је, даље, S додирна тачка та два круга, а F и E тачке у којима их страница AB додирује. Како су троуглови AFO и AEO_1 правоугли, а $\angle FAO = 30^\circ$, то је $AO = 2R$ и $AO_1 = 2r$. Следи да је $AS = AO - OS = R$, а такође и $AS = AO_1 + O_1S = 3r$. Према томе, $R = 3r$. Површина круга k је $R^2\pi$, односно $9r^2\pi$, а збир површина три уписане круга је $3r^2\pi$. Тражени однос је $3 : 1$.



Сл. уз зад. 1030



Сл. уз зад. 1032

1031. Дата неједначина еквивалентна је са $2 - a < x < 2 + a$. Ако је $a \leq 1$, број 2 је једино решење неједначине. Ако је $1 < a \leq 2$, решења неједначине су 1, 2 и 3. Ако је $a > 2$, неједначина има пет или више решења. Следи да не постоји позитиван реалан број a за који дата неједначина има тачно 4 решења у склопу целих бројева. Према томе, тражени склоп вредности је празан.

1032. Нека дата раван дели ивице коцке које сече на делове дужине x и $10 - x$ (у см). Тада су површине квадара (у cm^2) на које је подељена коцка $2 \cdot 100 + 4 \cdot 10x$ и $2 \cdot 100 + 4 \cdot 10 \cdot (10 - x)$, односно $200 + 40x$ и $600 - 40x$. Однос тих површина је $2 : 3$, па из једначине $3 \cdot (200 + 40x) = 2 \cdot (600 - 40x)$ добијамо да је $x = 3$. Запремине датих квадара су $3 \cdot 10 \cdot 10 \text{ cm}^3$ и $7 \cdot 10 \cdot 10 \text{ cm}^3$. Следи да је однос тих запремина $3 : 7$.

1033. Могуће је да два темена троугла припадају истој страници квадрата или да свако теме троугла припада различитој страници квадрата. У првом случају, на 4 начина бирамо страницу квадрата којој припадају два темена троугла, на 3 начина бирамо две од три тачке са изабране странице и на 9 начина бирамо треће теме троугла од тачака које припадају осталим страницима квадрата. Следи да је, у овом случају, датим тачкама одређено $4 \cdot 3 \cdot 9$ троуглова, тј. 108 троуглова. У другом случају, на 4 начина бирамо три од четири странице квадрата којима припада по једно теме троугла, а на $3 \cdot 3 \cdot 3$ начина са сваке од изабраних страница квадрата по једну од три дате тачке. Следи да је, у овом случају, датим тачкама одређено $4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ троуглова, тј. 108 троуглова. Према томе, укупно је датим тачкама одређено 216 троуглова.

1034. Има их 15. То су: $ABG, BGC, CGF, AGF, AFE, EFD, CFD, CDE, ADE, ACF, ABC, ABF, BCF, ACE$ и ACD .

1035. Могуће је да Воја, Раде и Зоран добију редом кликера: 1, 1, 5 или 1, 2, 4 или 1, 3, 3 или 1, 4, 2 или 1, 5, 1 или 2, 1, 4 или 2, 2, 3 или 2, 3, 2 или 2, 4, 1 или 3, 1, 3 или 3, 2, 2 или 3, 3, 1 или 4, 1, 2 или 4, 2, 1 или 5, 1, 1. То је укупно 15 начина.

1036. Нека је ширина стазе x , а дужина тражене странице y (све у м). Пешак који обиђе целу стазу идући спољном ивицом те стазе уствари пређе за $8x$ м дужи пут него пешак који обиђе целу стазу идући унутрашњом ивицом те стазе. Следи да је $x = 2$. Одатле добијамо да је површина стазе (у m^2) $4 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 16 + 2 \cdot 2 \cdot y$. Према томе, $80 + 4 \cdot y = 176$, па је $y = 24$.

1037. Да је и број фазана и број јаребица порастао 3 пута, било би их укупно $3 \cdot 565$, односно 1695. Како је број јаребица порастао 5 пута, а не 3 пута, то разлика $2007 - 1695$ представља 2 пута увећан почетни број јаребица. Према томе, на почетку је у шуми било 156 јаребица и 409 фазана.

1038. Како је Б различито од Ј и разлика између Б и Ј не може бити већа од 1, то је Б = 6. Због преношења 1 при сабирању са цифре јединица хиљада на цифру десетица хиљада, добијамо да је О = 9 и А = 0. Како нема преношења при сабирању са цифре десетица на цифру стотина, то је $2B = 10 + J$, па је В = 7 или В = 8. Не може бити В = 8 јер би било $J = 6$, а та цифра је већ искоришћена. Према томе, В = 7, J = 4. Како је К + Џ = 10 и У + 1 = К, то користећи преостале цифре добијамо да је К = 2, Џ = 8 и У = 1. Након замене дата једнакост гласи: $712 + 59708 = 60420$.

1039. Како је $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$, а $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$, то је $\frac{5}{10} < \frac{a}{10} < \frac{15}{20}$, па је $a = 6$ или $a = 7$. Заменом ових вредности у једнакост $\frac{a}{10} + \frac{b}{15} = \frac{5}{6}$ добијамо да је једино решење задатка: $a = 7$, $b = 2$.


1040. Како је $10 \text{ m} = 100 \text{ dm}$, то је укупно исечено 1 000 000 коцкица. Да би се поплочала стаза ширине 1 м потребно је поређати једну поред друге 10 коцкица. То значи да је по дужини поређано једна поред друге 100 000 коцкица. Та стаза је дугачка 100 000 dm, односно 10 km. Пешак би ту стазу прешао за 2 сата.

1041. Бројеви $2p$, $4r$ и 2006 су парни, па је паран и број $3q$. Онда је и q паран број. Једини паран прост број је 2, па је $q = 2$. Следи да је $2p + 4r = 2000$, односно $p + 2r = 1000$. Како су $2r$ и 1000 парни бројеви, то је и p паран број, па је $p = 2$. Следи да


је $r = 499$. Након провере да је 499 прост број закључујемо да је јединствено решење задатка: $p = 2$, $q = 2$, $r = 499$.

1042. Остаци при дељењу бројева 287 и 431 природним бројем n су редом 1 и 2, па следи да n дели бројеве 286 и 429. Како је $286 = 2 \cdot 11 \cdot 13$, а $429 = 3 \cdot 11 \cdot 13$, то је могуће да је $n = 11$ или $n = 13$ или $n = 143$. Провером утврђујемо да се при дељењу броја 231 бројем $n + 1$ добија остатак 3 једино за $n = 11$.

1043. Једно решење је дато на слици.



Сл. уз зад. 1043



Сл. уз зад. 1045


1044. Из друге једнакости добијамо да је $\frac{a}{b} = \frac{1}{9}$. Користећи прву једнакост добијамо да је $a = 3$, $b = 27$.

1045. Углови OBM и ODN су углови са паралелним крацима, па су једнаки. Тачка O је средиште дијагонале BD , па је $OB = OD$. Како је још $\angle BOM = \angle DON = 90^\circ$, то је по другом ставу подударности троуглава (УСУ) $\triangle MBO \cong \triangle NDO$. Следи да је $MB = ND$. Ове дужи су и паралелне, па следи да је четвороугао $MBND$ паралелограм. Његове дијагонале су међусобно нормалне, па је он ромб.


1046. Прости бројеви већи од 3 су непарни, па су a и b непарни бројеви. Њихов збир $a + b$ и њихова разлика $a - b$ су парни бројеви, па је производ $(a + b) \cdot (a - b)$ дељив са 4. При дељењу са 3 бројеви a и b могу имати остатак 1 или 2. Ако имају исти остатак, онда је разлика $a - b$ дељива са 3, а ако имају различит остатак, онда је збир $a + b$ дељив са 3. У сваком случају производ $(a + b) \cdot (a - b)$ је дељив са 3. Како је дељив и са 3 и са 4, дељив је са 12.

1047. Нека је F тачка пресека симетрала углова ADE и BED . Како је DE средња линија троугла ABC , то је она паралелна са страницом AB . Одатле следи да је $\angle FDE = \angle AFD$, па је $\angle AFD = \angle ADF$. Троугао AFD је једнакокрак, па је $AF = AD$. Тачка D је средиште странице AC , па је $AF = \frac{AC}{2}$. Аналогно добијамо да је $BF = \frac{BC}{2}$.

Следи да је $AB = \frac{AC + BC}{2}$.



Сл. уз зад. 1047



Сл. уз зад. 1050

1048. Нека је a дужина основице, а b дужина крака (све у см) троугла који испуњава услове задатка. Како је $a + 2b$ непаран број, то је a непаран број. Збир дужина две странице у троуглу је већи од дужине треће странице, па мора бити $a < 2b$. Како је $a + 2b = 2005$, то је $a < 1003$, па a може бити било који елемент скупа $\{1, 3, \dots, 1001\}$. Према томе, број троуглова који испуњавају услове задатка је 501.

1049. Из $\sqrt{17} > 4$ и $\sqrt{37} > 6$ следи $\sqrt{\sqrt{17} + \sqrt{37}} > \sqrt{10}$. Како је $\sqrt{10} > 3$ и $\sqrt{2} > 1$, то је $\sqrt{5 + \sqrt{\sqrt{17} + \sqrt{37}}} > \sqrt{5 + 3 + 1}$, па следи тражена неједнакост.

1050. Обележимо темена дванаестоугла словима A_1, A_2, \dots, A_{12} , а темена квадрата словима A, B, C и D (као на слици). Нека је дужина странице дванаестоугла једнака x (у см). Обележимо са M подножје нормале из A_6 на страницу квадрата CD . У правоуглом троуглу A_6MA_7 угао A_6A_7M једнак је 30° као спољашњи угао правилног дванаестоугла. Због тога је $A_6M = \frac{x}{2}$, а $A_7M = \frac{\sqrt{3}}{2}x$. Троугао A_6CM је једнакокрако правоугли, па је $MC = \frac{x}{2}$. Како је $A_8D = A_7C$, то је $CD = x + 2 \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{x}{2})$. Следи да је $x \cdot (2 + \sqrt{3}) = 10$, па је $x = 10 \cdot (2 - \sqrt{3})$.

1051. Пођимо од очигледне неједнакости $3^2 > 2^3$. Степеновањем добијамо да је $3^{2000} > 2^{3000}$. Следи да је $3^{2007} > 3^7 \cdot 2^{3000}$, па је $3^{2007} - 2^{3000} > (3^7 - 1) \cdot 2^{3000}$. Како је $3^7 - 1 > 2007$, то је $(3^7 - 1) \cdot 2^{3000} > 2007 \cdot 2^{3007}$. Према томе, $3^{2007} - 2^{3000} > 2007 \cdot 2^{3007}$.


1052. Претпоставимо да постоји такав троугао. Ако са P означимо његову површину (у cm^2), онда користећи формулу за површину троугла добијамо да су дужине страница (у см) тог троугла $\frac{2P}{1}, \frac{2P}{2}$ и $\frac{2P}{3}$. Како је $\frac{2P}{1} > \frac{2P}{2} + \frac{2P}{3}$, то је дужина једне странице тог троугла већа од збира дужина друге две странице. То је немогуће, па следи да такав троугао не постоји.

1053. Такви четвороцифрени бројеви могу да буду записани са две цифре које се појављују по два пута или са три цифре од којих се једна појављује два пута, а остале две по једном. У првом случају, на три начина бирамо које две цифре се појављују по два пута у запису броја. Нека су то на пример неке цифре a и b . Бројеви записани помоћу њих су: $aabb, abab, abba, baba, baab$ и $bbaa$. Према томе, у том случају има $3 \cdot 6$, односно 18 бројева. У другом случају, на четири начина бирамо цифру која се у запису броја појављује два пута, на три начина бирамо место на коме је једна од цифара које се у том запису појављују једном, а на три начина бирамо место на коме је друга од цифара које се у том запису појављују једном. У том случају има $3 \cdot 4 \cdot 3$, односно 36 бројева. Укупно има 54 броја са датом особином.


1054. Како је $2007^{2005} - 2007 = 2007 \cdot (2007^{2004} - 1) = 9 \cdot 223 \cdot (2007^{2004} - 1)$, то је дати број дељив са 9. Број 2007^4 се завршава цифром 1, па следи да се и број 2007^{2004} завршава цифром 1. Због тога је $2007^{2004} - 1$ дељив са 10, па је и $2007^{2005} - 2007$ дељив са 10. Како је дати број дељив и са 9 и са 10, он је дељив са 90.

1055. Обележимо темена основе пирамиде са A, B и C , а врх са D . Нека је тачка E подножје висине из темена B бочне стране ABD . У правоуглом троуглу EBD угао EDB једнак је 30° , па је дужина катете BE једнака половини дужине хипотенузе BD и износи 4 см. Површина бочне стране пирамиде је 16 cm^2 . Примењујући Питагорину теорему на троугао EBD добијамо да је дужина дужи ED једнака $4\sqrt{3}$ см. Онда је дужина дужи AE једнака $8 - 4\sqrt{3}$ см. Примењујући Питагорину теорему на троугао ABE добијамо да је дужина основне ивице AB дате пирамиде једнака $8\sqrt{2} - \sqrt{3}$ см. Основа пирамиде

је једнакостранични троугао, па је површина те основе једнака $\frac{(8\sqrt{2 - \sqrt{3}})^2 \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$, тј. $32\sqrt{3} - 48 \text{ cm}^2$. Површина пирамиде је $32\sqrt{3} - 48 \text{ cm}^2 + 3 \cdot 16 \text{ cm}^2$, односно $32\sqrt{3} \text{ cm}^2$.



Сл. уз зад. 1055



Сл. уз зад. 1057

1056. Како је $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + 2004 \cdot 2006 = (2-1) \cdot (2+1) + (3-1) \cdot (3+1) + (4-1) \cdot (4+1) + \dots + (2005-1) \cdot (2005+1) = 2^2 - 1 + 3^2 - 1 + 4^2 - 1 + \dots + 2005^2 - 1 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 2005^2 - 2005$, то је тражена разлика једнака 2005.

1057. Нека је тачка F подножје нормале из тачке E на дуж AB . Троуглови AFE и ABD су правоугли и имају заједнички угао FAE , па су слични. Следи да је $FE : BD = AF : AB$. Троуглови FBE и ABC су правоугли и имају заједнички угао FBE , па су и они слични. Следи да је $FE : AC = FB : AB$. Из ових једнакости добијамо да је $\frac{FE}{BD} + \frac{FE}{AC} = \frac{AF+FB}{AB}$, односно $FE \cdot \left(\frac{1}{BD} + \frac{1}{AC} \right) = 1$. Према томе, дужина дужи FE , а самим тим и тражено растојање је 2 cm.


1058. Цифру десетица хиљада петоцифреног броја са датим својством можемо изабрати на 5 начина, цифру јединица хиљада на 4 начина, цифру стотина на 3 начина, цифру десетица на 2 начина и цифру јединица на 1 начин, одакле следи да таквих петоцифрених бројева има 120. Како су код сваког од њих све цифре различите, то се у запису свих 120 бројева свака од цифара 1, 2, 3, 4 и 5 појављује по 120 пута, и то по 24 пута на сваком месту у запису петоцифреног броја. Следи да је збир свих петоцифрених бројева са датим својством једнак $(1+2+3+4+5) \cdot 24 \cdot (10000+1000+100+10+1)$, тј. 3999960.

1059. Број који је дељив и са 5 и са 7 и са 11, дељив је са 385. Како при дељењу броја 7002000 бројем 385 добијамо количник 18187 и остатак 5, то ће тражени седмоцифрени бројеви бити $385 \cdot 18188$ и $385 \cdot 18189$, односно 7002380 и 7002765.


1060. Ако је S тачка пресека дијагонала, онда је S средиште сваке од дијагонала, па је $AS = SC = 3$ см. Прво се конструише правоугли троугао BDD' . Након тога, одреди се средиште S дужи BD . Затим се конструише круг са центром у S и полупречником дужине 3 см. У пресеку круга са правом која садржи тачке B и D' добија се тачка A . Тачка C се добија у пресеку круга и праве која садржи тачке A и S .

1061. На тестирању је учествовало 30 дечака и 270 девојчица. Сви ученици су укупно освојили $300 \cdot 84$, односно 25200 бодова, док су девојчице укупно освојиле $270 \cdot 83$, односно 22410 бодова. Следи да су дечаци укупно освојили 2790 бодова. Како је учествовало 30 дечака, сваки од њих је освојио по 93 бода.

1062. Нека је тачка D подножје нормале из тачке B_1 на страницу BC . Како је $\angle B_1 C_1 D = 180^\circ - (\angle A_1 C_1 B_1 + \angle A_1 C_1 C) = 90^\circ - \angle A_1 C_1 C = \angle C_1 A_1 C$ и $\angle C_1 D B_1 = \angle A_1 C C_1 = 90^\circ$, то је и $\angle C_1 B_1 D = \angle A_1 C_1 C$. Како је и $C_1 B_1 = A_1 C_1$, то на основу



Сл. уз зад. 1060




Сл. уз зад. 1062

другог става подударности (УСУ) следи да је $\triangle C_1B_1D \cong \triangle A_1C_1C$. Одатле добијамо да је $C_1D = A_1C$ и $DB_1 = CC_1$. Троугао B_1BD је једнакокракоправоугли, па је $DB_1 = DB$. Одатле добијамо да је $DB = CC_1$. Следи да је $CB = 2 \cdot CC_1 + C_1D$. Како је $CB = AC = AA_1 + A_1C$ и $A_1C = C_1D$, то је $AA_1 = 2 \cdot CC_1$.


1063. Прости бројеви се могу завршавати цифром 1, 2, 3, 5, 7 или 9. Како се од простих бројева цифром 2 завршава само број 2, а цифром 5 само број 5, то се бар 2005 од датих простих бројева завршавају неком од цифара 1, 3, 7 или 9. Како имамо бар 2005 бројева, а 4 могућности за цифру којом се завршавају ти бројеви, по Дирихлеовом принципу бар 502 од тих бројева се завршавају истом цифрим.

1064. Како је $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - ab = \frac{a^2 + b^2 - (ab)^2}{ab} = \frac{a^2 + b^2 - (a-b)^2}{ab} = \frac{2ab}{ab} = 2$, то је вредност датог израза увек константна, па не зависи ни од a ни од b .

1065. Нека су тачке M и N подножја нормала из тачке D на катете AC и BC . Означимо са a, b, c, m и n дужине (у см) дужи BC, AC, AB, DM и DN редом. Како су површине треуглова ACD и BCD једнаке четвртини површине треугла ABC , то је $\frac{mb}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{ab}{2}$ и $\frac{na}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{ab}{2}$. Следи да је $m = \frac{a}{4}$ и $n = \frac{b}{4}$. Из правоуглог треугла CMD добијамо да је $m^2 + n^2 = CD^2$, односно $(\frac{a}{4})^2 + (\frac{b}{4})^2 = 25$. Следи да је $a^2 + b^2 = 400$, па је $c^2 = 20^2$. Према томе, дужина хипотенузе AB је 20 см.



Сл. уз зад. 1065



Сл. уз зад. 1068


1066. Нека је разлика сваког броја и његовог претходника једнака d . Други и трећи број у низу имају исту цифру десетица, па следи да је d једноцифрен број. Како је први број у низу једноцифрен, а други двоцифрен, то је $B = 1$. Даље следи да је $C = 2$ и $F = 3$. Други број у низу је 12, а пети 33. Како је $12 + 3d = 33$, то је $d = 7$. Ђирило је на табли написао бројеве: 5, 12, 19, 26, 33.

1067. Како је $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, то се бројеви облика 2^n редом завршавају цифром 2, 4, 8, 6, 2, ... Слично, бројеви облика 3^{n+3} , односно $27 \cdot 3^n$ се

редом завршавају цифром 1, 3, 9, 7, 1, Због тога се збир $2^n + 3^{n+3}$ завршава или цифром 3 или цифром 7. Како се квадрат природног броја никад не завршава неком од те две цифре, то следи да тражени број n не постоји.

1068. Нека је $\angle BAC = \alpha$, а $\angle ABC = \beta$. Тада је $\angle ACB = 180^\circ - \alpha - \beta$. Дужи CD и CE су тангентне дужи из исте тачке, па су једнаке. Троугао DEC је једнакокрак, па је $\angle CDE = \frac{1}{2}(180^\circ - (180^\circ - \alpha - \beta)) = \frac{\alpha + \beta}{2}$. Угао CDE је спољашњи угао троугла AFD , па је $\angle FAD + \angle AFD = \frac{\alpha + \beta}{2}$. Како је AO симетрала $\angle BAC$, то је $\angle FAD = \frac{\alpha}{2}$, па следи да је $\angle AFD = \frac{\beta}{2}$. Полуправа BO је симетрала $\angle ABC$, па је $\angle OBE = \frac{\beta}{2}$. Како је $\angle OFE = \angle AFD = \angle OBE$, то се око четвороугла $OBFE$ може описати круг. Углови OEB и OFB су периферијски углови тог круга над истом тетивом OB , па су једнаки. Како је $\angle OEB = 90^\circ$, то је и $\angle AFB = \angle OFB = 90^\circ$.

1069. Ако је $|x-2| < 0,04$, онда је $1,96 < x < 2,04$. Тада је $-1,1584 < x^2 - 5 < -0,8384$, па је $A = 1,1584$.



Сл. уз зад. 1070

1070. У троуглу ADB дуж DE је симетрала угла ADB , па је $AE : EB = AD : BD$. Слично, у троуглу BCD је $CF : FB = DC : BD$. Како је $AD = DC$, то је $AE : EB = CF : FB$. На основу обрнуте Талесове теореме добијамо да је $AC \parallel EF$. Следи да је $\triangle ADB \sim \triangle EMB$ и $\triangle DBC \sim \triangle MBF$. Одатле је $AD : EM = DB : MB$ и $DC : MF = DB : MB$. Према томе, $AD : EM = DC : MF$, па је $EM = MF$.


1071. За $n = 1$ и $n = 2$ бројеви датог облика су 18 и 45. Њихов највећи заједнички делилац је 9, па следи да највећи заједнички делилац свих бројева датог облика може бити или 1 или 3 или 9. Како је $4^1 \equiv 4 \pmod{9}$, $4^2 \equiv 7 \pmod{9}$, $4^3 \equiv 1 \pmod{9}$, то закључујемо да је $4^{3k+l} \equiv 4^l \pmod{9}$, где $k \in \mathbb{N}$, а $l \in \{0, 1, 2\}$. Сваки природан број већи од 2 може се представити у облику $3k$, $3k+1$ или $3k+2$, где је k природан број. Ако је $n = 3k$, онда је $4^{3k} + 15 \cdot 3k - 1 \equiv 1 + 0 - 1 \equiv 0 \pmod{9}$. Ако је $n = 3k+1$, онда је $4^{3k+1} + 15 \cdot (3k+1) - 1 \equiv 4 + 6 - 1 \equiv 0 \pmod{9}$. Ако је $n = 3k+2$, онда је $4^{3k+2} + 15 \cdot (3k+2) - 1 \equiv 7 + 3 - 1 \equiv 0 \pmod{9}$. У сваком случају, сви бројеви облика $4^n + 15n - 1$ су дељиви са 9, па је управо број 9 њихов највећи заједнички делилац.

1072. Обележимо дужине ивица квадра са x , y и z , тако да даје $x \leq y \leq z$. Тада важи да је $2(xy + xz + yz) = 4(x+y+z)$, односно $xy + xz + yz = 2(x+y+z)$. Како је $xy + xz + yz \geq xy + xz + x^2 = x(x+y+z)$, то је $x \leq 2$. Ако је $x = 1$, онда је $y+z+yz = 2(1+y+z)$, односно $yz-y-z=2$. Одатле је $y(z-1)-(z-1)=3$, па је $(y-1)(z-1)=3$. Како је $y \leq z$, то је $y-1=1$ и $z-1=3$, па је $y=2$ и $z=4$. Ако је $x=2$, онда је $2y+2z+yz=2(2+y+z)$, односно $yz=4$. Како је $2 \leq y \leq z$, то је $y=2$ и $z=2$. Према томе, решења су $x=1$, $y=2$, $z=4$ и $x=2$, $y=2$, $z=2$.

1073. Након првог потеза Раша сигурно даје Гаша део чоколаде правоугаоног облика. Гаша треба да пресече чоколаду тако да део који да Раши буде квадратног облика. Раша је опет принуђен да након свог потеза да Гаша део правоугаоног облика, итд. Према томе, Гаша никад неће добити део чоколаде квадратног облика, а он увек даје Раши део квадратног облика, па ће овом стратегијом Гаша сигурно победити.

1074. Конструишимо троугао DCP_1 (слика) тако да је $DP_1 \parallel AP$ и $DP_1 = AP$. Тада је $\triangle ABP \cong \triangle DCP_1$, јер је $AB = DC$, $AP = DP_1$ и $\angle BAP = \angle CDP_1$. Одмах следи да је $\angle DCP_1 = \angle ABP$. Како је $PP_1 \parallel AD$, јер је APP_1D паралелограм, то је

$\angle ADP = \angle DPP_1$. Тада је $\angle DPP_1 = \angle DCP_1$, па је четвороугао $DPCP_1$ тетиван. Сада је $\angle DAP = \angle DPP_1 = \angle DCP = 30^\circ$.



Сл. уз зад. 1074

1075. Направимо произвољну групу од 1003 члана. Једна од 1004 преостале особе познаје све чланове те групе. Нека је то особа x_1 . Укључимо особу x_1 у ту групу уместо неке од чланова те групе. Сада међу преостале 1004 особе опет постоји особа, означимо је са x_2 која познаје све чланове те групе. Укључимо и њу у групу уместо једне од особа изузев особе x_1 . На овај начин може се формирати група од 1003 особе $x_1, x_2, \dots, x_{1003}$ које се све међусобно познају. Сада постоји особа x_{1004} која није у групи и познаје све особе из те групе. У групи $x_1, x_2, \dots, x_{1003}, x_{1004}$ сви познају једни друге. Од преостале 1003 особе се може формирати једна група чије ће све чланове познавати нека особа ван те групе, то јест нека од особа $x_1, x_2, \dots, x_{1004}$, рецимо особа x . Та особа x познаје заправо све присутне особе.

1076. Нека је

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{(x+1)^2 + y^2 + 1} + \frac{2}{(y+1)^2 + z^2 + 1} + \frac{2}{(z+1)^2 + x^2 + 1} \\ &= \frac{2}{x^2 + y^2 + 2x + 2} + \frac{2}{y^2 + z^2 + 2y + 2} + \frac{2}{z^2 + x^2 + 2z + 2}. \end{aligned}$$

Како је $x^2 + y^2 \geq 2xy$, $y^2 + z^2 \geq 2yz$ и $z^2 + x^2 \geq 2zx$, то је

$$A \leq \frac{1}{xy + x + 1} + \frac{1}{yz + y + 1} + \frac{1}{zx + z + 1}.$$

Како је $\frac{1}{xy + x + 1} \cdot \frac{z}{z} = \frac{z}{1 + xz + z}$ и $\frac{1}{yz + y + 1} \cdot \frac{xz}{xz} = \frac{xz}{zx + 1 + z}$, то је

$$A \leq \frac{z}{1 + xz + z} + \frac{xz}{zx + 1 + z} + \frac{1}{zx + z + 1} = 1.$$

Једнакост важи за $x^2 + y^2 = 2xy$, $y^2 + z^2 = 2yz$, $z^2 + x^2 = 2zx$, тј. за $x = y$, $y = z$ и $z = x$ односно за $x = y = z$.

1077. Почетна позиција дата је на слици 1 ($a, b, c, d, e, f, g, h, j \in \{-1, 1\}$). Први корак је на слици 2.

a	b	c
d	e	f
g	h	j

Сл. 1 уз зад. 1077

bd	aec	bf
aeg	$dbhf$	cej
dh	gej	hf

Сл. 2 уз зад. 1077

Други корак је дат на слици 3, тј. (јер је $1^2 = (-1)^2 = 1$ и $x^3 = x$ за $x \in \{-1, 1\}$) на слици 4.

a^2e^2gc	$d^2b^3f^2h$	e^2c^2aj
$b^2d^3h^2f$	$a^2e^4g^2j^2c^2$	$b^2f^3h^2d$
ae^2g^2j	$d^2h^3f^2b$	ge^2j^2c

Сл. 3 уз зад. 1077

gc	bh	aj
df	1	fd
aj	bh	gc

Сл. 4 уз зад. 1077

Трећи корак је као на слици 5, тј. 6.

$bhdf$	$acgj$	$bhdf$
$acgj$	$(bhdf)^2$	$acgj$
$bhdf$	$acgj$	$bhdf$

Сл. 5 уз зад. 1077

$bhdf$	$acgj$	$bhdf$
$acgj$	1	$acgj$
$bhdf$	$acgj$	$bhdf$

Сл. 6 уз зад. 1077

Последњи, четврти корак, дат је на слици 7, тј. 8.

$(acgj)^2$	$(bhdf)^2$	$(acgj)^2$
$(bhdf)^2$	1	$(bhdf)^2$
$(acgj)^2$	$(bhdf)^2$	$(acgj)^2$

Сл. 7 уз зад. 1077

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Сл. 8 уз зад. 1077

1078. Како је $n!$ за $n \geq 9$ дељиво са $3^3 = 27$, то треба проверити деливост са 3^3 збира $1! + 2! + 3! + \dots + 8!$. Из $1! + 2! + 3! + \dots + 8! = 9 + 4! \cdot (1 + 5 + 5 \cdot 6) + 7! \cdot (1 + 8)$ добијамо $1! + 2! + 3! + \dots + 8! \equiv 9 \pmod{27}$, па значи за $n \geq 8$ број $1! + 2! + \dots + n!$ није дељив са $27 = 3^3$ (а делив је са $9 = 3^2$).

Непосредно се проверава да је $1 \equiv 1 \pmod{27}$, $1 + 2! \equiv 3 \pmod{27}$, $1 + 2! + 3! \equiv 9 \pmod{27}$, $1 + 2! + 3! + 4! \equiv 6 \pmod{27}$, $1 + 2! + 3! + 4! + 5! \equiv 18 \pmod{27}$, $1 + 2! + 3! + 4! + 5! + 6! \equiv 9 \pmod{27}$. Како је $1 + 2! + 3! + 4! + 5! + 6! + 7! = 81 \cdot 73$, тј.

$3^4 \mid (1 + 2! + 3! + 4! + 5! + 6! + 7!)$, то је $k = 4$ највећи број за који $3^k \mid (1! + 2! + \dots + n!)$ и то за $n = 7$.


1079. Како је $AE \leq \sqrt{3}$, $BF \leq \sqrt{3}$ и $CD \leq \sqrt{3}$, то је $h_a \leq \sqrt{3}$, $h_b \leq \sqrt{3}$ и $h_c \leq \sqrt{3}$. Бар један од углова α , β или γ је већи или једнак од 60° . Нека је рецимо $\alpha \geq 60^\circ$.

(1) Ако је $\alpha = 60^\circ$, тада је $AC = \frac{2}{\sqrt{3}}h_c \leq \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{3} = 2$, па је


$$P_{\triangle ABC} = \frac{b \cdot h_b}{2} \leq \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

(2) Ако је $\alpha > 60^\circ$, тада на правој AC постоји тачка G таква да је $\angle BGC = 60^\circ$ (слика), па је тада $GC = \frac{2}{\sqrt{3}} \leq h_c \leq 2$ и $AC < GC \leq 2$. Сада се одмах добија

$$P_{\triangle ABC} = \frac{AC \cdot h_b}{2} \leq \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$



Сл. уз зад. 1079



Сл. уз зад. 1081

1080. Како је $x^2 + ax + a^2 - 6 = (x + \frac{a}{2})^2 + \frac{3}{4}(a^2 - 8)$, то за $a^2 > 8$ једначина $x^2 + ax + a^2 - 6 = 0$ нема решења. Претпоставимо да је $a^2 \leq 8$. Тада је $a^3 \leq 8a$, јер је $a > 0$ по претпоставци. Како је $a^3 = 6a + b$, то је $6a + 6 \leq 8a$, односно $a \geq 3$ и $a^2 \geq 9$, што је контрадикција. Дакле, ни у овом случају дата једначина нема решења.

1081. На правим DA и BA изабрати редом тачке E и Z тако да је $AC = AE = AZ$ (слика). Како је $\angle DEC = \frac{\angle DAC}{2} = 18^\circ = \angle CBD$, то је четвороугао $DEBC$ тетиван.

Слично, четвороугао $CZBD$ је тетиван, јер је $\angle AZC = \frac{\angle BAC}{2} = 36^\circ = \angle BDC$. Према томе, петоугао $BCDZE$ је уписан у кружницу $k(A, AC)$. Из тога следи да је $AC = AD$ и $\angle ACD = \angle ADC = \frac{180^\circ - 36^\circ}{2} = 72^\circ$, што повлачи да је $\angle ADP = 36^\circ$ и $\angle APD = 108^\circ$.

1082. Како је $50 = 4 \cdot 12 + 2$, то постоји најмање 13 тачака обојених истом бојом.

Понађимо максималан број једнакокраких троуглова чија су темена неке три од датих n тачака. Издавањем неке две од тих n тачака, можемо добити највише 2 једнакокрака троугла којима изабране две тачке одређују основицу. Зато је тражени максималан број једнакокраких троуглова $\frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 = n(n-1)$. Када од укупног броја троуглова одузмемо максималан број једнакокраких троуглова, добијамо минималан број разнос-транничких троуглова, и он износи

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} - n(n-1) = \frac{n(n-1)(n-8)}{6}, \quad n > 8.$$

За $n = 13$ добијамо $\frac{13 \cdot 12 \cdot 5}{6} = 130$, па дакле постоји најмање 130 разностраничних троуглова чија су темена обожена истом бојом.

1083. Претпоставимо супротно од оног што се тврди у задатку, тј. да је p прост број и да је $m = 7p + 3^p - 4$ квадрат целог броја. За $p = 2$ је $m = 19$, а за $p = 3$ је $m = 44$, што нису потпуни квадрати. Претпоставимо зато да је $p > 3$ и нека је $m = n^2$ за неко $n \in \mathbf{Z}$. Искористимо „малу“ Фермаову теорему¹ према којој је $3^p \equiv 3 \pmod{p}$, па добијамо да је

$$m = 7p + 3^p - 4 \equiv 0 + 3 - 4 = -1 \pmod{p}.$$

Ако је $p = 4k + 3$, $k \in \mathbf{Z}$, тада је, опет по „малој“ Фермаовој теореми, $-1 \equiv m^{2k+1} = n^{4k+2} = n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, што је контрадикција, јер је $p > 3$.

Претпоставимо да је $p \equiv 1 \pmod{4}$. Тада је $m \equiv 3 - 1 = 2 \pmod{4}$, што је опет контрадикција, јер ниједан квадрат природног броја не даје остатак 2 по модулу 4.

Дакле, ни за један прост број p , m није квадрат природног броја.

¹ Видети, на пример, В. Мићић, З. Каделбург, Д. Ђукић: *Увод у теорију бројева*, Материјали за младе математичаре 15, Друштво математичара Србије, Београд 2004.